

# Verzeichniss

der verschiedenen

*feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,  
Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-  
Pflanzen,*

aus den Sammlungen

von

**S. & J. Rinz,**

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

**FRANKFURT AM MAIN.**

**Herbst 1853 bis Herbst 1854.**

## Zur gefälligen Berücksichtigung.

---

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen* gewöhnlich zu Ende *Januar*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.


Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch die Eisenbahn, den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende *October* und *November*) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen *Frühjahrsbestellungen* nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 40 Morgen; Neun Gewächshäuser bedecken einen Flächenraum von mehr als 14,000 □' mit Glas. —

 Aus nördlichen Gegenden gehen uns häufig im Frühjahr nach Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung. Topfpflanzen für's Kalt- haus reisen am vortheilhaftesten von October bis December, wenn frostfrei, dann von März bis Mai.

## Tafel - und Oeconomie - Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2., 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

### Kern - Obst.

#### Hochstämmige Äpfel,

erste Auswahl . pr. Stück 30 kr.  
zweite Auswahl . " " 24 "  
pr. 100 Stück fl. 24 bis fl. 40.

#### Tafel - Sorten.

Die mit \* bezeichnet können auch als Pyramiden oder Zwerg auf Johannisstämme veredelt abgegeben werden.

Astrachan White. \* Aug. Sept. 1. Rang.  
Beachamwell. \* Dec. März. 1. Rang.  
Barzeloner Pearmain. Dec. Mai. 1.  
Calville blanc d'hiver. \* Jan. Apr. 1. Rang.  
rouge d'hiver. \* Nov. Dec. 2. Rang.  
d'automne. \* Oct. Nov. 2. Rang.  
Court pendu plat. \* Dec. Apr. 1. Rang.  
Danziger Kant-Apfel. Sept. Nov. 1.  
Dominiska. \* Dec. Febr. 2. Rang.  
Early Marguerite.  
Edelhorsdorfer, \* wegen langsamem Wachsthum  
pr. Stück 48 kr.  
Englischer Winter-Goldpearmain. \* Dec.  
März. 1. Rang. (King of pepins.)  
(sehr empfehlenswerth).  
Gefleckter Goldapfel. \* Nov. Jan. 2. Rang.  
Gestreifter Himbeerapfel.  
Graevensteiner, \* vorzüglich. Oct. Dec.  
Kaiser Alexander, \* prachtvoll. Oct. Nov. 2.  
Kiswick's Codlin.  
Köstlicher von Kew. Dez. März. 1.  
Lord Nelson. \*  
Menagère. \* sehr groß. Oct. Dec. 3.  
Old nonpareil. \* Jan. Mai. 1.  
Penningtons seedling \* Nov. März. 1.  
Polnischer Zuckerapfel.  
Pommeranzen-Apfel. \* Oct. Jan. 2.  
Pomme de St. Louis. \* Aug. Sept.  
Reinette Baumann. \* Nov. Mai. 2.  
Carpentine. \* Nov. März. 2.  
Carmin. \*

Reinette Crete's Quitten. \* Dec. März. 2.  
d'Angleterre. \* Jan. Mai. 2.  
de Breda. \* Dec. März. 1.  
d'Orleans. \* Dec. April. 1.  
de Rochelle. \* Oct. Nov. 2.  
du Canada. \* Nov. April. 1.  
du Nord. \* hält 1 Jahr. 2.  
franche. \* hält 1 Jahr. 2.  
Gasdonker Gold. \* Dec. April. 1.  
grise d'automne. \* Nov. 2.  
grosse Casseler. \* Nov. März. 1.  
Holländische Gold- \* Dec. März. 1.  
Kräuter- Dec. Mai. 1.  
Montbron. \* Dec. Mai. 2.  
Montmorency. Jan. Mai. 2.  
Muscot. Nov. Juni. 1.  
Niemann's rothe. \* Dec. März. 2.  
Roussé.  
truite. \* März. Juni. 2.  
Uelner's Gold- \* Dec. März. 1.  
Ribston's pepin. (vorzüglich) \* Nov. Jan. 2.  
Royale de Christ. \* Jan. März. 1.  
Seedling Young. \* Jan. März. 2.  
Summer-golden pepin.  
Transparent.

#### Oeconomische Sorten.

pr. 100 Stück fl. 30 bis fl. 40.

Anhalter. (schnellwachsend.) Weisapfel.  
Api le gros. Oct. April. 2.  
le petit. ditto.  
Bedfordshire foundling. Nov. März. 1.  
Blenheim Orange. \* Nov. Febr. 1.  
Blutrother Wintercardinal. Dec. März. 2.  
Dübener Glasapfel.  
Fassapfel.  
Fränkischer Königsapfel.  
Gelber Calville-Rambour. Nov. Dec. 3.  
Gelderscher Kronapfel.  
Gestreifter Rettigapfel.



Gestreifter Franziskaner  
 Golden Harwey. \* Dec. Mai. 1.  
 Grosser Bohnapfel, (zu empfehlen.) Jan. Juni.  
 Grosser Nassauer.  
 Grosser Winterfleiner. Nov. März. 3.  
 Grüner Fürstenapfel. 1 Jahr. 3.  
 Grüner Kaiserapfel. Dec. Febr. 3.  
 Grüner von Sedan.  
 Gutleuthöfer.  
 Hawthornden. \* Oct. Dec. 1.  
 Kaisersheimer.  
 Kohlapfel, schwarz-schillernder (zu empfehlen). Weinobst.  
 Köstlicher von Schudt.  
 Lehmann's Ungarapfel.  
 Lothringer bunter Gulderling. Nov. Jan. 2.  
 Matapfel, brauner. Nov. März. 3.  
     spätblühender.  
     weisser. Dec. Juni. 3.  
 Mostapfel.  
 Norfolk Beaufin. \* Jan. Juni. 1.  
 Northern greening. \* Nov. April. 1.  
 Princessinapfel. Nov. Jan. 3.  
 Propsteiapfel.  
 Rheinischer Bohnapfel.  
 Rheinischer Wandapfel.  
 Rother Specialapfel.  
 Rother von Sedan.  
 Rother Winter-Rambour. Dec. März. 2.  
 Schafnase. Weinobst.  
 Schomburger Purpurstreifling.  
 Schöner Marienapfel.  
 Sommerfleiner. Sept. Nov. 2.  
 Spanischer gestreifter Gulderling.  
 Streifling. Weinobst.  
 Streifling Königlicher. Dec. Juni. 2.  
 Streifling, Lütticher platter Winter-  
 Winterstettiner, ächter rother (vorzüglich.)  
 Winterstettiner, ächter gelber. Dec. März 2.  
 Winter-Citronapfel. Dec. März. 3.  
 Zehendheber, (zu empfehlen.)  
 Zwiebelborsdorfer Nov. März.

Die vorstehenden Sorten sind dieses Jahr in sehr bedeutender Anzahl und aussergewöhnlich kräftigen, jungen schönen Stämmen vorrätig, deren Kultur und Beschaffenheit überall das beste Gedeihen verspricht.

Tafel-Sorten wachsen in der Regel langsamer als ökonomische, wenn daher bei erster Auswahl auch oft schwächere Stämme sich befinden, so liegt dies grösstentheils in deren Eigenschaft.

Von nachstehenden, den vortrefflichen Cidre der Normandie liefernden Sorten, das Stück zu 48 kr.

- Nr. 1. Gros amer doux.
- » 2. Petit amer doux.
- » 3. Fréquin rouge.
- » 4. Gabayeux.
- » 5. Bérard.
- » 6. Dechenay.
- » 7. Court a pied.

## Pyramiden- oder Zwerg-Aepfel, auf Johannisstämme veredelt,

Der diesjährige Vorrath hiervon ist geringer als gewöhnlich.

pr. Stück 24 kr.

Die auf Johannisstämme veredelten Aepfelstämmchen gewähren bei guter Pflege ganz besondere Vortheile und Genüsse; sie eignen sich ebensowohl für grosse als sehr kleine Gärten, indem sie nur wenig Raum bedürfen, gewöhnlich schon im zweiten Jahre und darauf immer reichlich tragen, vorzügliches Tafelobst liefern und im Laufe ihrer Blüthe und Obstentwicklung das mannigfaltigste und herrlichste Ansehen erhalten. Freilich erfordern sie hierzu einen wenigstens mässig kräftigen Gartenboden, diesen aber nur von 1½ bis 2 Fuss Tiefe, weil die vielen Saugwurzeln mehr auf der Oberfläche sich ausbreiten. Aus diesem Grunde wirkt auch das öftere Bebaue und Düngen äusserst vortheilhaft auf kräftiges Wachstum und grösseren Obstertrag. — In Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt, gedeihen sie ebenfalls vorzüglich, und bilden in kurzer Zeit die tragbarste Obst-Orangerie.

Adams Pearmain. Nov. Febr. 1.  
 Alfriston. Nov. April. 1.  
 August von Mons (Engelsapfel.) Oct. Dec. 2.  
 Beats pepin. Nov. Jan.  
 Beauty of Kent Oct. Febr. 1.  
     of Wilts. Nov. Dec.  
 Bentzler. Dec. Mai.  
 Black Gilliflower.  
 Blenheim pippin. Nov. Febr. 1.  
 Boston-Roussel.  
 Bullock's pippin.  
 Calville blanc d'été. Aug. Sept. 2.  
 Calville, rother Herbst-Anis- Sept. Oct. 1.  
 Chataigne. Dec. Juni.  
 Claygate pearmain. Nov. März. 1.  
 Cockle pippin. Jan. April. 1.  
 Cobham apple. Nov. Jan. 2.  
 Court pendue pippin.  
 Crafton apple.  
 Downton nonpareille. Dec. April. 1.  
 Early red Margarete.  
 Franklins gold-pippin. Oct. Dec. 2.  
 Gelber gestreifter Sommerpearmain. Sept. 2.  
 Glasapfel.  
 Golden noble. Sept. Oct. 2.  
 Goldmohr. Dec. März. 2.  
 Grange apple. Dec. Febr. 2.  
 Grosser Muscelli.  
 Herefordshire pearmain. Nov. März. 1.  
 Hugh's new golden pippin. Dec. Febr. 1.  
 Irish peach apple. Aug. Sept. 1.  
 King of pippins. Oct. Jan. 1.  
 Kirk's Fame.  
 Kirk's scarlet pippin.  
 Kirk's seedling golden pippin.  
 Kiswick Codlin.  
 Königsapfel von Jersey. Nov. Jan. 2.  
 Ladys Finger.  
 Lothringer Sommer-Rambour. Sept. 1.  
 Mank's Codlin. Aug. Oct. 1.  
 Maidens Blush. Sept. Oct. 2.  
 Monstruous gloria mundi. Nov. Jan. 1.



Negre d'orée.  
 Oslin. Aug. Sept. 1.  
 Palästiner. Aug. 2.  
 Pearmain federal. Dec. März. 1.  
 Pomme de Rose.  
 Possart's Moskauer Nalivia. Nov. Dec. 2.  
 Red Astrachan. Aug. Sept. 2.  
 Reinette Ananas. Nov. April. 1.  
 Bischoff. Nov. April. 1.  
 Champagner.  
 Citronen. Dec. Mai. 2.  
 Damason.  
 d'Espagne. Dec. Jan. 1.  
 d'Hollande. Oct. Nov. 1.  
 de Normandie. Oct. Nov. 2.  
 de New York.  
 Dietzer rothe Mandel-. Dec. Juni 1.  
 d'Orre de Christ. Dec. März.  
 de Sorgkiet. Dec. März.  
 englische Gold.  
 englische Granat. Dec. April. 1.  
 englische Spital (Sickhouse). Dec.  
 April 1.  
 gelbe spanische. Dec. Jan. 1.  
 goldgelbe Sommer- Sept. Nov. 2.  
 Graf Sternbergs röthliche.  
 grise d'orée.  
 Kirk's golden.  
 Limonen.  
 Menonisten. Dec. April. 2.  
 Normander.  
 Piqué. Dec. März.  
 Saffran. Nov. März. 2.  
 Schwarze's Blut- Nov. März. 1.  
 van Mons. Dec. März. 1.  
 Walliser Limonen.  
 Willy's gelbe. Nov. März. 1.  
 Zimmet. Dec. März. 1.  
 Red Ingestrie. Oct. Nov. 1.  
 Red Island greening. Dec. April. 1.  
 Robinsons pippin. Dec. Febr. 1.  
 Roman Stem. Nov. Dec. 2.  
 Romarin blanc. Nov. Febr. 1.  
 Rothe Wiener Sommerapfel. Oct. 2.  
 Soll pippin.  
 Spencer's pippin.  
 Sugarloaf-pippin. Aug. 1.  
 Summer golden peppin. Aug. Sept. 1.  
 Tyroler Rosenapfel. Dec. Juni. 2.  
 Türkischer Muskateller.  
 Weisses Herbstrich. Nov. Dec. 2.  
 Weller's Eckenhagner.  
 Wellington.  
 Wick's Fancy.  
 Wormsley pippin. Sept. Oct. 1.

## Hochstämmige Birn,

pr. Stück 30 kr.

Die mit \* bezeichnet können auch als Pyramiden  
 oder Zwerg auf Quitten veredelt abgegeben  
 werden.

Belle fondante.

Belle et bonne. \* Sept. 2.  
 Bergamotte Crassanne. \* Nov. Dec. 1.  
 Bergamotte Pentecôte. \* Jan. April. 2.  
 Bergamotte Nouvelle Pentecôte. \* ditto 1.  
 d'Hollande.  
 Sageret \* Febr. 2.  
 Beuré blanc. \* Sept. 1.  
 gris. \* Sept. 1.  
 d'Amatis \* Sept. 1.  
 Bouquain \* Oct. 1.  
 Diel \* Nov. 1.  
 Navez \* Nov. 1.  
 d'Arenberg. \* Nov. Febr. 1.  
 d'Argenson. \* Nov. Jan. 1.  
 Napoléon. \* Oct. Nov. 1.  
 Bezy Chaumontel. \* Nov. März. 1.  
 Bon chrétien d'été. \* Sept. 2.  
 d'hiver. \* Dec. März. 2.  
 Carazi de Metz. Oct. Weinbirne.  
 Citron de Carmes panaché, feähefte. Juli, Aug.  
 Collmar. \* Nov. Febr. 1.  
 Colmar Nelis d'hyver. \*  
 Collomas espige. \* Dec. Jan. 1.  
 Dearborn's Seedling. \* Aug. Sept. 1.  
 Delice de Charneux. \*  
 Duchesse d'Angoulême. \* gr. Oct. Nov. 1.  
 Echasserie. \* Nov. Jan. 1.  
 Epargne. \* Aug. 1.  
 Epine d'élé. \* Sept. 2.  
 Feine September Goldbirne.  
 Fassli Birne. Oct. Weinbirne.  
 Gros cuisse Madame. \* Aug.  
 Gros Rousselet. \* Sept. Oct. 1.  
 Leon Leclercq de Laval. \* März, Mai. 2.  
 Jean Baptist (Van Mons). \* Jan. Febr. 3.  
 Muscat Robert. \*  
 Orphelin d'Enghien. \* Nov. Jan. 1.  
 Passe Collmar. \* Dec. Febr. 1.  
 Pfaffenbirne.  
 Poire d'œuf. \* Aug. 1.  
 Poire de St. Pierre. \*  
 Seigneur. \* Sept. 1.  
 Poire truite. \* Nov. Jan. 1.  
 Reine des poires (Esperin). Nov. Jan. 1.  
 Royale d'hyver. \* Dec. Febr. 1.  
 Schönlins Winterbutterbirne. \* 1.  
 St. Germain. \* Nov. April. 1.  
 Studtgarter Weinbirne.  
 Studtgarter Rousselette.  
 Suzette de Bavais (Esperin). \* Febr. Apr. 1.  
 Sylvange. \* Oct. Nov. 2.  
 Tarquin de Pyrennès. \* hält zwei Jahre, Kochbirne.  
 Urbaniste. \* Oct. 1.  
 Verte longue. \* Oct. 1.  
 Virgouleuse. Nov. Jan. 1.  
 Wolfsbirne (Weinbirne).  
 Welsche Bratbirne (Champagner Weinbirne).  
 ditto ditto mit welligem Laube.  
 Wintercrassanne. \* 1.  
 Von nachstehenden meistens ökonomischen  
 Sorten à 24 kr.  
 Alexander.  
 Baum'sche Birne.

Beuré Briel.  
Gaebacher Bestebirne.  
Klotzbirne.  
Margarète la grosse.  
Röthelsbirne.  
Speckbirne.  
Schollen oder Eisenbirne.  
Stümpfling.  
Wahlbirne.

## Pyramiden- oder Zwergbirn, auf Quitten veredelt.

pr. Stück 28 kr.

Von den auf Quitten veredelten Birnstämmchen gilt dasselbe, was über Zwergäpfelstämmchen bemerkt wurde; doch sind nicht alle Sorten für die Topfkultur oder Obstorangerie zu empfehlen, weil sie überhaupt einen tieferen reichen Boden verlangen, in dessen Ermangelung die besten Sorten oft sehr unvollkommenes, steinigtes und rissiges Obst bringen. Obgleich ein feuchtes Erdreich als sehr günstig betrachtet wird, so kränkeln hingegen alle Birnbäume, wenn ihre Wurzeln in einen sumpfigen Untergrund hinabreichen. Gegen das letzte Uebel schützt öfteres Verpflanzen, wodurch die Wurzeln am sichersten nach der Oberfläche geleitet werden können.

Andrews.

Belle de Bruxelles. Sept. Oct. 1.

Bergamotte d'été. Sept. 1.

Cadette.

d'Hollande. Mai. Juni.

de Quercy.

Beuré Auroré. Oct. 2.

Beauchamps. Nov. 1.

Bouquain. Sept. Oct. 1.

Campiemont. Oct. 2.

Collmar d'automne.

d'Amatis. Sept. 1.

Dié. groß und vorzüglich. Nov. Dec. 1.

Lombard (Esperin).

Rance. Febr. April. 1.

Romain. groß und gut. Sept. Oct.

Rose. Oct. Nov. 1.

rouge. Oct. 1.

van Mons. sehr groß und schön. Nov. 1.

Bezy blanc (vorzüglich.)

Esperin (Bavaix) Dec. Jan. 1.

de Motte. Oct. Nov. 1.

Bleeckers Medow.

Bon chrétien sans peppins

de Bruxelles. März. 3.

d'Espagne. Nov. Dec. 2.

Napoleon. Oct. Nov. 1.

Bonne Louise ou Avanchie. vorzüglich. Oct.

Bretagne la Cour.

Brown park.

Catillac. groß. Rothbirne. Nov. Mai. 3.

Charly (van Mons.)

Chaptal. groß. Rothbirne. Nov. April.

Citron de Carmes panaché. Aug. 1.

de Sierens. Aug.

Clara.

Clement (van Mons.)

Colmar d'Arenberg.

Nelis d'hiver.

Comperette. schön. Aug. Sept. 1.

Coter pear. Octob., mittelgroße, feine Butterbirne.

Cumberland.

Davy.

Dearborns Seedling. (vorzüglich.) Aug. Sept. 1.

Delbeg.

Delice d'Hartenpont. Nov. 1.

Jodoyne. Nov. Dec. 1.

Deroll's Herbstmuscateller.

Duchesse de Berry.

Dumortier. (vorzüglich.) Oct. Nov. 1.

Duquesne d'été. Sept. eine sehr feine Butterbirne.

Easter beuré. Jan. März. 1.

Echasserie. (Zagbire.) Nov. Jan. 1.

Epine d'été. (sehr gut und volltragend.) Sept. 2.

Famengo.

Feine September-Goldbirne. (vortreflich.)

Flemish beauty. Sept. Oct.

Fondante de Lille.

Sickler. Oct.

Forellenbirne. Nov. 1.

Forster's St. Michaels. Sept. 1.

Fourcroy. Dec. Jan. 2.

Frankreal d'été. Sept. 1.

Frühe wohlriechende Pommerranze. August.

Sept. 1.

Gansell's Bergamotte. Oct. Nov. 1.

Gendebien.

Glou morceau de Chambon. Nov. Jan. 1.

Golden beuré of Bilbao. Octob. richtig schön.

Green yair. (sehr empfohlen.) Sept.

Grand Mogul. Oct. Nov. 3. sehr groß.

Gros cuisse Madame. (vortreflich.) Aug.

Gros Rousselette de Rheims. Aug. Sept.

panaché. Aug. Sep.

Hartenpont's Winterbutterbirne. Nov. Dec. 1.

Hasselt. groß und sehr gut. Ende Aug.

Heathcote.

Henriette. Novemb. sehr groß, prächtig.

Hericourt.

Hooper's Bilbao.

Jean Baptist (Van Mons). Jan. Febr. 3.

Jutte.

Imperial. März. April. 3.

Julienne. sehr schön und vortreflich. August.

Kleine Zimmt-Rousselette. Sept. 2.

Leon Leclercq (Van Mons) vorzüglich. Febr.

April. 1.

Margarethibirne.

Maria Louise nouvelle.

Marie Louise. (vortreflich.) Oct. Nov. 1.

Marly.

Martin sec. Nov. Dec. 3. Kompothine.

Messire Jean. Nov. Dec. 2.

Monarch. Jan. 1.

Muscat blanc.

Naumkeag.

Oakley-Park-Bergamotte. Oct. 1.

Passe Colmar. Dec. Febr. 1.



Poire Ananas. Oct. 1.  
 Avignon.  
 de Curé. Nov. Dec. 3.  
 fortuné. (sehr lange halbrunde.) Jan. Juni. 2.  
 truite. Sept. Oct. 1.  
 Poiteau.  
 Prince St. Germain.  
 Princesse royale (Groom).  
 Prinz Ferdinand, (sehr empfohlen.) Dec. März 1.  
 Reine d'hiver.  
 Reine des poires (Esperin). Nov. Jan. 1.  
 Roi de Rome. *IV*.  
 Rousse lench. Jan. Febr. 2.  
 Rothe Orange.  
 Royale d'hiver. Dec. Febr. 1.  
 Salisbury. Sept. Oct. 1.  
 Secklepear. (vortügl., von America.) Oct. 1.  
 Seilebirne. Oct.  
 Schönlings Winterbutterbirne. *IV*.  
 Soldat Laboureur (Esperin). Dec. Jan. 1.  
 St. Germain von Mons.  
 St. Ghislain. Sept. 1.  
 Sucré d'Hoyerswerda. Aug. Sept.  
 Sucré verte. *II*.  
 Sylvange. Oct. Nov. 2.  
 Thompson's. Nov. 1.  
 Tyson. vortügl. Aug. Sept.  
 Urbanist. (vortügl.) Oct. 1.  
 Verte longue panaché. Oct.  
 Wahre Pfingst-Bergamotte. *IV*.  
 Washington. Oct. klein, sehr fein.  
 Webbers autumnal. *IV*.  
 Whitefield. Nov. 2.  
 Wilbur.  
 Williams bon Chrétien. Sept. 1.  
 Winter-Crassanne. *IV*.

### Ferner neu gesammelte Birn. in geringerem Vorrath.

pr. Stück 36 kr.

Amalis panaché. Sept. 1.  
 Ananas belge. Oct. 1.  
 Angora. größte Koshbirne. Jan. März.  
 Belle fondante.  
 Belle de Noël. Dec. Jan. 1.  
 Bellissime d'été. Aug. 1.  
 Bergamotte Sageret. Febr. März. 2.  
 Bergamotte d'Angleterre. Sept. Oct.  
 Bergamotte d'été.

Beuré Bronzé. Dec. Jan.  
 Benner.  
 d'Angleterre de Noissette. Sept. Oct. 1.  
 de Bois. Oct. 1.  
 Engelbert. groß. Dec. Jan. 2.  
 gris d'hiver nouveau. Jan. März.  
 Moiré.  
 Navez (Bouvier). Nov. 1.  
 Bon Chrétien William. Sept. 1.  
 Bonne grise fondante.  
 Calbasse d'été (Esperin). Aug. Sept. 1.  
 Collomas (töftliche Winterbirne) Dec. Jan. 1.  
 Colmar Van Mons. März. April. 2.  
 Delice d'Hartenpont d'Angers. Oct. Nov. 1.  
 Delice de Charneux.  
 Doyenné Pomier. Sept. 2.  
 d'été. Juli. 1.  
 d'hiver nouveau. Dec. März. 1.  
 Duchesse d'Angoulême panaché. Oct. Dec. 1.  
 Duchesse de Berry d'été. Aug. Sept. 1.  
 Fondante de Malines (Esperin). Dec. Jan. 1.  
 Fondante de Noissette.  
 Franchipanne. Oct. Nov. 2. Compoëbirne.  
 Frédéric de Württemberg (V. Mons). Sept. 1.  
 Gros Muscat. Sept. 1.  
 Henry van Mons. Dec. 1.  
 Incomparable Haçons. Nov. 1.  
 Josephine de Maline (Esperin). Febr. Apr. 1.  
 Lem Leling (?).  
 Leon Leclercq (v. Mons). Febr. April. 1.  
 Leon Leclercq de Laval. März-Mai. 2.  
 Maria Louise Delcourt. Oct.-Nov. 1.  
 Mignonne d'hiver.  
 Muscat Robert.  
 Orpheline d'Enghien (Deschamps). Nov.  
 Jan. 1.  
 Passe Colmar dorré. Dec. Febr. 1.  
 de Bavay. Dec. Febr. 1.  
 musqué (Esperin). Oct. Nov. 1.  
 Poire de Pomme. Oct. Dec. 2.  
 de Chair.  
 de St. Pierre.  
 Leurs. Oct. Dec. 1.  
 Pêche (Esperin). Oct.  
 Seigneure. Sept. 1.  
 Seigneur d'Esperin. Oct. Nov. 1.  
 St. Michael Archange. Oct. 1.  
 Suzette de Bavais (Esperin). Febr. Apr. 1.  
 Vergaline musqué. Aug. Sept. 1.  
 Tarquin des Pyrenées. Jan. 2 Jahre, Koshbirne.

Eine Parthie schöner Pyramiden-Birn auf Quitten in den besten Sorten, von  
 von durch Versehen die Namen verloren gingen, bieten wir an zu 20 kr. pr. Stück,  
 fl. 3. 36 kr. pr. Dutzend, fl. 25 pr. 100 Stück.

# Stein-Obst.

## Abricot.

Folgende Sorten können sowohl in Hochstämmen als Zwerg, Spalier oder Pyramiden in schöner, kräftiger Auswahl abgegeben werden.

**Hochstämme** . . . . pr. Stück 40 kr.  
**Zwerg, Spalier, Pyramid.** . . . 30 .  
**Alberge.**

à fruits longue.  
à fruits rond.

blanc Muscat.

Commun.

d'Ailsa.

d'Angoumois hatif.

d'Hollande.

de Nancy (Pfirschen-Abricot) sehr saftreich.

de Paris.

de Provence.

de St. Ambroise.

de Sardeigne.

du Chili lacinié.

du Luxembourg.

du Nord.

gros pêche, sehr saftreich.

gros rouge hatif.

hatif musqué, klein, frühest.

Mauntgaut.

Moorpark.

Mush-mush.

musqué milieu.

panaché.

pêche hatif d'Ulines.

précoce le gros, frühe, saftreich.

royale.

Rumblers grosse.

## Pflaumen.

Die mit † können hochstämmig, jene mit \* bezeichnete Sorten niederstämmig oder zu Spalier geliefert werden.

Wo kein besonderer Preis bemerkt kosten:

**Hochstämme erster Auswahl** pr. Stück 40 kr.  
**zweiter** . . . 36 .  
**Niederstämme oder Zwerg** . . . 30 .

Der Vorrath der Pflaumen ist dieses Jahr so vollständig, dass wir mit Zuversicht vertrauen jedem billigen Wunsche entsprechen zu können.

† \* Abricoté.

† \* Caledonian, größte, runde, blaue.

† \* Catalogne, früheste gelbe, mirabellenartige, reift Ende Juli.

† \* Coes fine late red.

† \* Coes golden Drop.

† \* Damas Aubert rouge, köstlich.

† \* Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.

† \* d'Anjou.

† \* Downton's Imperatrice.

† \* de Brieune, köstlich.

† \* de Monsieur, Hercepflaume.

† \* de Monsieur jaune, neu pr. St. 48 kr.

† \* de Montford.

† \* Diamond, sehr gr., lang, gelblich, rothbäutig.

† \* Diaprè rouge, rothe.

† \* Fellemberg.

† \* Gloire Schönberg, neu.

† \* Gros Damas blanc, Hercepflaume.

† \* Ickworth Imperatrice.

† \* Knight's plum, sehr früh, roth, mirabellenartig.

† \* Mirabelle, Grosse späte gelbe, eine köstliche, vorzügliche, höchst empfehlenswerthe Frucht, † pr. Stück 48 kr. 36 .

† \* Mirabelle, größte, früheste, gelbe, sehr empfehlenswerth. pr. Stück. 48 kr.

† \* Mirabelle tardif v. Metz, späte Mirab. v. Metz.

† \* Mirabelle von Bieberich.

† \* Nectarine plum, groß, blau, sehr gut.

† \* Perdrigon rouge.

† \* Ponds Seedling, ungemein groß, prächtig roth.

† \* Prince of Wales, neu, sehr empfehlend. pr. Stück fl. 1. — kr.

† \* Reine blanche, neu, sehr empfehlend. per Stück fl. 1. — kr.

† \* Reine Claude Aloyse, Brantfurter Erzeugniß, vorz. einigt bei edelster, großer Form den feinsten Geschmack. pr. Stück 48 kr.

† \* Reine Claude de Bavay, sehr empfehlend. † pr. Stück 48 kr. 36 .

† \* Reine Claude verte, gewöhnliche große grüne.

† \* Reine Claude rouge.

† \* Reine Claude violette, große blaue.

† \* Reine Claude Washington, allergegröste grüne.

† \* Robe de Sergeant.

† \* Sharp's Emperor, sehr groß, kugelförmig, blaugroth und gelblich.

† \* St. Catharine jaune.

† \* Shropshire Dawson, größte, zwetschartige.

† \* Yorkshire wine sour.

† \* Zwetsche, frühe blaue, englische.

† \* Zwetsche, große, frühe.

† \* Zwetsche, große gewöhnliche.

† \* pr. Stück 24 bis 30 kr.

† \* Zwetsche, große Leipziger.

† \* Zwetsche, große ungarische.

† \* Zwetsche, italienische, größte, vorzüglichste.

† \* Zwetsche, Frankfurter Pfirsche, Brantfurter Erzeugniß größer, saftiger und feiner als die italienische Zwetsche. † pr. Stück fl. 1. 12 kr. \* pr. Stück 48 kr.



## Kirschen.

Die mit † bezeichneten können hochstämmig auf Wildlinge, und die mit \* als Pyramid oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

**Hochstämme** pr. Stück 30 kr.  
**Pyramiden oder Spalier** „ 24 „

Die Kirschen, besonders die auf Prunus Mahaleb veredelten Sorten in Pyramidenformen, begnügen sich vor allen anderen Obstbaumgattungen mit dem magersten Boden und können unter diesen Umständen vorzugsweise zu Anpflanzungen in Gruppen, an Wandspaliere, zur Deckung von Mauern, mit vielem Nutzen und zu grosser Zierde Verwendung finden. Die Stämmchen sind ausgezeichnet schön und stark.

- † \* Amarelle, rothe, sauer, Juli.
- † \* Amarelle, schwarze, bitto, bitto.
- \* Americain, sauer, Juli.
- \* Americain ou Houet, bitto.
- \* A feuilles de Saule, beste, frühe, süsse.
- † \* Belle Audigoise, ausgezeichnet schön u. schmackhaft.
- † \* Belle de Choisy.
- † \* Belle et Bonne, vorzüglich.
- † \* Bigareau Malacord, neu. pr. Stück 48 kr.
- † \* Brune de Bruxelles.
- † \* d'Angleterre hatife, früh und gut, halbsauer.
- \* d'Espagne, sauer, Juli.
- \* de Holstein
- \* de Neufchateau.
- † \* des Toussaints.
- \* de Spaa (Belle de Chatenai), vorzüglich.
- \* de Virginie, wilde Weichsel.
- † \* Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
- † \* Early of Richmond, früh, groß und gut.
- \* Elkhorn de Maryland.
- † \* Englische schwarze.
- † \* Flammentine, neue Achte, unübertrefflich.
- † \* Fraser's, schwarze tartarische.
- † \* Frühe rothe. Juni.
- † \* Grosse frühe Mai.
- † \* Guigne écarlate, rothe Fleischkirsche.
- † \* jeaune, gelbe.
- † \* noir hatife, schwarze Fleischkirsche.
- † \* Herz, rothe.
- † \* schwarze.
- † \* späte.
- † \* Dachsenberg.
- \* Incomparable en bonté.
- † \* Kleparow, dunkel, sauer, Juli.
- † \* Lauermann's grosse Napoleon, süß, Juli.
- † \* Mayduke, Juni.
- † \* Monstrueuse de Bayav, neu, vorzüglich, Juli.
- † \* Montmorency, sauer, Juni.
- \* Longleys à longue queue, vortrefflich.
- \* Muscat prague, braun, halbsauer.
- † \* Ostheimer Sauerkirsche.
- \* panaché jaune.
- \* Portugal de Becker.
- † \* Reine Hortense, neu, vorzüglich.
- \* Rothe zuckersüsse.

- † \* Royale.
- \* d'Angleterre hatif, früh, groß und gut.
- \* d'Angleterre tardif.
- \* Spanische Weichsel.
- † \* Speckkirsche.
- † \* Schatten-Morelle, wird für schattigte Stellen allgemein angerühmt.

## Pfirschen.

Pfirschen verlangen bekanntlich reichen Boden, gute Lage und entsprechende Pflege; desshalb werden sie im Allgemeinen nur an Mauern gegen Osten und Süden erzogen. Hochstämme kommen nur in äusserst geschützten Lagen gut fort, daher ist der Vorrath hiervon auf wenige Sorten beschränkt, welche mit einem \* bezeichnet sind.

**Hochstämme** pr. Stück 48 kr.  
**Spalier** „ 36 „

- Admirable, belle de Vitry, Ende Sept. \*
- A fleurs double, schönblühend.
- Alberge jaune.
- Avant Pêche, August.
- Belle de Beaucaire, groß, Ende Sept.
- Brugnon musqué, nadt.
- Chancellor, Aug. u. Sept.
- Chevreuse hatife, Aug., u. Sept. \*
- d'Hollande.
- d'Isphahan, feinblättrig.
- d'Malthe, August.
- Grosse bonne (Audibert.)
- Grosse Mignonne, Aug., Sept. \*
- Grosse Mignonne précoce, Aug.
- Grosse Montagne précoce, Aug., Sept.
- Hollaendische doppelte Montagne, Sept.
- Zwoolische, Sept.
- Madeleine blanche.
- de Courson, Sept. \*
- de Bollviller, Sept.
- rouge, Sept. \*
- Monstrueuse.
- Mores white free flore.
- Nivette pourpré, Sept.
- Pavie.
- Pavie de Newington.
- Pêche de Neipperg, neu.
- Petite Mignone (Double de Troyes)
- Pourpre hatif, August.
- Pourpre vineuse, Sept.
- Princesse Marie de Württemberg, neu.
- Rothe August-, \* sehr früh, starkwüchsig, volltragend, groß und vollsaftig, daher wohl eine der vorzüglichsten Sorten für das deutsche Klima.
- Royale, groß, Sept.
- Sanguinole, Blutpfirsche.
- Teton de Venus, Sept. \*

# Weinreben.

Wo kein besonderer Preis bemerkt: pr. Stück 12 kr.

Von folgenden Wein- und Tafeltraubenforten können wir zum Theil sehr bedeutende Lieferungen übernehmen und wird dann der Preis nach Maassgabe der Aufträge ermässigt.

## Tafelsorten.

**Basilicum-Rebe (Bronner)** früh, äusserst delikat und süß, ganz neu fl. 1. 30 kr.  
**Blussard noir**, oder Jacobsttraube, von allen die früheste.  
**Bianca capella**, früh, schwach. 24 kr.  
**Brasilianer**, früh, schwach. 36 kr.  
**Chasselas blanc**, weisser Gutedel, früh, croquant, Krah-Gutedel, früh.  
**blanc musque**, weisser Gewürz-Gutedel  
**de Fontainebleau**, früh.  
**rouge**, rother, Gutedel, früh.  
**royale**, rother Königs-gutedel, roth vor der Reife, früh.

**Cornichon violet**, schwach.  
**Damas le gros**, spät.  
**Feigentraube**, köstlich 48 kr.  
**Gelbe Seidentraube**, früh.  
**Grüne Seidentraube**, früh.  
**Grosse Fleischtraube**, sehr groß.  
**Isabella (aus Amerika)**. pr. Stück 24 kr.  
**Liverdon**, blau, volltragend, im Sept.  
**Maroc**, blauer, langbeerigter, später.  
**Morillon hatif**, früh.  
**Morillon panaché**.  
**Muscat blanc**, weisser Muscat, mittelfrüh.  
**d'Alexandrie**, großer später.  
**gris**, graurother, mittelfrüh.  
**Lunel**.  
**noir**, schwarzer, mittelfrüh.  
**rouge**, dunkelrother, mittelfrüh.  
**violet**, blauer, mittelfrüh.

**Muscat-Traube (Bronner)** früh, übertrifft an seinem Aroma alle übrigen Muscatellerforten, ganz neu fl. 1. 30 kr.

**Orangen-Traube**, früh, extra 48 kr.  
**Orleans**, weiß, spät.  
**Petersilientraube**, weiß, früh.  
**Portugieser**, früh, schwarzblau, köstlich.  
**Précoce blanc de Kienzheim**, ganz früh, weiß.  
**Précoce de Malingre**, neu, weiß, sehr früh, in schwachen Exemplaren, fl. 1. 30 kr.  
**Raisin de Calabre**, neu, sehr groß, weiß, vorzüglich. pr. Stück fl. 1.  
**Rheingauer früher**, neu, vorzüglich, in schwachen Exemplaren. pr. Stück fl. 1. 30 kr.  
**Rosentraube**, schwach. 36 kr.  
**Tokay de Hongrie**, schwach. 24 kr.

**Tokay**, roth, spät.  
**Valteliner**.

**Wildbacher**, blau, sehr fruchtbar.  
**Gutedel (Chasselas)** und Rebstäuben unter einander ohne Namen pr. 12 Stück fl. 2.  
 pr. 100 " fl. 15.

In geringen Quantitäten abgeblüht:

**Albion**.  
**Auvernas blanc**.  
**Auvernas gris**.  
**noir**.  
**rouge clair**.  
**Blussard blanc**.  
**Coussi ou Querci noir**, früh, schwarzblau.  
**Früher Kilianer**.  
**Gentil noir**.  
**Gros Corinth**.  
**Gros Malaga**.  
**Gros perle blanche**.  
**Gros Rauschling**.  
**Grüner Sylvaner**.  
**Jouanen**.  
**Kischmischer**.  
**L'allemand rouge**.  
**Malvoisier blanche**.  
**rouge d'Italie**.  
**Ortliebscher**.  
**Petite Corinth**.  
**Perle rose**.  
**Riesling de Clairette**.  
**Rouge de Bourgogne**.  
**St. Laurent**, sehr früh, schwarzblau 24 kr.  
**Teinturier**.  
**Verjus**.

## Wein-Sorten.

**Blaue Müller-Rebe**. pr. Stück 6 kr.  
**Elben**, weißer.  
**Elben**, schwarzer.  
**Früher schwarzer Burgunder**.  
**Gelbhölzler**.  
**Gewürztraminer**.  
**Hartheinisch**.  
**Klebroth von Ingelheim**.  
**Malvoisier**, schwarzer.  
**Oestreicher**.  
**Orleans**, schwarzer.  
**Riesling**, weißer.  
**Rothsaftiger Färber**.  
**Ruländer**.  
**Sylvaner**.  
**Traminer**, schwarzer.  
**Trollinger**, kleiner.

## Verschiedene Obstarten.

**Äpfel Sibirische (Malus baccata)**, gut zum Einmachen. pr. Stück fl. — 24 kr.  
**Äpfelquitten**, halbst. — 24 " "  
**Birnquitten**, niederstämmig — 24 " "  
**hochstämmig** — 36 " "  
**gr. portugiesische** — 24 " "

**Feigen**, zu Spalier. fl. — 24 kr.  
**Himbeeren**, grosse gelbe u. rothe — 6 " "  
**Fastoff**, neue englische — 12 " "  
**Massons Trauben** — 12 " "  
**neue immertragende** — — —  
 von **Rivers** — 24 "



Himbeeren, Merveille des 4 saisons.  
pr. Stück fl. — 24 kr.

— Queen Victoria, neu,  
engl. — — 12 "

— Rothenbrg. Trauben- — — 12 "

Johannisbeeren, große, holländ.  
rothe, weiße u. fleischsch. — — 6 "

Grossceller cerise, oder neue  
Kirschenjohannisb. 12 kr. bis 24 "

Fertile, neue vieltragende Johannisbeere fl. 1. —

Hative, neue frühreifende — fl. 1. —

schwarze Black naples pr. St. fl. — 12 "

schwarze mit grüner Frucht — — 12 "

Kastanien, gr., süße, hochfl. — — 36 "

ditto grosse Maronen, h. — — 48 "

Kornelkirsche (*Cornus mas-*  
*culea*) . . . . . — 12 "

Mandel, süsse Damenman-  
del . . . . . — 48 "

süsse grossfrüchtige — — 48 "

Maulbeerbäume, schwarze,  
hochstämmige . . . fl. 1. 12 "

niederstämmige — — 48 "

klein, in Töpfen . . . — 36 "

Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem  
Verpflanzen nur unter guter Pflege an; ein Zu-

satz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feucht-

halten befördert die neue Bewurzelung.

Mispeln, Riesen-niederst. pr. Stück 24 kr.

Nussbäume, hochstämmig, — 24 "

Juglans fertilis (neue frühe. Waflnuss) nieder fl. 1.

Spierlinge (*Sorbus do-*  
*mestica*), hochst. pr. Stück fl. 1. 12 kr.

dieselbe niederst. — — 48 "

Stachelbeeren, große, engl. in 25 der besten Sorten  
pr. Stück 10 kr.

Grosse Hagebutten-Rosen — — 12 "

Grosse Haselnüsse . . . — — 8 "

Behauen des Landes und endlich Verpflanzung auf  
anderes wohlbereitetes Land nach jedesmaligem  
Verlauf von 3 Jahren. Nur unter diesen Bedingun-  
gen können sämtliche ältere u. neue Sorten den  
Erwartungen vollkommen entsprechen.

Ananas pr. 100 Stück 30 kr.

Monat- oder immertra-  
gende . . pr. 100 Stück fl. 1. — "

Zimmt- . . . — — 30 "

Ferner in geringerer Quantität.

Ananas, buntblättrige . . pr. Stück 12 kr.

Bath . . . . . pr. 6 Stück 24 "

Blanche de Bieton . . . — 24 "

Depford pine . . . . . — 24 "

Elton . . . . . — 24 "

Gefüllt blühende Monat- — — 24 "

Goliath . . . . . — 24 "

Grimstone . . . . . — 24 "

Keen's Seedling . . . — 24 "

Methven Castel . . . — 24 "

Princesse. Alice Maude . — 24 "

Twaminston Seedling . — 24 "

Willmott's superb . . . — 24 "

late scarlet . . . . . — 24 "

Mammoth . . . . . — 24 "

Premice de Bagnolet . . — 36 "

Princesse. royale . . . — 24 "

Prolific, ausgezeichnet schön — 24 "

Beehive, vortragend . . . — 24 "

Aigburgh Seedling . . . — 24 "

Black prince . . . . . — 24 "

Myatts new fertilised Haut-  
bois . . . . . pr. Stück 6 "

Barnes large white . . . — 6 "

Louise Marie . . . . . — 6 "

Sans pareille . . . . . — 6 "

St. Lambert . . . . . — 6 "

Triomphe de Liège . . . — 6 "

Atlète (Salter) . . . . . — 12 "

Victoria (Trollop) . . . — 12 "

## Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, reichen, gut  
gedüngten Boden, öfteres Begießen, wiederholtes

## Propfreiser.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe  
des Monates Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte,  
oder fl. 1. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen  
Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später  
durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Auf-  
merksamkeit zu deren Effectuierung verwenden können.

## Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Gegen

Anfang April lieferbar . . . . pr. 100 Stück fl. 2 24 kr.

— 1000 — „ 12 — „

Dreijährige Darmstädter . . . . — 100 — „ 1 50 „

— 1000 — „ 14 — „

**NB.** Die Ulmer Spargelpflanzen liefern sehr dicke, äusserst zarte, grüngefärbte Köpfe; die Darmstädter Sorte erreicht kaum die nämliche Stärke und Zartheit, bringt aber weisse Köpfe. Oft wird die Eine, oft die Andere vorgezogen. Uebrigens erreichen beide Sorten ihre höchste Vollkommenheit nur durch starke, etwa 1 bis 1½ Fuss dicke Düngerlage, öftere Düngung von Oben und möglichst nahrhafte, lockere Erde.

## Gehölz- und Bier-Sträucher.

Die mit \* bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus:

Jene mit **D** können dutzendweise,

— — **H** — hundertweise,

— — **h** — hochstämmig geliefert werden;

— — **t** sind in Töpfen cultivirt,

— — **sch** zeichnen sich durch schöne Blüthe besonders aus.

— — **hde** verlangen Haideerde oder ähnlichen Boden.

Acer, der Ahorn.

coccineum, **sch**, . . . . — 24

dasycarpum (*rubrum*), **h**, **D** . . . . — 20

coriaceum **h**, **D**, ausgezeichnet . . . . — 30

hyrcanum . . . . . — 24

laciniatum . . . . . — 24

monspesulanum, **D** . . . . — 24

Negundo, **h**, **D** . . . . — 18

ditto pr. 100 Stück fl. 20 bis 30 —

ditto ditto kleinere . . . . 10 —

laciniatum . . . . . —

pensylvanicum, (*tartaricum*), **h**, **D** . . . . — 20

nigrum americanum, **h** . . . . — 24

platanoïdes, **h**, **D** . . . . 12 bis 24

pseudo-platanum, **h**, **H** . . . . — 24

dissectum . . . . . 1 12

fol. var., **h**, **D** . . . . 18 —

atrosanguineum . . . . . 1

rubrum fol. var. . . . . — 24

sacharinum . . . . . — 20

striatum . . . . . — 24

Adelia acuminata, \*

Aesculus, die Roßkastanie.

Hippocastanum, **h** . . . . — 24

Hipp. fl. pleno . . . . . —

Aesculus Hipp. heterophylla . . . . 2 —

rubicunda, die rothblühende Kastanie,

prächtig als Allerbaum, für Schatten-

plätze und ähnl. Zwecke, in jeder

Stärke vorrätig und zwar, nieder-

stämmig . . . von 24 kr. bis — 36

hochstämmig von 36 kr. — 1 —

ditto pr. 100 Stück fl. 50 — 80 —

Aesculus rubicunda fol. var. die

rothblüh., mit bunten Blätt. fl. 1. bis

2 —

macrostachia (*Pavia spicata*),

ein schöner niederer Strauch 24 kr. bis

— 48

Pavia lutea, **h**, **D** . 30 kr. bis — 48

rubra, **h**, **D** . 30 kr. — — 48

californica, neu fl. 3 — 10 —

Akebia quinata, fr. Schlingpflanze . 1 30

Ailanthus, der Götterbaum.

glandulosus, **h**, **D** . 12 kr. bis — 24

Alnus, die Erle.

communis, **H** . . . . . — 6

cordata . . . . . — 24

laciniata . . . . . — 24

oxyacanthoides . . . . . — 24

quercifolia . . . . . — 24

Amorpha, der falsche Indigo.

canescens . . . . . — 12



	n.	kr.
<i>Amorpha crocea lanata</i> . . . . .	15	—
<i>emarginata</i> . . . . .	12	—
<i>fruticosa</i> . . . . .	12	—
<i>glabra, H</i> . . . . .	12	—
<i>Lewisii, D</i> . . . . .	15	—
<b>Amigdalus, die Mandel.</b>		
<i>communis fl. pleno, gefülltblühend</i>	24	—
<i>nana fl. albo</i> . . . . .	36	—
<i>serata</i> . . . . .	24	—
<i>glandulosa (Siebold)</i> . . . . .	24	—
<i>incana, sehr schön</i> . . . . .	30	—
<i>pumila, fl. pleno, gefüllte Zwergm.</i>	24	—
<i>ditto in schönen Kronbäumchen</i>	48	—
<i>pumila albo pleno (Prunus sinensis)</i> nen, schwache Pflanzen	5	—
<i>persica fl. pleno, gefüllte Pfeirsche</i>	30	—
<i>albo pleno</i> . . . . .	6	—
<i>coccineo pleno</i> . . . . .	6	—
<i>sibirica</i> . . . . .	18	—
<i>Ampelopsis Royleana</i> . . . . .	—	—
<b>Andromeda augusta, hde</b> . . . . .	36	—
<i>polifolia et var., hde</i> . . . . .	24	—
<i>racemosa, hde</i> . . . . .	48	—
<b>Aralia, der Angelicabaum.</b>		
<i>japonica (Siebold)</i> 30 kr. bis	1	—
<i>spinosa</i> . . . . . 24 " "	36	—
<i>edulis ? nicht holzartig</i> . . . . .	30	—
Die Aralien eignen sich wegen deren grossen gefiederten Blättern für Rasenplätze; sie lieben fette Misthaferde.		
<b>Arbutus, der Erdbeerbaum.</b>		
<i>Unedo, *</i> . . . . . 30 kr. bis	130	—
<i>procera, *</i> . . . . .	2	—
<b>Aristolochia, Osterluzey, Heberblume, Pfeifenstrauch.</b>		
<i>Sipho, D, rankend, trefflich zu Lauben, Epaliree u.</i> . . . . .	24	—
<b>Aucuba, japonica, *, t, hde</b> 24 kr. bis	1	—
<i>latimaculata, *, t, hde</i> 36kr. bis	130	—
<b>Azalea, die Azalee für's freie Land.</b>		
<i>cal. Sterniana (R.) großblumigt</i>	130	—
<i>Cristata (R.) scharlach</i> . . . . .	230	—
<i>sanguinea (R.) dunkelblutroth</i>	230	—
<i>astreans (R.) orange-scharlach</i>	2	—
<i>Meteor (R.) ditto</i> . . . . .	2	—
<i>pulehella roseola (R.) rosa</i>	2	—
<i>p. albo pleno (R.) gefüllt, weiss</i> . . . . .	130	—
<i>coccinea arbusta, feurig scharl.</i>	2	—
<i>maxima, prächtig feuerfarb</i>	130	—
<i>fulgens, ditto</i> . . . . .	130	—
<i>excelsa ditto</i> . . . . .	130	—
<i>fenestra, rosa mit orange</i> . . . . .	112	—
<i>Saturnea, dunkelrosa</i> . . . . .	130	—
<i>Mortieriana, rosa mit orange</i> . . . . .	112	—
<i>cuprea splendens, dunkelrosa</i>	112	—
<i>elegantissima, ditto</i> . . . . .	112	—
Diese 16 Prachtsorten zusammen für	24	—

Unsere neuen gefülltblühenden		
<i>Azalea pontica</i> , worunter namentlich <i>A. p. Graf v. Meran</i> , <i>Chromatella</i> und andere im letzten Frühjahr Bewunderung erregten, können erst im Herbst 1854 ausgegeben werden.		
<i>nudiflora, calendulacea, coccinea, cuprea, pontica etc.</i> in vielen ausgewählten Farben 48 kr. bis	2	—
<i>ditto pr. 12 Stück fl. 8.</i> bis	15	—
<i>ditto n 100 n n 50. n</i>	80	—
Die Azaleen bedürfen guter Laub-Holz- oder Wald-Erde, etwas feuchte, beschattete Lage und leichte Bedeckung, wenn über 15° Reaumur Kälte eintritt. Bei solcher Vorsorge wird eine in ihrer Pracht noch weit zu wenig gekannte Flor erzielt.		
<b>Berberis, die Berberis, Sauerach.</b>		
<i>aristata</i> . . . . .	24	—
<i>canadensis</i> . . . . .	24	—
<i>vulgaris, H</i> . . . . .	6	—
<i>fol. atropurpurea</i> , mit dunkelrothem Laub, äusserst auffallend, sehr geeignet für Rasenplätze	36	—
<i>vulgaris glauca</i> . . . . .	48	—
<i>fr. albo</i> . . . . .	36	—
<i>Knightsii *</i> . . . . .	130	—
<i>nepalensis, *</i> . . . . .	1	—
<i>Lycium, *</i> . . . . .	1	—
<i>dealbata, *</i> . . . . .	130	—
<i>rotundifolia</i> . . . . .	1	—
<i>sp. North-India, *</i> . . . . .	130	—
<i>Mahonia aquifolium, D</i> . . . . .	24	—
<i>flart</i> . . . . . 24 kr. bis	112	—
<i>fascicularis, D</i> . . . . .	24	—
<i>flart</i> . . . . . 24 kr. bis	112	—
<i>latifolia</i> . . . . .	1	—
<i>repens, D</i> . . . . .	24	—
<i>flart</i> . . . . . 24 kr. bis	112	—
<i>hybrida</i> . . . . .	1	—
<i>Fortunei, *</i> . . . . . fl. l. bis	230	—
<i>trifoliata, *</i> fl. l. 30 kr.	3	—
mehrere Sorten unter einander		
<i>pr. 12 Stück</i>	4	—
<i>pr. 100 Stück</i>	25	—
Die Mahonien verdienen als ausgezeichnete immergrüne, schönblühende und beerentragende Pflanzen allgemeine Verbreitung, um so mehr, da sie sich seit Jahren an unseren Winter gewöhnt haben und in schattigen und sonnigen Lagen überall kräftiger gedeihen, als meistens die Stechpalme. (Ilex.)		
<b>Berchemia volubilis, *, rankend</b>	36	—
<b>Betula, die Birke.</b>		
<i>alba, h, H</i> . . . . . 12 kr. bis	18	—
<i>laciniata, sehr schön</i> . . . . .	1	—
<i>pendula (heterophylla)</i> . . . . .	1	—
<i>tristis</i> . . . . .	—	—
<i>nigra</i> . . . . .	24	—
<i>fruticosa, t, zwergf.</i> . . . . .	30	—
<i>pumila (naun) t zwergf.</i> . . . . .	30	—

**Bignonia, die Trompetenblume.**

Catalpa, <b>h, II</b> , je nach Größe 24 kr. bis	48
caerulea (?) Zwergform . . . . .	36
Catalpa Bungei neu . . . . .	2
radicans, rankend, schön <b>D</b> . . . . .	12
humilis, <b>t</b> , gefüllblumig . . . . .	36
flava, gefüllblumig . . . . .	36
sanguinea . . . . .	1 12
capreolata, *, <b>t</b> . . . . . 24 kr. bis	36
crucigera, *, <b>t</b> . . . . . 24	48
grandiflora, *, <b>t</b> . . . . . 48 kr. bis	1 12
atrosanguinea . . . . .	1
purpurea . . . . .	1 12

Die 5 letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt und mit Laub bedeckt; — eine geringe Mühe für so prächtige Blumen! —

**Billardiera purpurea** \*, hält unter Bedeckung recht gut aus 30 kr. bis

**Broussonetia**, Papier = Maulbeerbaum.

papyrifera . . . . .	12 kr.
dissecta, neu mit gefülligt. Blätt.	
fl. 1 bis	2

**Budleja Lindleyana** \* . . . . . 24

**Buxus, der Buchsbaum.**

arborescens, <b>II</b> , der hochwachsende . . . . .	18
stark . . . . . 24 kr. bis	36
latifolius . . . . .	24
fol. var. albis, buntblätt. . . . .	18
luteis, ditto . 18 kr. bis	24
chinensis longifolia . . . . .	1 30
rotundifolia . . . . .	—
nana fol. var . . . . .	—
rosmarinifolia . . . . .	—

**Callicarpa Murasacki** (fälschlich *Deutzia gracilis*) . . . . . 24

ditto . . . . . pr. 12 Stück

**Calophaca wolgarica.**

**Calycanthus, der Gewürzstrauch.**

floridus, <b>D</b> , duftet am stärksten . . . . .	36
fertilis . . . . .	—
hevigatus, <b>D</b> . . . . .	36
macrophyllus, neu . . . . . fl. 1 bis	3
præcox ( <i>Chimonanthus</i> ) blühet im Decemb. und Jan. bei gelind. Wett. , <b>D</b> . . . . . fl. 1 bis	2
grandiflorus . . . . . fl. 2 bis	3
fl. albo . . . . .	—

**Caragana, f. Robinia.**

**Carya, f. Juglans.**

**Catalpa, f. Bignonia.**

**Ceanothus, die Seckelblume.**

americanus, schönbüchend 12 kr. bis	18
Baumanianus . . . . .	—
ovatus, blaublühend, *, <b>t</b> . . . . .	24
fl. pallido * <b>t</b> . . . . .	24
cuneifolius, neu . . . . .	1 30

Ceanothus dentatus, neu . . . . .	1 30
integerrimus . . . . .	1 30
rigidus, neu . . . . .	1 30
papillosus . . . . .	1 30

**Celastrus, Bügelholz, Baum-Mörder.**

scandens, rankender . . . . .	20
-------------------------------	----

**Celtis, der Bärzelbaum.**

australis . . . . .	12
cordata . . . . .	12

**Cephalanthus, die Kopfblume.**

occidentalis, sch, kleine Pflanzen . . . . .	12
--	----

**Cerasus ilicifolius, neu** . . . . . 3

**Cercis, der Judasbaum.**

canadensis, sch, . . . . .	20
japonica . . . . .	—
siliquastrum, sehr schön . . . . .	18

**Chimonanthus, f. Calycanthus.**

**Chionanthus, die Schneebume**

(verlangt feuchten Stand-Ort).

virginica, sch, <b>D, II</b> , Zaunpflanzung . . . . .	30
montana, sch, <b>D</b> ditto . . . . .	30
longifolia, auf die vorhergehenden veredelt, sehr willig und schön blühend, für nicht zu trübene Tagen sehr zu empfehlen . . . . .	1 12

**Clematis, die Waldbrebe, rankend.**

Viticella var., <b>D</b> . . . . .	12
fl. pleno . . . . .	1
Lassianthus . . . . .	24
flammula . . . . .	12
grata . . . . .	12
integrifolia . . . . .	12
azurea grandiflora *, prächtig . . . . .	1
Sieboldi, ( <i>bicolor</i> ) *, ditto . . . . .	1
florida fl. pleno * . . . . .	1

Die 3 letzteren sind wirkliche Prachtblumen, welche unter mäßiger Bedeckung der strengsten Kälte widerstehen.

grandiflora . . . . .	—
macrophylla . . . . .	—
odoratissima . . . . .	—
tubulosa mongolica . . . . .	24

**Clethra, alnifolia, verlangt halbe Erde**

pubescens, ditto . . . . .	24
----------------------------	----

**Colutea, der Blasenstrauch.**

arborescens, <b>II</b> . . . . .	6
----------------------------------	---

**Corechorus (Kerria), japonica, sch**

fl. simpliciter . . . . .	8
---------------------------	---

**Coriaria, der Berberstrauch.**

nepalensis * <b>t</b> . . . . .	24
myrtifolia . . . . .	12

**Cornus, der Hartriegel.**

alba, <b>II</b> . . . . .	6
alternifolia . . . . .	12
mascula (Kornelstische) . . . . .	12
paniculata . . . . .	8



	n. kr.		n. kr.
<i>Cornus stricta</i> . . . . .	6	Die <i>Crataegus</i> zeichnen sich durch	
fol. var. . . . .	12	Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte	
<i>verucosa</i> . . . . .	24	aus, besonders schön sind der neue roth-	
<b>Coronilla, der Pestschen.</b>		blühende und der rothgefüllt blühende, die	
<i>Emerus</i> , sch, <b>D</b> . . . . .	8	wir jedem Garten empfohlen. Die Exemplare	
<b>Corylus, die Haselnuß.</b>		lassen nichts zu wünschen übrig.	
<i>americana</i> , . . . . .	10	<b>Cryptomeria, unter den Na-</b>	
<i>avellana</i> fr. maxima, <b>D</b> . . . . .	8	delshölzern.	
fol. aureis, neu . . . . .	48	<b>Cupressus, unter d. Nadelshölzern.</b>	
<i>atropurpurea</i> , mit dunkelrothen Blättern	30	<b>Cydonia, die Quitte.</b>	
<i>lacinata</i> , mit geflügelten Blättern . . . . .	30	<i>vulgaris pyramidalis</i> , Wienquit. 6 kr. bis	24
<i>californica</i> . . . . .	—	<i>lusitanica</i> , große portugiesische . . . . .	24
<b>Cotoneaster (Mespilus), Quit-</b>		<i>japonica</i> ( <b>Pyrus</b> ), <b>D</b> , die ja-	
tenmispel.		pantische, mit prächt. scharlach-	
<i>compta</i> . . . . .	48	rothen Blüthen; eine Zierde für	
<i>denticulata</i> , * . . . .	36	jeden Garten . . . . .	1
<i>marginata</i> . . . . .	30	fl. albo . . . . .	48
<i>mycophylla</i> , * . . . .	24	fl. atrosanguinea, neu fl. 1 bis	2
<i>thymifolia</i> . . . . .	36	<i>rosea</i> . . . . .	1 12
<i>ovalifolia</i> , * . . . .	30	<b>Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum.</b>	
<i>tomentosa</i> . . . . .	24	<i>alpinus odoratus</i> , . . . . .	18
<i>rotundifolia</i> , * . . . .	24	fl. albedo . . . . .	24
<i>Royleana</i> . . . . .	—	<i>capitatus</i> . . . . .	10
<i>vulgaris</i> . . . . .	18	<i>nigricans</i> . . . . .	10
<b>Crataegus, der Dorn.</b>		<i>elongatus</i> (falsch <i>volgaricus</i> ) . . . . .	10
<i>coccinea</i> . . . . .	18	ditto halbhochstämmig . . . . .	36
<i>grandiflora</i> . . . . .	24	<i>sessilifolius</i> . . . . .	12
<i>Crus galli</i> . . . . .	24	<i>Laburnum</i> , h, <b>H</b> . . . . .	18
<i>Celsiana</i> . . . . .	24	<i>Adami</i> h, <b>D</b> . . . . .	24
<i>canadensis</i> ( <b>Mespilus</b> ) . . . . .	24	<i>Parksi</i> . . . . .	—
<i>cretica</i> ( <b>Pyrus</b> ) . . . . .	30	<i>pendulum</i> , h . . . . .	24
<i>cordata</i> . . . . .	24	<i>involutum</i> h, <b>D</b> . . . . .	24
<i>glandulosa</i> . . . . .	24	<i>purpureus</i> , reißblühend . . . . .	24
<i>Aria</i> . . . . .	24	schöne Kronenbüschchen, 36 n n	48
<i>glabra</i> * ( <b>Photinia</b> ) . . . . .	30	fl. albo, weißbl. . . . .	24
<i>pruinosa</i> . . . . .	24	schöne Kronenbüschchen, äußerst zier-	
<i>nivea</i> . . . . .	24	lich. <b>D</b> . . . . .	1 12
<i>flava</i> . . . . .	24	<i>roseo</i> , hellrothbl. <b>D</b> . . . . .	24
<i>crenulata</i> , * . . . .	36	Kronenbüschchen . . . . .	48
<i>elliptica</i> . . . . .	24	Sämmtliche <i>Cytisus purpureus</i> eignen sich	
<i>tomentosa</i> . . . . .	30	auch vortreflich für die Blumen-Treiberei.	
<i>Douglasii</i> . . . . .	36	<b>Daphne, der Seidelbast.</b>	
<i>odorata</i> . . . . .	24	<i>Blagayana</i> . . . . .	—
<i>odoratissima</i> . . . . .	24	<i>Cneorum</i> . . . . .	24
<i>lucida</i> . . . . .	24	maximum *, t . . . . .	1 12
<i>nepalensis</i> , * . . . .	36	<i>Laureola</i> , t . . . . .	—
<i>pentagynae</i> . . . . .	24	<i>Mezerium</i> . . . . .	6
<i>nigra</i> . . . . .	24	<b>Deutzia scabra</b> , sehr schön 12 kr. bis	24
<i>tanacetifolia</i> . . . . .	24	<i>gracilis</i> , neu, ist wegen entworfenen	
<i>orientalis</i> . . . . .	24	blumistischem Werthe vielfach ge-	
<i>macrocartha</i> . . . . .	30	trübt worden . . . . .	1
<i>oxyacantha</i> , Weisporn . . . . .	6	<i>Godohokeri</i> . . . . .	30
albo pleno, ditto gefüllt . . . . .	24	<i>sanguinea</i> . . . . .	30
hochstämmig . . . . .	36	<i>crenata</i> . . . . .	24
<i>rubra</i> , reißblühend . . . . .	24	<b>Edgeworthia chrysantha</b> *	—
<i>ruberrima</i> , gr. dunkelrothblühender	30	<b>Eleagnus, Oleaster, wilder Delfbaum.</b>	
hochstämmig . . . . .	48	<i>angustifolius</i> , <b>D</b> , wohlriechend . . . . .	24
<i>rubra plena</i> , reiß gefüllt blü-	—	<i>macrophyllus</i> , mit Silberblättern . . . . .	24
hend . . . . .	48	<i>arborescens</i> ( <i>orientalis</i> ) . . . . .	24
hochstämmig . . . . .	1 12	<i>fusca</i> . . . . .	24
		<i>reflexa</i> *, t . . . . .	24

	fl. kr.		fl. kr.
<b>Epigaea repens</b> , hde. *		<b>Genista</b> , die Ginster.	
<b>Erica</b> , die Heide, verlangt Wald- Erde.		anglica . . . . .	18
ciliaris, *, t . . . . .	24	Barclayana, * . . . . 24 kr. bis	48
cinerea, *, t . . . . .	24	florida . . . . .	18
Dabœcia, *, t . . . . .	24	floribunda, *, t . . . . .	24
alba, *, t . . . . .	36	pubescens, t . . . . .	24
hibernica, *, t, . . . . . 24 kr. bis	48	spartioides, vorzüglich schön und dauerhaft	30
herbacea, t . . . . .	24	ditto schöne halbhäumige Kronbäum- chen, sehr empfehlenswerth . . . . .	48
Mackayana, *, t . . . . .	24	scoparia, fl. albida . . . . .	24
tetralix . . . . .	24	scoparia fol. var. . . . .	24
vagans pallida, *, t . . . . .	36	tinctoria, fl. pleno . . . . .	24
vulgaris, fl. pleno, t, . . . . .	24	<b>Ginkgo</b> , Ginkgobaum.	
<b>Ephedra</b> , monostachia . . . . .	24	biloba ( <i>Salisburia</i> ), sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt, Samenpflanzen	
<b>Eurybia ilicifolia</b> , * fl. 1.30 kr. bis	3	fl. 1 bis	2 30
<b>Evonymus</b> , Spindelbaum, Pfaf- fentäppchen.		<b>Gleditschia triacantha</b> , h, D 24 kr. bis	36
latifolius . . . . .	15	inermis, h, D . . . . . 24 " "	36
Hamiltonianus, * . . . . .	24	caspica, h, D . . . . . 24 " "	36
europæus . . . . .	6	macrocantha . . . . .	1
repens, *, t . . . . .	24	<b>Glycine</b> .	
linifolius, *, t . . . . .	24	chinensis ( <i>Vistaria</i> ), blaublühende windende Gracypflanze, Kultur und aus- dauernd wie der Weinstock. 24 kr. bis	2
ditto auf Hochstämmchen . . . . .	36	ditto . . . . . pr. 12 Stück	4
japonicus, f. var. albis, * 20 kr. bis	1	ditto . . . . . pr. 100 " "	25
luteis, *, t 24 " "	1 12	fl. albo, dieselbe weißblühend, ganz neu, starke Pflanzen . . . . .	12
<b>Fagus</b> , die Buche.		<b>Gymnogladius</b> ( <i>Guilandina</i> ).	
Castanea, Zäpfstanie, h . . . . .	36	canadensis, h, D . . . . . 24 kr. bis	36
Cunninghami * . . . . .	—	<b>Halesia</b> .	
sylvatica asplenifolia . . . . .	48	tetraptera, sehr schönblühender Strauch, der oft in reinem Sande, sicher aber in Heide-Erde gedeiht . . . . .	36
atropurpurea, D . . . . .	48	<b>Halimodendron</b> , der Salzstrauch.	
fol. var. . . . .	—	argenteum ( <i>Robinia haloden-</i> <i>dron</i> ), einer der vorzüglichsten schön- blühenden Gehsträucher . . . . .	48
pendula, Trauerbuche 48 kr. bis	1 12	<b>Hedera</b> , Ephen.	
cristata . . . . .	48	Helix, Wald-Ephen . . . . .	6
<b>Forsythia viridissima</b> , neu aus China,	24	fol. var., buntblättrig . . . . .	24
<b>Fraxinus</b> , die Esche.		algeriensis . . . . .	24
americana, h, D . . . . .	24	arbuscula . . . . .	1
californica . . . . .	—	digitata nova . . . . .	24
excelsior, h, D . . . . .	18	leucocarpa, mit weißen Beeren . . . . .	24
nurea, mit gelbem Holz . . . . .	24	chrysocarpa, mit gelben Beeren . . . . .	24
crispa, mit traufem Blatt. . . . .	24	taurica, halbbuntbl. 24 kr. bis	1
heterophylla, . . . . .	48	latifolia, breitblätt. engl. Ephen, sehr schnell wachsend, für Zimmer geeignet . . . . . 12 kr. bis	24
nana, Zwergf. . . . .	48	ditto pr. 12 Stück fl. 2. bis	4
pendula, Traueresche, h, 48 kr. bis	1 12	ditto pr. 100 Stück fl. 15. bis	20
horizontalis . . . . .	24	latifl. fol. var., neue engl. buntbl. . . . .	1 30
integrifolia . . . . .	24	<b>Roegneriana</b> , *, gr. herzblätt. neuer Ephen vom Kantafas 24 kr. bis	1 30
microphylla . . . . .	24	quinquefolia ( <i>Ampelopsis hede-</i> <i>racea</i> , Jungfernevein) . . . . .	6
myrtifolia . . . . .	36	ditto . . . . . pr. 100 Stück	7
Ornus, Manna-Esche . . . . .	24	fol. var., *, buntblätt. . . . .	20
floribunda . . . . .	30		
latifolia, schönblühend . . . . .	48		
lentiscifolia pendula 24 kr. bis	48		
oxyacanthifolia . . . . .	48		
oxicarpa . . . . .	30		
rotundifolia . . . . .	30		
rufa . . . . .	36		
verucosa . . . . .	30		
Theophrasti . . . . .	36		
quadrangularis . . . . .	36		
<b>Gaultheria leucocarpa</b> , hde. *	2		



	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Hibiscus, Syrische Rose, Blumen-</b> <b>baum.</b>			<b>Ilex crassifolia</b> , * merkwürdig . . . . .	2	—
syriacus . . . . .	10	—	cordata * . . . . . fl. 1. bis	1	30
fl. albo . . . . .	12	—	fol. var. * . . . .	1	30
fl. albo pl. praecox . . . . .	24	—	cornuta, * . . . .	7	—
pulchello marmorato . . . . .	24	—	caroliniana, schön . . . . . 36 kr. bis	1	30
striato pleno . . . . .	36	—	Cunninghami . . . . .	1	—
syriac. speciosus 30 kr. bis	48	—	dipyrena * . . . . .	1	30
rubro pleno . . . . .	24	—	fureata . . . . .	7	—
violaceo pleno . . . . .	24	—	latifolia * (Siebold), sehr großblät.		
cæruleo semipl. . . . .	24	—	von Japan . . . . . fl. 1. bis	3	—
purpureo pl. . . . .	24	—	latispina . . . . .	2	—
striato superbo pl. . . . .	36	—	microcarpa . . . . .	3	—
cæruleo compacto pl. . . . .	36	—	nobilis . . . . .	1	12
<b>Hippophaë, Sanddorn.</b>			excoartata . . . . .	1	12
canadensis . . . . .	—	—	ovata . . . . .	1	30
rhamnoides . . . . .	10	—	opaca, sehr ausdauernd . . . . . 1. "	1	30
<b>Hydrangea altissima, *</b>	24	—	pendula . . . . .	2	—
cordata, schön . . . . . 18 kr. bis	24	—	Perado, * beh. fast. Eclat. fl. 1. bis	2	—
hortensis (die Portenja), *, D . . . . .	48	—	Tarayo * . . . . . fl. 1 bis	3	—
involucrata * . . . . .	1	30	Thunbergiana . . . . .	1	30
japonica (Siebold), * 24 kr. bis	48	—	vomitorea * . . . . .	1	30
japonica fol. var . . . . .	1	—	12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis	12	—
nivea (glauca) . . . . .	24	—	100 " " " " " 50 "	80	—
pubescens, neu . . . . . 48 kr. bis	1	30			
quercifolia, *, ausgezeichnet 24 " "	48	—			
<b>Hypericum, Hartheu, Johannisz-</b> <b>strand.</b>					
calycinum * . . . . . 6 kr. bis	12	—	Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur		
japonicum *, klein, gärtlich . . . . .	36	—	angemessenen Standort als Unterholz oder		
kalnianum . . . . .	24	—	Halbschatten in geschützter Lage oder auch		
<b>Jasminum, ächter Jasmin.</b>			im dichten Anschluss an andere Pflanzungen,		
fruticans D . . . . .	6	—	und hält dann die strengsten Winter aus,		
officinale, *, D, der Italienische, ran-			während frei gepflanzte Exemplare ebenso-		
tende, starkastende, verlangt nur leichte			wohl durch den vollen Einfluss der Hitze als		
Laubbede . . . . . 18 kr. bis	24	—	der Kälte verkümmern. — Uebrigens gehören		
triumphans, *, D . . . . . 18 kr. bis	24	—	sie zu den lebhaftesten immergrünen Zier-		
<b>Ilex, Hülse, Stechpalme.</b>			sträuchern.		
Aquifolium, f, D . . . . . 20 kr. bis	48	—	<b>Indigofera Dosua, *</b> . . . . .	24	—
arborescens, hochwachsend, . . . . .			<b>Juglans, der Walnußbaum.</b>		
sehr zu empfehlen . . . . . 48 kr. bis	1	12	americana, h, D, amerikanischer . . . . .	24	—
var. luteis gelbbunt 48 " "	1	12	alba, weißer amerikan. . . . .	30	—
marg. ditto gerändert . . . . .			cineria, von Amerika . . . . .	30	—
48 kr. bis	1	12	nigra, ditto . . . . .	30	—
albis, weißbunt . . . . . 48 kr. bis	1	12	sulcata, ditto . . . . .	30	—
viridis, grüngelbbl. 48 " "	1	12	regia, h, H, europäischer . . . . .	30	—
ferox, fast boshaft . . . . . 48 " "	1	12	fertilis, ditto, früh tragbar . . . . .	1	—
var. albis, ditto, weißbunt . . . . .			laciniata, geflügelblättrigster . . . . .	2	30
48 kr. bis	1	12	fraxinifolia (Pterocarya cauca-		
var. luteis, ditto, gelbbunt . . . . .			sica), in schöner Strauchform vom Kau-		
48 kr. bis	1	12	kasus, wird nur 15 bis 20 Fuß hoch		
lanecolatum (myrtifolium) . . . . .			und eignet sich wegen herrlicher Belau-		
kleinblättrigster . . . . . 48 kr. bis	1	12	bung einzeln auf Rasenplätze . . . . .	48	—
laurifolium var. . . . . 48 kr. bis	1	12	<b>Juniperus, Wachholder, bei den</b>		
calamistra . . . . . fl. 1. bis	2	—	<b>Nadelhölzern verzeichnet.</b>		
fol. var. . . . . fl. 1 bis	2	—	<b>Kalmia angustifolia, Heide-Gras 24 kr. bis</b>	36	—
cassine * . . . . .	—	—	glauca, sehr schön . . . . . 36 kr. bis	1	—
castanæifolia, * . . . . fl. 1. bis	1	30	glauca superba . . . . .	1	—
			latifolia . . . . . fl. 1 bis	2	—
			lucida . . . . .	1	—
			pumila rubra . . . . .	1	—
			<b>Kerria, f. Corchorus.</b>		
			<b>Röhlreuteria, paniculata, h, schön</b>	24	—

	fl. kr.		fl. kr.
<b>Laurus, der Lorbeer.</b>		<b>Magnolia precia (Yulan, conspicua),</b>	
Benzoïn . . . . .		fl. 2. bis	5 —
nobilis, *, t, verlangt starke Laubdecke	1 30	precia grandis aus unserer Samenucht, die Blumen sind rein weiß mit schwacher rotheter Zeichnung, und erreichen fast die Größe jener der	
sassafras, zweijährig . . . . .	36	M. grandiflora fl. 10. bis	18 —
<b>Ledum palustre</b>	24	precia cyathiflora (R.1853)	
<b>Ligustrum, Raimweide.</b>		groß, breitgeteilt, hellcarmoisin, mit weißem Rande; Außerblume . . .	18 —
japonicum *	24	purpurea, *, D . . . 48 kr. bis	3 —
nepalense, *, (Borrga lig.)	24	purpurea reflorescens, aus unserer Samenucht, mit sehr großen dunkelcarmoisinrothen Blumen fl. 4. bis	6 —
ovalifolium *	36	purpurea excelsa (R.), groß, dunkelcarmoisin . . fl. 4. bis	6 —
vulgare . . . . .	6	purpurea nigricans (R.), niedrig, dunkelcarmoisin fl. 3 bis	5 —
fr. albo . . . . .	12	speciosa . . . . . fl. 2 bis	3 —
fol. var . . . . .	24	triumphans . . . . .	—
<b>Liquidambar, der Amberbaum.</b>		Soulangiana . . . . .	—
Styraciflua . . . . .	36	striatiflora . . . . .	—
<b>Liriodendron, der Tulpenbaum.</b>		pyramidalis . . . . . fl. 2 bis	3 —
Tulipifera h. D, schöne Hochstämme	48	tripetala, D . . . 48 kr. bis	3 —
integrifolia . . . . .	1 12		
rubra? . . . . .	—		
<b>Lonicera, die Heckenkirsche.</b>			
cœrulea . . . . .	18		
fragrantissima, *, neu aus China, immergrün, soll den Winter hindurch blühen, wohlriechend . . .	3 —		
Ledebouri . . . . .	18		
tartarica, dunkelroth . . . . .	12		
sibirica, hellroth . . . . .	8		
Symphoricarpos . . . . .	6		
fol. var. . . . .	12		
Roylei *, neu . . . . .	24		
caprifolium (Weißblatt) . . . . .	8		
coccineum, ditto, hochroth . . . . .	24		
Fraserii, hochroth . . . . .	30		
Brownii ditto . . . . .	30		
flavum grandiflorum, gelb fl. novum, gelb . . . . .	24		
Douglasii, großbl., graugrün	36		
semperf. superbum . . . . .	24		
Goldii, gelb . . . . .	18		
macrophyllum, neu, groß . . . . .	48		
Magnevillea . . . . .	48		
occidentale . . . . .	48		
sempervirens hybrid. . . . .	24		
sinense *	24		
splendida *, neu, prächtig fl. 1 bis	2 —		
<b>Lycium, Becksborn.</b>			
europæum . . . . .	4		
<b>Maclura, die Dsagen-Orange.</b>			
aurantiaca . . . . . 35 kr. bis	1 30		
<b>Magnolia, acuminata, . . . . .</b>	1 30		
auriculata . . . . .	2 30		
cordata . . . . .	—		
glauca, D . . . . . 36 kr. bis	1 30		
gracilis, (Robus), D . . fl. 1 bis	3 —		
gigantea . . . . . fl. 2. 30 bis	3 30		
grandiflora, *, . . . 30 kr. bis	2 —		
macrophylla, prächtvoll fl. 3 bis	5 —		
Norbertiana ditto . . . . . fl. 2 bis	5 —		
		<b>Morua, der Maulbeerbaum.</b>	
		alba, weißer . . . . .	12
		Kaempferi . . . . .	—
		nigra, schwarzer . . . 48 kr. bis	1 12
		pensilvanica . . . . .	—
		papyrifera (Broussonetia)	18
		dissecta . . . . . fl. 1 bis	2 —
		<b>Neillia thyrsiflora, *, ganz neu fl. 1. bis</b>	2 30
		<b>Ononis, Haubehel.</b>	
		fruticosa . . . . .	12



	fl. kr.
<b>Pæonia</b> , Pfingstrose, Bauernrose.	
<i>arborea</i> ( <i>Moutan</i> ) fl. 1 30 bis	4 —
<i>atropurpurea</i> ( <i>Fortune</i> )	4 —
<i>papaveracea</i> . fl. 1 30 bis	2 —
<i>rosa gallica</i> . . . . .	2 30
<i>rubra odorata</i> . . . . .	3 —
<i>Leodiense</i> fl. 1. 30 kr. bis	3 —
<i>albicans pleno</i> fl. 1. 30 kr. bis	5 —
<i>Carl V.</i> ( <i>Schmelz</i> ) fl. 3 bis	8 —
<i>Deutsche Flagge</i> ( <i>Siebold</i> )	—
<i>Kenny</i> ( <i>Casoretti</i> ) . . . . .	5 —
<i>phœniceo pleno</i> . fl. 3 bis	2 —
<i>pomponia pleno</i> . . . . .	2 —
<i>regia</i> . . . . .	8 —
<i>rosea superba</i> , prachtvoll fl. 2 bis	10 —
<i>Elisabethae</i> ( <i>Casoretti</i> ) . . .	5 —
<i>trionphe de Malines</i> . . . . .	4 —
<i>de Van der Mælen</i> . . . . .	2 30
<i>Fürstin Metternich</i> . . . . .	2 30
— <i>Schwarzenberg</i> . . . . .	2 30
— <i>Lichtenstein</i> . . . . .	6 —
<i>Kaiser Leopold</i> . . . . .	8 —
<i>Albrecht Dürer</i> . fl. 4. bis	7 —
<i>Rococco</i> . . . . fl. 2. bis	7 —
<i>Rinzii</i> ( <i>Casoretti</i> ) . . . . .	8 —
<i>Van Houttei</i> ( <i>Casoretti</i> ) . . .	2 30
<i>Victoria</i> . . . . .	—
Unsere Pæoneen dürfen wir auf das ein-	
stimmigste Urtheil der sehr zahlreichen Besucher	
und Kenner als durchaus vorzüglich empfehlen.	
<b>Paliurus</b> , Christusdorn.	
<i>aculeatus</i> ( <i>Rhamnus</i> ), *, t . . .	— 24
<b>Paulownia imperialis</b> , D h, 30 kr. bis	1 —
Dieser herrliche japanische Zierbaum hat	
mehrere Winter unbedeckt überstanden	
und in deutschen Gärten geblühet.	
<b>Pavia californica</b> , neu fl. 3 bis	10 —
<b>Periploca græca</b> , Schlinge, eine schön-	
blühende kräftige Schlingepflanze . . .	— 12
<b>Philadelphus</b> , Pfeifenstrauch, un-	
ächter Jasmin.	
<i>californicus</i> , neu . . . . .	1 30
<i>coronarius</i> , gewöhnl. H . . . . .	— 8
fl. pleno, D . . . . .	— 18
<i>chinensis</i> , großblühend . . . . .	— 24
<i>Gordonianus</i> , ditto . . . . .	— 18
<i>gracilis</i> . . . . .	— 18
<i>grandiflorus</i> . . . . .	— 18
<i>inodorus</i> . . . . .	— 18
<i>laxus</i> . . . . .	— 18
<i>mexicanus</i> *, sehr zart 30 kr. bis	1 —
<i>nivalis</i> . . . . .	— 24
<i>latifolius</i> . . . . .	— 30
<i>speciosus</i> , besond. großblüh. . . . .	— 30
<i>thyrsiflorus</i> . . . . .	— 24
Sämmtliche Philadelphus empfehlen sich	
als blumeneiche Ziersträucher. Die neueren	
Sorten haben vor P. coronarius die Vorzüge,	
dass sie sehr fein, aber nicht zu stark duft-	
en, grösser und später blühen.	

	fl. kr.
<b>Phillyrea</b> , Steinlinde, immergrün.	
<i>angustifolia</i> , * . . . .	— 24
<i>latifolia</i> , * . . . .	— 24
<b>Pinus</b> , Kiefern, Föhren, Tannen	
und Fichten, bei den Nadel-	
hölzern.	
<b>Platanus</b> , die Platane.	
<i>occidentalis</i> , h, H . 24 kr. bis	— 48
ditto pr. 100, hochfl. fl. 40. bis	60 —
<i>umbraculifera</i> . . . . .	1 —
Die übrigen Sorten haben wir ihrer weit ge-	
ringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.	
<b>Podocarpus</b> , bei den Nadelhölzern.	
<b>Populus</b> , die Pappel.	
<i>alba</i> , Silberpappel, h . 12 kr. bis	— 24
<i>argentea vera</i> . . . . .	—
<i>balsamifera</i> , Balsampappel h 18 kr. bis	— 24
<i>betulefolia</i> . . . . .	— 24
<i>canadensis</i> , h . . . 18 kr. bis	— 24
<i>grandidentata</i> , h . 18 " "	— 24
<i>Hudsonia</i> . . . . .	— 24
<i>italica</i> , h, H . . . 12 kr. bis	— 24
<i>laurifolia</i> . . . . .	— 24
<i>pendula</i> . . . . .	—
<i>suaveolens</i> . . . . .	— 24
<b>Potentilla</b> , Fünffingerkraut.	
<i>fruticosa</i> . . . . .	— 12
<i>davurica</i> , wird nur 1 Fuß hoch sehr	
niedlich . . . . .	— 24
<i>parvifolia</i> . . . . .	—
<b>Prunus</b> , die Pflaume.	
<i>chicasa</i> ( <i>insiticia</i> ) . . . . .	— 24
<i>spinosa</i> , fl. pleno, sehr zierlich . . .	— 24
<b>Cerasus</b> , die Kirsche.	
<i>avium</i> , fl. pleno, gefüllte Kirsche	— 30
fl. pleno, ditto . . . . .	— 24
<i>pygmaea</i> ( <i>Maryland</i> ) . . . . .	— 30
<i>Laurocerasus</i> , *, Kirschleberre . . .	— 24
<i>angustifolius</i> . . . . .	— 24
<i>colchicum</i> . . . . .	— 30
<i>ilicifolius</i> , * neu . . . . .	3 —
<i>lusitanica</i> , *, immergr. 24 kr. bis	— 36
<i>Mahaleb</i> , Weichsel . . . 6 kr. bis	— 12
<i>Padus</i> , H . . . . .	— 8
var. . . . .	— 12
<i>persicifolia</i> . . . . .	— 24
<i>pumila</i> ( <i>glauca</i> ) . . . . .	— 24
<i>virginiana</i> . . . . .	— 20
<b>Ptelea</b> , Lederbaum, Geldbaum.	
<i>trifoliata</i> . . . . .	— 8
<b>Pterocarya</b> , caucasica, kraushäutiger	
Waldungsbau vom Kaukasus . . . . .	— 48
<b>Pyrus</b> , Apfel, Birne, Quitte.	
<i>communis</i> fol. var. . . . .	— 24
<i>Malus baccata</i> , ährisch. Apfel . . .	— 20
<i>spectabilis</i> fl. pleno, gef. Apfel	— 24
<i>japonica</i> ( <i>Cydonia</i> ), D, japanische	
Quitte mit prächt. charact. Blüten;	
eine Pflanze f. jed. Gart. 24 kr. bis	1 —
fl. albo, weifl. . . . .	1 —

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Pyrus</i> jap. <i>atrosanguinea</i> , neufl. 1 bis	2	<b>Rhus</b> , <i>Sumach</i> .	
jap. <i>rosea</i> . . . . .	1 12	<i>Cotinus</i> ( <i>Perückenbaum</i> ) . . . . .	18
<i>salicifolia</i> . . . . .	20	<i>Vernix</i> . . . . .	18
<i>cretica</i> . . . . .	30	<b>Ribes</b> , <i>Johannisbeerstaude</i> .	
<i>pinnatifida</i> ( <i>Sorbus</i> ) . . . . .	30	<i>aureum</i> ( <i>palmatum</i> ), <b>D</b> . . . . .	12
<i>Sieveriana</i> . . . . .	—	<i>Bridgesii</i> . . . . .	30
<b>Quercus</b> , die <i>Eiche</i> , <i>agilops</i> . . . . .	1	<i>acerifolium</i> . . . . .	24
<i>coccinea</i> . . . . .	48	<i>asplenifolium</i> . . . . .	1
<i>bicolor</i> , . . . . .	30	<i>atropurpureum</i> . . . . .	—
<i>Catesbaei</i> . . . . .	1	<b>Gordonianum</b> , ein vorzüglicher	
<i>Cerris</i> , . . . . .	48	Essast. zwischen <i>aureum</i> und <i>San-</i>	
fol. var. . . . .	—	<i>guineum</i> mit orangef. Blätter. <b>D</b> .	24
<i>coccifera</i> , *, t. . . . .	48	<i>sanguineum</i> , rothblühend, <b>D</b> . . . . .	24
<i>filicifolia</i> . . . . .	—	fl. pleno, roth gefüllt . . . . .	1 12
<i>heterophylla</i> ( <i>fastig. cucullata</i> )	3 30	<i>macrobotrys</i> . . . . .	24
<i>laciniata</i> . . . . .	1 30	<i>cerasiforme</i> . . . . .	24
<i>laurifolia</i> . . . . .	1	<i>nigrum</i> . . . . .	6
<i>macranthera</i> . . . . .	—	<i>grossularia</i> . . . . .	10
<i>pendula</i> . . . . .	1 30	<i>rubrum</i> . . . . .	6
<i>nigra</i> . . . . .	48	<b>Robinia</b> , <i>Alfäzie</i> .	
<i>pseudosuber</i> . . . . .	1 30	<i>pseudoacacia</i> , <b>II</b> , h . 6 kr. bis	24
<i>prinos discolor</i> . . . . .	48	<i>Bessoniana</i> , hochstämmig . . . . .	1
<i>macrophylla</i> . . . . .	1	<i>hispida</i> , rothblühend . . . . .	20
<i>pyramidalis</i> ( <i>fastigiata</i> ) 48 kr. bis	1 30	ditto hochstämmig . . . . .	48
pr. 12 Stück fl. 10. bis	15	<i>hispida complexa</i> , eine	
<i>robur</i> fol. var. . . . .	1	neue prächtig großblühende, hoch-	
<i>rubra</i> . . . . .	30	stämmig . . . . .	2
<i>palustris</i> . . . . .	30	niederstämmig . . . . .	1
<i>Jlex</i> * t. . . . .	48	<i>inermis</i> , Kugelfäzie, <b>D</b> . . . . .	24
<b>Rhamnus</b> <i>oleaeifolius</i> *, von Californien	1	ditto hochstämmig, <b>D</b> . . . . .	48
<b>Rhododendron</b> , die <i>Alpenrose</i> . <i>he</i>		<i>rubra</i> ( <i>Goudouin</i> ), schön	
<i>azaloides</i> * . . . . .	48	und dauerhafter als die alte	
<i>Cartoni</i> , *, . . . . .	1	Kugelfäzie <b>D</b> 24 kr. bis	36
<i>Gowenianum</i> * . . . . .	1	ditto hochst. <b>D</b> . fl. 1 n	1 30
<i>Catawbiense</i> u. var. 36 kr. bis	1 30	<i>involuta elegans</i> , ( <b>R</b> .)	
<i>campanulatum</i> hybr., diese Erzeug-		äußerst zierlich in Zweigen und	
nisse auf unserer Zamenzucht von <b>R. cam-</b>		Blättern geträumt hochst. . . . .	2
<b>panulatum</b> verdienen die häufigste		niederstämmig . . . . .	1
Verbreitung wegen ihres baumartigen,		<i>microphylla</i> , <b>D</b> 36 kr. n	48
ausgebreiteten Wuchses, Größe der Blumen,		<i>pendula</i> . . . . . 48 n n	1 12
und Dauerhaftigkeit im Winter, wodurch sie		<i>spectabilis</i> , . . . . .	24
den gewöhnlichen <b>R. ponticum</b> , welchen		<i>stricta</i> . . . . .	30
bei strenger Kälte oft leidet, weit übertreffen!		<i>tortuosa</i> . . . . . 30 kr. bis	48
fl. 2. bis	20	<i>macrophylla</i> . . . . .	24
<i>fastuosum</i> flor. pl. fl. 1. 30 kr. bis	5	<i>viscosa</i> , hellrothbl. <i>Dehatazie</i> , <b>D</b>	24
<i>dauricum atrovirens</i> , blühet schon		ditto hochstämmig 36 kr. bis	48
im März . . . . . 36 kr. bis	1 30	<i>hybrida</i> . . . . .	24
<i>ferrugineum</i> , Alpen . . . . .	1	<i>cylindrica</i> . . . . .	36
<i>hirsutum arborescens</i> , ditto . . . . .	1	<i>elegantissima</i> . . . . .	36
fol. var. . . . .	1	<i>formosa</i> . . . . .	36
<i>ponticum</i> und var. . 30 kr. bis	1	<b>Caragana</b> , <i>Erbfenbaum</i> , gelbblüthig, <b>II</b>	8
hydr. <i>caucasicum</i> , fast weiß, sehr		<i>Chamlagu</i> , sehr schön . . . . .	36
ausdauernd, niedrig . . fl. 1. bis	1 30	<i>ferox</i> , sehr schön . . . . .	30
<i>crispum</i> . . . . . n 1. n	1 30	<i>frutescens</i> . . . . .	10
fol. var. . . . . n 1. n	1 30	<i>Halodendron</i> , sehr schön roth-	
<i>maximum</i> und var. . 36 kr. bis	1 30	blühend . . . . .	48
<i>hyacinthiflorum</i> . . . . fl. 1. n	3	<i>gracilis</i> . . . . .	36
<i>guttatum</i> . . . . . n 1. n	3	<i>jubata</i> . . . . .	—
<i>Lowii</i> . . . . . n 1. n	3	<b>Rosa</b> , im betreffenden Verzeichnisse.	
<i>multimaculatum</i> . . . . n 1. n	3	<b>Rubus</b> , <i>Brombeere</i> , <i>Simbeere</i> .	
<i>Vervaeianum</i> fl. pl. fl. 1. 30 kr. bis	5	<i>fruticosus</i> , fl. albo pleno . . . .	24



	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Rubus bellidiflorus pleno</b> . . . . .	—	24	<b>Spiraea hypericifolia, II</b> . . . . .	—	6
<i>laciniatus</i> . . . . .	—	24	<i>flexuosa, D</i> . . . . .	—	10
<i>nobilis</i> . . . . .	—	24	<i>laevigata</i> . . . . .	—	24
<i>roseiflorus, fl. pleno</i> . . . . .	—	24	<i>lanceifolia</i> . . . . .	—	20
<i>odoratus, D</i> . . . . .	—	8	<i>Lindleyana, *, II</i> . . . . .	—	24
<i>Ideus, II</i> . . . . .	—	6	<i>opulifolia, II</i> . . . . .	—	8
<b>Ruscus, Mäufedorn, immergrün.</b>			<i>Pitkowiensis</i> . . . . .	—	24
<i>Hypophyllum * D, t</i> . . . . .	—	24	<i>prunifolia pleno, D, II, sehr schön</i>		
<b>Salisburia, f. Ginfgo.</b>			<i>gefüllt</i> . . . . .	18 kr. bis	24
<b>Salix, die Weide.</b>			<b>Reevesi (Humanni), ausgezeichnet</b>		
<i>babylonia, Trauerweide, h</i> . . . . .	—	24	<i>schön D</i> . . . . .	—	24
<i>cornuta, D, krautblät.</i> . . . . .	—	24	<i>rotundifolia</i> . . . . .	—	24
<i>argentea, Silberweide</i> . . . . .	—	24	<i>salicifolia, II</i> . . . . .	—	4
<i>caprea tricolor, bunte</i> . . . . .	—	24	<i>ruberrima</i> . . . . .	—	24
<i>canadensis</i> . . . . .	—	20	<i>sorbifolia</i> . . . . .	—	10
<i>laurifolia, breitblättrige</i> . . . . .	—	24	<i>vaccinifolia</i> . . . . .	—	24
<i>nigra pendula</i> . . . . .	—	24	<i>venustula</i> . . . . .	—	24
<i>hochstämmig</i> . . . . .	1	30	<b>Staphylea, die Pimpernuß.</b>		
<b>Sambuccus, Hollunder, Flieder.</b>			<i>colchica trifoliata</i> . . . . .	1	30
<i>nigra</i> . . . . .	—	6	<i>colchica pinnata</i> . . . . .	1	30
<i>heterophylla</i> . . . . .	—	24	<i>pinnata</i> . . . . .	—	10
<i>fl. pleno, gefülltblühender, schön</i> . . . . .	—	24	<b>Swamerdamia anteanaria, *</b>		
<i>laciniata</i> . . . . .	—	8	<b>Symphoria, Peterstrauch.</b>		
<i>formosa</i> . . . . .	—	24	<i>racemosa, Trauben-Schneebere, D</i> . . . . .	—	12
<i>fol. var.</i> . . . . .	—	10	<i>vulgaris, II</i> . . . . .	—	6
<i>monstrosa</i> . . . . .	—	12	<i>fol. var.</i> . . . . .	—	24
<i>racemosa, II</i> . . . . .	—	6	<b>Syrinea, Syrene.</b>		
<b>Schubertia, f. Cupressus.</b>			<i>chinensis, II</i> . . . . .	—	12
<b>Sophora japonica, h, D</b> . . . . .	—	24	<i>fl. rubro, D (Sauchet)</i> . . . . .	—	24
<i>pendula h, D</i> . . . . .	48 kr. bis	1 12	<i>fl. albo, die weißblühende chine-</i>		
<b>Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.</b>			<i>sische Syrene fl. l. 30 kr. bis</i>	3	30
<i>Aria</i> . . . . .	—	24	<i>Emodii, (aus Nepal)</i> . . . . .	fl. l. 1 bis	2
<i>americana</i> . . . . .	—	24	<i>Josikaea</i> . . . . .	—	24
<i>aucuparia, h, D</i> . . . . .	12 kr. bis	24	<i>persica</i> . . . . .	—	12
<i>domestica, Spierling</i> . . . . .	48 kr. bis	1 12	<i>laciniata</i> . . . . .	—	24
<i>hybrida, Wasserb.</i> . . . . .	—	30	<i>pteridifolia</i> . . . . .	—	—
<b>Spartium, Pfriemen, Ginster.</b>			<i>vulgaris, II</i> . . . . .	—	6
<i>junceum, *</i> . . . . .	—	10	<i>fl. albo</i> . . . . .	—	6
<i>scoparium, fl. albido, *</i> . . . . .	—	24	<i>fl. pleno</i> . . . . .	—	30
<i>fol. var. *</i> . . . . .	—	24	<i>maxima</i> . . . . .	—	24
<i>tinctorium, fl. pleno</i> . . . . .	—	24	<i>Mercuriana</i> . . . . .	—	24
<b>Spiraea, Spierstaude.</b>			<i>Liberti, neu</i> . . . . .	24 kr. bis	1
<i>acutifolia</i> . . . . .	—	12	<i>nigra</i> . . . . .	—	30
<i>alpina, sehr niedrig</i> . . . . .	—	20	<i>Marly</i> . . . . .	—	24
<i>arietifolia, wunderschön D</i> . . . . .	36 kr. bis	48	<i>sp. Himalaya</i> . . . . .	fl. l. 1 bis	2
<i>pr. 12 Stück</i> . . . . .	5	—	<b>Tamarix, Tamariskenstrauch.</b>		
<i>bella, D</i> . . . . .	—	18	<i>germanica</i> . . . . .	—	12
<i>Blumei, klein</i> . . . . .	—	48	<i>gallica, D, II</i> . . . . .	—	10
<i>californica, neueste</i> . . . . .	2	—	<i>indica, sehr zierlich</i> . . . . .	—	24
<i>callosa, ganz neu, aus Nord-China,</i>			<i>africana (florib.), ausgez. reichblüh. D</i>	—	30
<i>mit großen dunkelrothen Blumen, 24 kr. bis</i>			<b>Taxodium, f. Cupressus, bei den</b>		
<i>chamaedrifolia, II</i> . . . . .	—	6	<i>Nadelshölzern.</i>		
<i>incisa</i> . . . . .	—	12	<b>Taxus, Eibe, Taxisbaum, bei den</b>		
<i>corymbosa, D</i> . . . . .	—	18	<i>Nadelshölzern.</i>		
<i>cana (nana), kleinste</i> . . . . .	—	24	<b>Tecoma, f. Bignonia.</b>		
<i>canescens</i> . . . . .	—	24	<b>Thuja, der Lebensbaum bei den</b>		
<i>crenata, D</i> . . . . .	—	10	<i>Nadelshölzern.</i>		
<i>Douglasii, schönste rothblühende, D</i>	—	24	<b>Tilia, die Linde.</b>		
<i>expansa</i> . . . . .	—	24	<i>americana, h, D, großblät. 24 kr. bis</i>	—	36

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Tilia americana pyramidalis</i> . . . . .	48	<i>Viburnum dauricum</i> * . . . . .	36
argentea (alba), weißliche . . . . .	30	grandiflorum, * . . . .	2 30
pendula, hängend . . . . .	1 —	macrocephalum, *, neu . . . . .	1 30
europaea, h . . . . .	24	macrocephalum verum . . . . .	5 —
asplenifolia, geisligtblättr. . . . .	36	multatum, neu . . . . .	1 —
pendula, hängend . . . . .	48	plicatum, hie . . . . .	3 —
<b>Ulex, Stachelginster.</b>		<b>Vinea, Siumgrün.</b>	
europaeus, fl. pleno, *, t . . . . .	24	herbacea, teautartiges . . . . .	12
strictus, *, t . . . . .	24	major, D . . . . .	10
<b>Ulmus, Ulme, Oyer, Rüstbaum.</b>		reticulata . . . . .	24
adanthifolia . . . . .	48	eleg. varieg . . . . .	36
americana, II h, höchst empfehlenswerth zu Alleen und zu größeren Waldplan- zungen wegen raschen Wachthes und werthvollen Holzes 12 kr. bis pr. 100 Stück fl. 18. bis	30 40	minor, II . . . . .	6
campestris, fol. var. . . . .	18	fol. var. * . . . .	10
fol. v. elegant . . . . .	1	fl. pleno . . . . .	10
gracilis, sehr fein . . . . .	48	<b>Virgilia lutea, schön</b> . . . . .	48
excelsa . . . . .	36	<b>Vitis, wilde Weinrebe.</b>	
exoniensis, pyramidenf. großbl. . . . .	30	arbores, *, (Ampelop. bipin.) . . . . .	36
asplenifolia . . . . .	30	hederacea, Zwagerneue . . . . .	6
latifolia pendula, schöner Baum . . . . .	48	ditto pr. 100 Stück . . . . .	7 —
fastigiata . . . . .	36	Labrusca . . . . .	12
<b>Vaccinium Oxycoccus, hde</b> . . . . .	24	Isabella, prachtvoll großblättrig, best große Blüthen, und bringt wunderthätige Früchte, erträgt außerdem weit mehr Kälte, als jeder andere Wein! . . . . .	24
ovatum . . . . .	24	<b>Weigelia rosea, dieser schöne neue Strauch</b> hält unsern Winter ohne Bedeckung aus . . . . . 24 kr. bis	48
uliginosum . . . . .	24	ditto pr. 12 Stück fl. 4. bis	6 —
virgatum . . . . .	24	lutea . . . . .	1 30
formosum . . . . .	—	Middendorfi (?) . . . . .	1 30
venustum . . . . .	—	splendens . . . . .	1 30
Vitis Idara, Preusselbeere . . . . .	24	Metelerkampfi . . . . .	1 30
<b>Viburnum, der Schneeball.</b>		anabilis . . . . .	1 30
Opulus, fl. pleno, D . . . . .	12	<b>Wistaria, f. Glycine.</b>	
pygmaeum, Zwergf. D . . . . .	24	<b>Yucca flaccida, eine frei aushaltende, un-</b> vergleichliche Fruchtplanze, D, fl. 1. 30 kr. bis	5 —
dentatum . . . . .	24	filamentosa . . . . .	1 —
prunifolium . . . . .	24	californica, ganz neu . . . . .	—
cotinifolium, neu, vom Himalaya . . . . .	30	recurva (pendula) fl. 1. 30 kr. bis	5 —
amethystinum, *, neu, aus China . . . . .	1		
Tinus et var., *, D . . . . .	24		
cylindricum * . . . . .	1 —		

☞ 100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 23.  
100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.  
100 Stück immergrüner desgleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

## Die Coniferen oder Nadelhölzer

finden in neuester Zeit wegen ihrer mannigfaltigen und äusserst zierlichen Formen, gleichwie wegen ihrer Eigenschaften als immergrüne Bäume und Sträucher sehr bereitwillige Aufnahme. Im Anschluss an die auffallenden immergrünen Sträucher: *Mahonia*, *Ilex*, *Rhododendron* etc. und an die ausgezeichnetsten Zierlaubhölzer, wie *Magnolien*, *Azaleen*, *Paeonien* u. s. w. sind sie von unvergleichlicher Wirkung,



und gewähren die Mittel, das Gartenvergnügen, wenn nicht während der strengsten Jahreszeit hindurch, doch bis tief in den Herbst und schon sehr frühe im Frühjahr reichlich zu genießen.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der *Cupressen* unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Diese folgen hierunter in der 1ten Abtheilung, wovon die mit \* bezeichneten allerdings noch eines geringen Schutzes bedürfen.

Die 2te Abtheilung enthält die zärteren *Species* für das Gewächshaus, worunter wir alle halbharten rechnen, welche entweder nicht mehr als 1° bis 10° Kälte ertragen, oder in Betreff ihrer Ausdauer im Freien noch Zweifel übrig lassen.

## Erste Abtheilung. (Im Freien ausdauernd.)

	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Cupressus, die Cypresse.</b>			<b>Juniperus succica</b> . . . . .	—	30
disticha ( <i>Schubertia Taxodium</i> ).			thurifera lusitanica, der portugiesische		
die Wasserpyresse f. . 36 kr. bis	1	12	Weihrauch, hochwachsend, vollkommen		1 30
fastigiata, f. * . . . .	1	12	ausdauernd . . . . .	—	24
pendula, f. * . . fl. 1 bis	2	—	virginica, sehr leicht . . . . .	—	24
pinnata, f. * . . . .	1	12	filiformis, (Rinz) . . . . .	12	—
sempervirens, f. * hält 15°			fol. var. . . . .	1	30
Kälte ohne Bedenken 36 kr. bis	2	—	nana . . . . .	2	—
ditto pr. 12 Stck. fl. 6. bis	12	—			
nucifera? ( <i>Glyptostrobus</i> .)	1	12	<b>Pinus, Kiefer, Föhre.</b>		
funnebris, neue Trauerpyresse aus			austriaca . . . . .	—	24
China f. * . . . 48 kr. bis	4	—	cembra, Zirkelaß fl. 1. 30 kr. bis	2	30
ditto pr. 12 St. fl. 7 .	15	—	inops . . . . .	—	24
thujoides . . . . . 24 kr. .	—	48	Laricio, schön . . . . .	—	24
compacta . . . . .	—	48	maritima . . . . .	—	24
<b>Ginkgo biloba (<i>Salisburia</i>)</b>			ponderosa . . . . .	3	30
sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt,			resinosa . . . . .	—	24
Saamenpflanzen . . fl. 1 bis	2	—	rigida . . . . .	—	24
<b>Juniperus, Wachholder.</b>			serotina . . . . .	—	24
alpina . . . . .	—	30	Strobis, Weymouthskiefer . . . . .	—	24
chinensis, sehr schön und ausdauernd			excelsa, . . . . .	—	48
36 kr. bis	1	12	Lambertiana . . . . .	3	—
communis, gemeiner . . . . .	—	12	monticola . . . . .	3	—
pendula . . . . .	1	12	Pumilio, Zwergkiefer . . . . .	—	24
cracovica . . . . .	—	30	variabilis, . . . . .	—	24
excelsa * ausgezeichnet . . . . .	1	—	<b>Abies, und Picea, Weißtanne,</b>		
hibernica . . . . .	—	48	Roßtanne, Nichte.		
hispanica schön . . . . .	—	36	alba, Weißtanne . . . . .	—	24
interrupta . . . . .	—	36	ajacensis . . . . .	—	—
macrocarpa * . . . . .	1	12	balsamea, Balsamtanne . . . . .	—	24
nana davurica . . . . .	1	30	prostrata, Zwergtanne . . . . .	1	12
nepalensis ( <i>recurva</i> ), * hängend .			Brunoniana ( <i>dumosa</i> ) * . . . . .		
fl. 1 bis	2	—	neu, sehr schön. fl. 1. 30 kr. bis	3	30
oblonga pendula * sehr schön . .	1	30	canadensis, Hemlocktanne . . . . .	—	24
oxicedrus . . . . .	—	24	ditto 4-5 Fuß hoch		
davurica * . . . . .	1	12	48 kr. bis		
echiniformis, ganz nicker in			canad. nana . . . . .	2	—
Kugelform, ein Eigenthum aus unsern			cephalonica, klein . . . . .	1	12
Saamenbecken, kleine Nadeln . . . .	—	48	Douglasi, sehr schön und aus-		
sabina cupressiformis . . . . .	1	—	dauernd, aus Californien . . . . .	3	30
fol. var. . . . .	—	36	excelsa, gewöhnliche Roßtanne . . . .	—	24
prostrata . . . . .	—	30	Clanbrasiliana, Zwergform . . . . .	—	36
tamariscifolia, sehr schön . . . . .	—	30	ditto härter . . . . .	1	30
squamata *, friedend, sehr schön, Hart	1	12	elegans . . . . .	1	12
sphaerica ( <i>China</i> ) . . . . .	4	—	glauca alba . . . . .	2	—
			monstrosa . . . . .	2	—

	n.	kr.		n.	kr.
<b>Pinus Abies orientalis</b> , ganz kurzab-			12 Pinus in 12 Sorten	n. 4 bis	12 —
liat, vom Kautafus . . . . .	36	—	100 " " 24 " " 40 "	80	—
ditto stärker . . . . .	2	—	Menge der oben bezeichneten sind in bedeutender Anzahl abgeblüht.		
<b>pignaea</b> , schönste Zwergeform	36	—	<b>Podocarpus Macki</b> , erträgt unfreilich		
ditto stärker . . . . .	1 12	—	15 <sup>o</sup> Kälte . . . . .	30 kr. bis	2 —
<b>stricta</b> . . . . .	—	—	<b>Taxodium</b> , s. Cupressus.		
<b>tennifolia</b> . . . . .	—	—	<b>Taxus</b> , Erybe, Tarnusbaum.		
<b>Fraseri</b> , sehr schön 36 kr. bis	1 12	—	baccata . . . . .	— 24	—
<b>glauca</b> , klein . . . . .	48	—	fol. var. . . . .	24 kr. bis	36
<b>Hudsoni</b> , ausfallende Zwergeform	2	—	<b>canadensis</b> , schnellwachsend . . . . .	— 24	—
n. 1 bis . . . . .	2	—	ditto stärker . . . . .	36 kr. bis	1 —
<b>mariana alba</b> , niedliche weißgrüne	30	—	<b>pyramidalis</b> , vollkommen		
ditto 4-5 Fuß hoch . . . . .	48	—	aushauend, pyramidalischer . . . . .	1	—
<b>nigra</b> , kleine Zwergeform . . . . .	30	—	<b>Dovestoni</b> (umbraculifera) mit		
<b>pumila</b> , sehr schöne Zwergeform	1 12	—	hängenden Zweigen, sehr spitz und empfindlich	n. 1. 30 kr. bis	2 —
<b>Morinda</b> ( <b>Smithi</b> , <b>Pindraw</b> , <b>Khutrow</b> ), mit hängenden	2	—	<b>hibernica</b> *, in schlanker Pyramidenform,		
Zweigen . . . . .	3 30	—	etwas gädelich . . . . .	30 kr. bis	48
<b>nobilis</b> , *, schön und selten . . . . .	3 30	—	<b>nucifera</b> * . . . . .	— 48	—
<b>Nordmanniana</b> , schöne Weiß-	2	—	<b>procumbens</b> ( <b>stricta</b> ) . . . . .	1 30	—
taune vom Kautafus . . . . .	3	—	<b>recurva</b> . . . . .	n. 1. 30 kr. bis	2 30
ditto Zaamenpflanzen . . . . .	48	—	<b>tardiva</b> ( <b>Cephalot</b> <b>adpressa</b> ),		
<b>Pinsapo</b> , sehr schön, klein . . . . .	2	—	höchst empfehlenswerth . . . . .	n. 1 bis	2 —
<b>Pichta</b> ( <b>sibirica</b> ) schön . . . . .	—	—	<b>Thuja</b> , der Lebensbaum.		
<b>Tschugatskoi</b> . . . . .	—	—	aurca . . . . .	—	—
<b>Menziesii</b> , schönste grüngüne	2 30	—	eupressoides ( <b>Cupr. thujo</b> ) . . . . .	— 24	—
aus Californien 30 kr. bis	1 12	—	dolabrata * ( <b>Cupr. lusit.</b> ?) . . . . .	1 30	—
<b>Cedrus</b> *, Feder vom Libanon 36 kr. bis	—	—	intermedia * . . . . .	n. 1 bis	1 30
<b>atlantica argentea</b> . . . . .	—	—	<b>nepalensis</b> (ähnlich der orientalis) . . . . .	— 36	—
<b>viridis</b> . . . . .	—	—	<b>occidentalis</b> . . . . .	12 kr. bis	— 36
<b>Deodara</b> *, aus Nepal, schön	2	—	<b>orientalis</b> . . . . .	12 . . . . .	— 36
grünlich . . . . .	36 kr. bis	—	<b>argentea var.</b> , neu . . . . .	2 30	—
<b>crassifolia</b> , neu n. 2 bis	5	—	<b>pendula</b> * . . . . .	n. 1 bis	3 —
<b>viridis</b> , neu . . . . .	3 30	—	<b>plicata</b> , sehr schön . . . . .	48 kr. bis	1 12
<b>Larix</b> , die Kiefer.			<b>flagelliformis</b> . . . . .	— 1 12	—
<b>europaea</b> . . . . .	12 kr. bis	— 24	<b>tartarica</b> * . . . . .	— 48	—
<b>americana</b> . . . . .	48	— 1 12	<b>Warcana</b> . . . . .	— 36	—
<b>Griffithi</b> , neu . . . . .	—	—	<b>Thujopsis borealis</b> . . . . .	10	—
<b>horizontalis</b> . . . . .	1 12	—			
<b>pendula</b> . . . . .	1 30	—			
<b>sibirica</b> . . . . .	—	—			

Zweite Abtheilung. (Die zarten, und, mit fr. bezeichnet, die halbharten, bis zu 100 Kälte ertragenden species.)

	n.	kr.		n.	kr.
<b>Auracaria brasiliensis</b> .			<b>Cryptomeria japonica</b> , fr.		
Zaamenpflanzen . . . . .	n. 2 bis	12 —	36 kr. bis	2	—
<b>Bidwelliana</b> , Wipfelpflanze . . . . .	35	—	<b>glauca</b> . . . . .	—	—
<b>Cockii</b> , Wipfelpflanze . . . . .	40	—	<b>nana</b> . . . . .	n. 1 bis	3 —
<b>Cunninghami</b> , Stecklinge . . . . .	6	—	<b>Lobbiana</b> . . . . .	—	—
<b>excelsa</b> , 2 Fuß hohe Zaamenpflanzen	15	—	<b>Cupressus australis</b> ( <b>Callitris</b> ).	1 30	—
<b>gracilis</b> ( <b>elegans</b> ) Wipfelpflanze	12	—	<b>lancebris</b> , fr., neue Trauercupresse		
ditto ditto stärker	30	—	aus China 48 kr. bis	4	—
ditto Stecklinge . . . . .	2 30	—	ditto Exemplare mit feingewigelter		
<b>imbricata</b> fr., Zaamenpflanzen	3	—	Ausbildung . . . . .	n. 2 bis	3 —
n. 1. 30 kr. bis	3	—	<b>lusitanica elegans</b> . . . . .	n. 1 bis	2 30
<b>Callitris australis</b> ( <b>Cupressus</b> ).	1 30	—	<b>macrocarpa</b> ( <b>Lambertiana</b> ),		
<b>macrostachya</b> ( <b>Frenelia</b> ) . . . . .	2	—	fr. . . . .	n. 1 bis	4 —
<b>quadrivalvis</b> ( <b>Thuja articulata</b> )	1 12	—	<b>macrostachya</b> ( <b>Callitris</b> ) . . . . .	2	—



	fl.	kr.
<i>Cupressus monstrosa</i> . . . . .	2	30
pendula vera . . . . .	—	—
Reynwardtii . . . . .	—	—
sempervirens . . . . . 24 kr. bis	1	30
horizontalis . . . . .	1	—
tortuosa . . . . .	1	—
species ex. Brasil. . . . .	1	30
torulosa ( <i>lusitan. eleg.?</i> ) . . . . .	1	30
Tournefortii . . . . . 36 kr. bis	1	12
Uthdeana . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	5	—

**Daerydium cupressinum**

	fl. 2 bis	8	—
Franklini . . . . .		3	30
spicatum ( <i>Podocarpus</i> ) . . . . .		1	—
taxifolium ( <i>fusum</i> ) fl. 2. bis		8	—

**Dammara alba**

		10	—
australis . . . . .		3	—

**Fitzroya patagonia fl. 6 bis**

**Frenelia, s. Callitris, Cupressus und Juniperus.**

**Juniperus Bedfordiana, fr.**

	30 kr. bis	—	48
aromatica . . . . .		1	30
Benthamiana . . . . .		1	12
Bermudiana . . . . .		—	48
canescens, schön . . . . .		1	30
cinerascens . . . . .		1	30
dealbata . . . . .		1	30
ericoides ( <i>Retinospora</i> )			
	30 kr. bis	2	—
excelsa nana ( <i>religiosa?</i> ) . . . . .		2	—
filiformis . . . . .		1	30
flaccida . . . . . 36 kr. bis		—	48
flagelliformis . . . . .		1	—
fragrans . . . . .		1	30
Gossainthanea, fr. . . . . 30 kr. bis		1	—
Herrmanni . . . . . fl. 1. #		2	—
horizontalis . . . . .		1	30
mexicana . . . . .		2	30
occidentalis . . . . .		1	30
recurva densa . . . . .		1	30
Reevesiana . . . . .		1	12
religiosa . . . . . fl. 1. 30 kr. bis		3	—
Schollii . . . . .		1	30
sphaerica ( <i>China</i> ) . . . . .		4	—
squarrosa ( <i>Retinospora</i> ) . . . . .		1	12
Struthiana . . . . .		1	30
thurifera ( <i>Mexico</i> ) . . . . .		1	12

**Libocedrus (Thuja).**

chilensis, fr. . . . .		3	30
excelsa . . . . .		—	—
Doniana . . . . . fl. 3 bis		6	—

**Phyllocladus trichomanoides**

	fl. 1. 30 kr. bis	10	—
rhomboidalis ( <i>asplenifolius</i> ) . . . . .		3	30

**Pinus apuliensis**

abchasia . . . . .		4	—
Aycahuite . . . . . fl. 2 bis		5	—
Benthamiana . . . . .		—	—
californica . . . . .		—	—
canariensis . . . . .		1	—
cembroides . . . . .		—	—
Devoniana . . . . .		4	—
Edgariana . . . . .		—	—
filifolia . . . . . fl. 10 bis		25	—
Gerardiana . . . . .		2	30
Hartwegi . . . . .		3	30
ignota . . . . .		3	30
leiophylla . . . . .		3	—
Lemoniana . . . . .		2	30
Lindleyana . . . . .		—	—
longifolia . . . . .		—	—
macrocarpa . . . . .		5	—
macrophylla . . . . .		3	30
Montezuma . . . . . fl. 2 bis		5	—
muricata . . . . .		—	—
palustris . . . . . fl. 1. 30 kr. bis		3	—
patula . . . . .		3	30
pseudo strobis . . . . .		4	—
radiata . . . . . fl. 3 bis		5	—
Russeliana . . . . .		—	—
Sabini . . . . .		5	—
species Ehrenberg . . . . .		5	—
tenuifolia . . . . . fl. 3 bis		7	—
Teocote . . . . . 2		5	—
abies Brunoniana, fr. ( <i>du-</i>			
<i>mosa</i> ), sehr schön fl. 1. 30 kr. bis		3	30
grandis . . . . .		—	—
Jezoensis, neu aus Japan . . . . .		12	—
lanceolata . . . . . 48 kr. bis		3	30
religiosa, Stedlinge . . . . .		2	30
spectabilis, Stedlinge fl. 1 bis		2	30
ditto Zamenpflanzen			
	fl. 2. 30 kr. bis	4	—
Webbiana, neu . . . . .		3	30

**Podocarpus Macki, fr., pyra-**

midensfordia . . . . . 30 kr. bis		2	—
antarctica . . . . .		5	—
taxifolia ( <i>Torreya Humboldti</i> )		—	—
macrophyllus . . . . .		1	—

**Retinospora, s. Juniperus**

**Saxgothaea conspicua**

	fl. 7 bis	18	—
--	-----------	----	---

**Seguioia gigantea, s. Taxod. semperv.**

**Thuja chilensis, s. Libocedrus Doniana, s. Libocedrus.**

<b>Taxus Fortunei, mas., neu, sehr schön</b>		6	—
nucifera, fr. . . . .		—	48
pedunculatus . . . . .		3	—

## Ziersträucher in Töpfen und Vasen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmässigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: *Thuja*, *Taxus*, *Cupressus*, *Juniperus* und *Pinus*, unter den immergrünen Laubbölzern: *Prunus lauro Cerasus*, *Mahonia*, *Evonymus jap. fol. var.*, *Evonymus repens*, *Laurus nobilis*, *Viburnum Tinus*, *Aucuba japonica*, alle grüne und buntblättrigte *Ilex*, *Cotoneaster microphylla* und *rotundifolia* mit ihren wunderschönen Beeren, *Crataegus crenulata*, *Rhododendron etc.*

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen *Ephen* (*Hedera*), *Vinca major* und *minor*; zu niederen Vasen: alle *Vinca*, *Ruscus*, *Hypericum calycinum*, einige *Juniperus* u. s. w.

## Rosen - Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit \* können auch wurzeläccht geliefert werden, jene mit † sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 5 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preis-Ermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrtriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

### *Rosa pimpinellifolia*; Pimpinellblättrige Rose.

	fl.	kr.
Aurore, ( <i>Verdier</i> 1847), gefüllt, fein hellrosa . . . . .	—	48
Blanche, fast gefüllt, weiss, * . . . . .	6 kr.	bis 12
Jaune double, fast gefüllt, blaßgelb, † . . . . .	—	48
rose, fast gefüllt, rosa, * . . . . .	6 kr.	bis 12
Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, † . . . . .	—	48
picturata, R., gefüllt, carmin, schön schattirt und geadert, * . . . . .	—	48

### *Rosa lutea* und *bicolor*, gelbe und Kapuziner-Rose (Feuer-Rose.)

Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Giffett-Rose, * . . . . .	—	12
bicolor ( <i>punica</i> ), einfache hochrothe Feuer-Rose, * . . . . .	—	24
Harrissonii, fast gefüllt, schön hochgelb, † . . . . .	—	48
Persian yellow, neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, † . . . . .	48 kr.	bis 1



**Rosa alba; die weiße Rose.**

Etoile de la Malmaison, gefüllt, schön gebaut, fleischfarb, weiß gerändert † . . .	
Reine de Danemark, neu, † . . .	
Madame Audot, gefüllt, zart fleischfarb † * . . .	
Félicité Parmentier, gr., sehr gef., fleischfarb, † . . .	
Miranda, gr., gef., rosa, † . . .	
Sophie de Bavière, gef., schön lebhaft rosa, † . . .	

48 kr.

**Rosa bifera (*R. calendaram*); die öfter blühende oder**

**Perpetuelle-Rose.**

halbhoch und hochstämmig 48 kr. bis fl. 1.

Antinous, gr., gef., gut gebaut, purpurviolett . . .	
Bernard, sehr gef., lebhaft zart rosa, † . . .	
Elisa Vilmorin, gr., sehr gef., reich fleischfarb-rosa . . .	
La Favorite, fast weiß, zuweilen gestreift . . .	
Laurence de Montmorency, gr., gef., rosa-lila, † . . .	
Ebène, gef., purpurviolett, † . . .	
Pourpre royale, gef., violett-purpur . . .	
Purpurin ( <i>Margottin</i> ), gef., dunkelcarmoisin . . .	
Du Roi, gef., lebhaft roth, sehr geschäft . . .	
Du Roi a fl. violets, mit violett-rothen Blumen . . .	
Indigo, gr., doppelt, dunkelviolett, ausgezeichnete Farbe . . .	

**Rosa hybrida-bifera (*R. hybride-remontante*), die neue öfter**

**blühende Hybrid- oder Bastard-Rose.**

(Diese stehen theils der Rosa-bifera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18°, ohne Bedeckung und werden deshalb gegenwärtig vorzugsweise geschäft.)

halbhoch und hochstämmig pr. Stück 48 kr. bis fl. 1.  
mit Ausnahme der neuesten Sorten, wobei ein höherer Preis besonders bemerkt ist.

Adèle Mauze, *, †, gr., gef., rosa . . .	
Amandine, gr., gef., zart rosa . . .	
Auberon, gr., gef., lebhaft rosa . . .	
Baronne Halez de Claparède, gr., gef., Musterbäume, dunkelroth . . .	
Baronne Prévost, sehr gr., gef., lebhaft rosa . . .	
Blanche de Beaulieu, gef., weiß, leicht rosa schimmernd . . .	
Blanche de Portemer, weiß, leicht geräthet . . .	
Blanche Lamouroux, gef., hellrosa . . .	
Blanche Vibert (neu), gefüllt, weiß, gelblich im Aufblühen * † . . .	
Caroline de Sansal ( <i>Desprez</i> ), gef., hellfleischfarb, herrlicher Centifolien-Bau . . .	
Casimir Delavigne . . .	
Charles Boissière, ( <i>Granger</i> ), gr., sehr gef., gewölbt, lebhaft tiefroth . . .	
Chereau ( <i>Thomas</i> ), gr., gef., firschröth, übergehend in rosa . . .	
Clementine Duval, gef., fugelicht, rosa * . . .	
Collardeau ( <i>Vibert</i> ), rosa incarnat . . .	
Colonel Foissy ( <i>Margottin</i> ), gef., lebhaft firschröth . . .	
Comte de Bobrinsky ( <i>Marest</i> ), scharlachcarmin, oft klasser, oft sehr feurig, Preisblume . . .	
Comte de Derby, gr., gef., lebhaft rosa . . .	
Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., fugel., dunkelviol. rth * † . . .	
Comtesse Bathiany ( <i>Laffay</i> ), weiß fleischfarb . . .	
Coquette de Bellevue, gef., lebhaft rosa * † . . .	
Cornet, gr., zart rosa, mit runden Petalen † . . .	
Cymedor, gef., dunkelroth . . .	
d'Assas, ( <i>Vibert</i> ), gef., purpuramaranth, neu . . .	
Denis Papin ( <i>Laffay</i> ), gr., gef., dunkelcarmoisin, lila gerändert . . .	

	fl.	kr.
Desgaches ( <i>Lacharme</i> ), carmin-rosa . . . . .		
Dembrowsky, dunkelviolet und carmoisin . . . . .		
Docteur Juillard ( <i>Lacharme</i> ), purpur und carmin . . . . .		
Docteur Arnal ( <i>Röser</i> 1848), gef., ranunkelf., fast hochr., sehr lebh. * † . . . . .		
Docteur Marjolin, rosa-lila . . . . .		
Docteur Reynaud, gr., gef., rosa, dunkel gefleckt . . . . .	1	30
Duc d'Isly, halb doppelt, carmoisi, ganz dunkel schattirt, * † . . . . .		
Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa * † . . . . .		
Duplessy Mornay, ( <i>Fibert</i> ), gef., feurig purpur, neu . . . . .		
Ernestine de Barante, ranunkelf., gef., lebhaft rosa * † . . . . .		
Etendart du grand homme . . . . .	1	12
Etendart de Marengo ( <i>Guillot</i> ), in der Art von Docteur Arnal, sehr feurig . . . . .		
Eugène Sue, lebh. rosa * † . . . . .		
Géant des batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft * † . . . . .		
General Castellane, gr., sehr gef., hochroth . . . . .	1	30
General Cavaignac ( <i>Morangez</i> ), gr., sehr gef. Münsterblume, lebhaft dunkelrosa . . . . .		
General Changarnier ( <i>Moulin</i> ), gr., gef., violett-purpur . . . . .		
Génie de Chateaubriand, gr., gef., lebhaft violettroth . . . . .		
Gigantesque ( <i>Mauguet</i> ), in der Art der Rose la Reine . . . . .		
Gloire de Rosamène, doppelt, hochroth, * . . . . .		
Guillot, gr., gef., rosa-purpur * † . . . . .		
Henriette Laval ( <i>Guillot</i> ), gef., fleischfarb, carmin gefleckt . . . . .	1	30
Jacques Laffite, gr., gef., carmin * † . . . . .		
Jeanne d'Arc, ( <i>Perdier</i> 1848), gr., gef., weiß, innen fleischfarb † . . . . .		
Jnermis ( <i>Lacharme</i> ), schalenförmig, rosa, ohne Stacheln . . . . .		
Joasine Hannet, gef., dunkelpurpurroth . . . . .		
Krudner, gef. glänzend fleischf. † . . . . .		
Lady Fordwich, gef., roth, vielblumig, . . . . .		
Lanc, gef., rosa . . . . .		
Laure Ramand, ( <i>Lacharme</i> ), Form der Camellia imbricata, lebhaft lichtrosa . . . . .		
La vaillante Bergère, gef., hell oder fleischfarb-rosa * † . . . . .		
Le lion des Combats ( <i>Lartey</i> ), sehr gr., feurig dunkelroth, prächtig . . . . .		
L'Enfant du Mont-Carmel, gr., gef., dunkel-purpur-amaranth . . . . .	1	30
Leonie Verger, ranunkelf., gef., lebhaft dunkelrosa * † . . . . .		
L'inflexible, gr., reich gef., glänzend rosa * † . . . . .		
Louise Aimé, gef., fleischfarb-rosa * † . . . . .		
Louise Bordillon, gef., rosa . . . . .		
Louise Peyronny, ( <i>Lacharme</i> ), sehr gr., Form der Rose la Reine, dunkelrosa mit carmin . . . . .		
Lucie de Montanzen ( <i>Pelissier</i> ), fein hellrosa, centifolienförmig . . . . .		
Madame Andry ( <i>Verdir</i> ), sehr gr., dunkelrosa . . . . .		
Madame de Belfort, gr., gef., zartrosa . . . . .		
Madame Campbell d'Isly, ( <i>Baudry</i> ), oder Triomphe de Valenciennes, eine zuweilen leicht gestreifte Rose la Reine . . . . .		
Madame Clavel, ( <i>Lacharme</i> ), rosa, mit purpur punktirt . . . . .		
Madame de Consté, gr., fleischfarb . . . . .		
Madame Flory, centifolienförmig, hell-lila-rosa . . . . .	1	12
Madame Hobetz Desgaches, gef., rosa-lila, * . . . . .		
Madame de Lamoricière ( <i>Portemer</i> ), sehr gef., lebhaft rosa mit hellen Rückseiten . . . . .		
Madame Oger, ( <i>Oger</i> ), sehr gef., incarnat-rosa, prächtig centifolienförmig . . . . .		
Marquisa Bocella, gef., schön geb., fleischfarb, * † . . . . .		
Marquise d'Ailsa, gr., gef., carmin, schattirt . . . . .		
Melanie Cornu, gr., sehr gef., dunkelroth oder purpur . . . . .		
Mère de St. Louis ( <i>Lacharme</i> ), gr., fast weiß, leicht fleischfarb . . . . .		
Montaigne, gef., fugelicht, carminrosa, * † . . . . .		
Mistriss Elliot, fast gef., rosa-violett . . . . .		
Olivier de Serre, gr., gef., dunkelrosa . . . . .		
Palais de Cristal ( <i>Quetier</i> ), sehr gef., lebhaft weiß-fleischfarb . . . . .		
Paul Dupuy, gr., sehr gef., dunkel-carmoisin . . . . .	2	—
Philoxène, gef., glänzend carminrosa, neu † * . . . . .		
Pie IX. ( <i>Fibert</i> ), gef. hellcarmoisin . . . . .		
Ponctué, gef., dunkelrosa, punktirt . . . . .		



	fl.	kr.
Praire, gef., fein incarnat-rosa, sehr fein . . . . .		
Prince Albert, sehr gef., veränderlich rosa, purpur und violett . . . . .		
Prudence Roeser, gef. rosa . . . . .		
Queen Victoria ( <i>Paul</i> ), fleischfarbweiß, Form der R. la Reine . . . . .	1	12
Reine des fleurs, sehr gr., gefüllt, lila-rosa, * † . . . . .		
Reveille, gef., rosa-purpur . . . . .		
Rose de la Reine, sehr gr. centifoliaf., dunkelrosa * † . . . . .		
Rose et blanche ( <i>Oger</i> ), sehr gef., firschoroth mit weißem Centrum . . . . .	1	12
Rosine Margottin ( <i>Margottin</i> ), gef., schön gebaut, fleischfarb . . . . .		
Rubens ( <i>Laffay</i> ), gr., fast gef., sammet-amaranth . . . . .	2	—
Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin oder hochr. * . . . .		
Sr. de la reine des Belges ( <i>de Faunv</i> ), gr., leuchtend hoch-carmin . . . . .		
Souvenir de L. Gower ( <i>Guillot</i> ), sehr gr., dunkelrubinroth . . . . .	2	—
Sydonie, gr., gef., rosa . . . . .		
Theoerite, gr., gef., feurig rosa . . . . .		
Triomphe de Paris ( <i>Margottin</i> ), sehr gr., gef., dunkelsammetroth . . . . .	2	—
William Griffith, gef., rosa-lila . . . . .		

Rosa damascena; Damascener-Rose.

Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenf., rein weiß . . . . .	
Madame Zoutmann, gr., sehr gef., weiß, sehr leicht geröthet * † . . . . .	
Oeuillet parfait, gef., roth und weiß gestreift . . . . .	
Pope, sehr gr., dunkelpurpur mit carmoisin . . . . .	

Rosa centifolia; hundertblättrige oder Bauernrose.

Adrien de Cardoville . . . . .	
Alain Blanchard . . . . .	
Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit sammartiger Blumendecke . . . . .	
Domitile Bécar, gr., gef., fein rosa, weiß gestreift . . . . .	
La Fiancé, gef., zart fleischfarb . . . . .	
Minor, klein, gef., lebhaft rosa * . . . . .	12 kr.
Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., dunkelrosa * . . . . .	12 kr.
Pompon de Bourgogne, kleinste Damen- oder Pfingstrose * . . . . .	
Pompon de Bourgogne à fl. blanche, ditte, weiß * . . . . .	
Unique blanche ( <i>unica</i> ), gef., rein weiß . . . . .	

Rosa centifolia muscosa; Moosrose.

A feuilles luisantes, gef., glänzend hellrosa . . . . .	1	—
Aixa, gef., flach, zart rosa . . . . .	1	—
Alice Leroy, gr., rosa-lila . . . . .	—	48
Angelique Quetier, zart rosa . . . . .	—	48
Aristobule, halbgef., dunkelsammetroth . . . . .	1	12
Baroillet, ( <i>Verdier</i> 1850), fast gef., dunkelcarmoisin . . . . .	1	—
Blanche, gef., weiß . . . . .	1	—
Blanche unique, gef., rein weiß . . . . .	1	—
Carné, gef., fleischfarb . . . . .	1	—
Coelina, gef., die schönste sammetartig dunkelrothe . . . . .	1	—
Comtesse de Murinais, gr., halbgef., weiß . . . . .	1	—
Comtesse de Noé, schön gef., fein carmoisin . . . . .	1	—
Comtesse de Segur . . . . .	1	—
Cramoisie foncé, sammetartig carmoisin . . . . .	1	12
Elisabeth Rowe . . . . .	1	30
Etna, doppelt, feurig purpur . . . . .	1	—
General Drouot (remontant), purpur, öfter blühend . . . . .	1	12

Sammtlich 48 kr. bis fl. 1.

Hermann Kegel (remontant), gef., violett mit carmoisin, öfter blühend	n.	kr.
Lane, gr., gef., schön gebaut, feurig rosa=roth, prächtig	1	30
Lansezeur	1	—
Mademoiselle Alboni, (Ferdier 1850), gef., incarnatrosa	1	12
Malvina, gr., doppelt, rosa	1	—
Obscurité, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur	1	12
Ordinaire, die gewöhnliche, sehr gefüllt, rosa	30 kr. bis	1
Panaché pleine, gef., weiß, oft rosa gestreift	1	—
Pompon, klein, gefüllt, rosa	1	—
Pompon perpetuelle (remontant), klein, gef., dunkelrosa	1	30
Pourpre de Luxembourg, fast gefüllt, purpur, reichblühend	1	—
Précoce, gef., lebhaft roth	—	48
Ponctué, gef., dunkelrosa	—	48
Princesse Adelaïde, gef. hellrosa, von kräftigem Wuchse, reichblüh. *	48 kr. bis	1
Princesse royale, gef., fleischfarb-rosa	1	—
Purpurea rubra, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur, prächtig	1	12
Rose pale, gef., fleischfarb	1	—
St. Susanne, neu, sehr gef., dunkel-rosa	1	—
Unique de Provence, rein weiß	1	—
Zoë (mousseuse partout), fast gef., rosa, mit bemossenen Blättern	1	—

### Rosa gallica; die französische Rose.

André Thouin, doppelt, purpur, marmorirt	Sammtlich à 36 bis 48 kr.
Assemblage de Beaute, gr., gef., dunkelsammetpurpur	
Astreans (R.), hochcarmin, fast gef., Giffetrose	
Belle africaine, fl., gef., schwärzlich sammetpurpur	
Belle Eccossaise, gef., dunkel lila=rosa, stark punkirt	
Blondine (R.), gef., zart fleischfarb	
Camayeux, gef., violettroth, weiß gestreift	
Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., dunkelpurpur=carmoisin	
Copiosa (R.), sehr gef., dunkelrosa	
Daguessean, gr., gef., schön gebaut, lebhaft purpurroth	
Diogenes (R.), sehr gr., sehr gef., dunkelrosa	
Duc de Treviso, gef., purpurroth	
Gutenberg, gr., sehr gef., zart incarnat-rosa	
Justus Liebig (R.), sehr gef., rosacarmin	
Kohlenbrenner (R.), fast gef., schwarzbraun schattirt	
L'Amethyste, gef., purpur mit dunkelviolet	
Louis Philipp, gef., punkelpurpur	
Lucille Duplessis, gef., dunkelrosa, punkirt	
Mecène, gef., weiß, mit rosa	
Ohl, gr., gef., purpur mit dunkelcarmoisin	
Ocillet flammand, gef., weiß mit dunkelrosa gestreift	
Panaché pleine, gef., violett mit weiß gestreift	
Pourpre strié blanc, gef., purpur, mit feinen hellen Streifen	
Salomon Heine (R.), sehr gef., sammetartig, dunkelpurpur mit carmin	
Schirmacker, gr., gef., dunkelviolet	
Silberband (R.), gef., schön gebaut, lebhaft zart fleischfarb	
Schneeflocke (R.), gef., rein weiß	
Sorgenfrei (R.), gef., ranunkelförmig, rosa, fein punkirt	
Tricolor, (belle Alliance), halbgef., klein, carmoisin, rosa und weiß	
Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift	
Tricolor de Wazemmes, gef., violett, weiß gestreift	
Virginie Zeller, dunkelsammetpurpur	

### Rosa provincialis; die Gartenrose.

Boule de neige, gef., rein weiß	1	30
Coerulescens marmorea, gef., bläulich=roth, weiß marmorirt		
Emmerance, sehr gef., gelblich weiß		
Néron, gef., carmoisinviolett, roth punkirt		



Pauline Garcia, gef., gelblich weiß . . . . .	n.	kr.
Princesse Clementine, gr. gef., rein weiß . . . . .		
Turenne, gr., gef., roth und weiß marmorirt . . . . .	1	—

**Rosa hybrida; die Bastard- oder Hybrid-Rose.**

A fleurs blanches, gefüllt, rein weiß . . . . .	Sämmtlich 36 bis 48 kr.	
Belle de Crecy, sehr schön, schwärzlich sammetpurpur		
Callirhoe, neu . . . . .		
Calycanthus (R.), gef., purpurolett, feurig schattirt		
Charles Duval, sehr gr., gef., glänzend roth, schön gebaut		
Chenedolé, gr., gef., feurig firsdyroth		
Coupe d'Ilébé, gr., gef., prächtig gebaut, lebhaft rosa		
Deuil de Maréchal Mortier, gef., sammetpurpur, mit hellem Centrum		
Docteur Billard, gef., hochroth, sehr lebhaft		
Frederic II. sehr gr., fast gef., dunkel purpurviolett		
General Allard, gr., gef., rosa-carmin		
La Dauphine, zart rosa, vielblumigt		
Lady Stuart, gr., gef., prächtig fleischfarb-weiß		
Lamarque, gr., gef., schwarz-purpur		
L'attrayante, gef., fleischfarb-naufin		
Madame Plantier, gef., rein weiß		
Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur-violett		
Madame Rameau, gr., gef., schwärzlich sammetpurpur		
Miralba, gef., schön gebaut, dunkelviolet, schattirt		
Madeleine, sehr gef., weiß-fleischfarb		
Malton, fast gef., lebhaft carmin		
Vandael, gr., schön gebaut, sehr dunkel		
Yolande Fontaine, gef., dunkelviolet		

**Rosa capreolata und rubifolia; laufende Geldrose, Ayrshire-Rose.**

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Pyramiden geeignet.)

Baltimore Belle, milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd, * † . . . . .	1	—
Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelfreisen, ohne Bedeckung ausdauernd, * † 36 kr. bis	1	—
De la Grifferai, gr., gef., purpur-carmin, sehr schäpbar * † . . . . .	1	—
Ruga, fast gef., nach Thee duftend, * . . . .	—	30
Comtesse de Lieven, weiß, halbgefüllt . . . . .		
Rose Angel, weiß, halbgefüllt . . . . .		
Perpetual, * . . . .		
A fleurs doubles, * . . . .		
Alice Grey, * . . . .		
Dundee Rambler, * weiß fleischf., halbgef., reichbl.		
Myrthe-scented, * weiß fleischf., fast gefüllt . . . . .		
Splendens, * . . . .		
Anna Marie, incarnat-rosa, sehr gef., schön . . . . .		
Perpetual pink, incarnat-rosa, sehr gef., klein, lieblich		
President . . . . .		
Ranunculiflora, silberweiß und incarnat, gef., sehr schön		
Superba . . . . .		
Virginian Lass . . . . .		
Caradori Allan, dunkelroth, doppelt . . . . .		
Linean Hill Beauty . . . . .		
Pride of Washington, fein lila-rosa, gef., . . . . .		
Queen of de prairies, wie beauty of the prairies		

Sämmtlich 36 bis 48 kr.

Triumphans, dunkelroth und fleischf., gef., sehr schön	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Rosa multiflora; Vielblumigte oder Italienische Rose.

Die Gewöhnliche, hellrosa, *	30 kr. bis	— 48
Graulhié, gef., weiß, sehr schön, *	30 „ „	— 48

### Rosa Banksia; Banks's Rose.

(Mit tausenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; guten Schutz gegen Kälte bedürftend.)

Alba plena, klein gef., wohlriechend, *	—	24
Lutea plena, klein gef., hochgelb, *	—	24
Nouvelle de la Chine	—	48
Fortuneana, gr., weiß, gef., neu aus China	1	—
Fortunes yellow rose, gr., gelb, neu aus China	1	—

### Rosa microphylla und R. bractenta; die kleinblättrigte und deckblättrigte Rose.

Microphylla, die gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur.	—	48
Bractenta Marie Leonide, gr., fast gef., weiß	—	48

### Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee-Rose.

Alle hierher gehörigen Teep-Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgräbt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.

Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperflorens, Lawranceana, Noisettiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Teeppflanzen. Verebelte Stämmchen kommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —

Agathe, sehr gef., lebhaft blaurosa	—	36
Anisette (Guillot), gef., lila, mit anisett-Geruch	1	—
Antherose, groß, sehr gef., weiß-gelblich, vorzüglich †	—	36
Belle Marguerite, lila-rosa	—	48
Bougère, sehr gr., gef., hellrosa, eine der besten †	—	24
Buret, gr., gef., roth	—	36
Canary (Guillot), hochgelb, kräftig und reichblühend	1	—
Carné, fleischfarb	—	36
Charles Raybaud, gr., gef., zart rosa	—	48
Clara Silvain, gef., rein weiß	—	24
Comte de Paris, sehr gr., gef., weiß-fleischfarb	—	48
Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, prächtig †	—	36



	n.	kr.
Diamantina	—	36
Elise Mercœur, gef., dunkelrosa vorzüglich †	—	30
Elise Sauvage, gef., gelblich	—	36
Eugenie Desgaches, gr., gef. licht=rosa	—	48
Fanny Duval, gr., gef., weiß	—	36
Gigantesque, sehr gr., gef., fleischfarb	—	30
Gloire d'Isly	—	36
Hamon, fleischfarb	—	36
Isidor d'Angers, fleischfarb=weiß	—	36
Jules Desmontes, gef., hellrosa	—	36
Le Pactole, gef., lebhaft gelb	—	36
L'hétéroclite, gr., gef., lebhaft roth, kräftig	—	36
Madame Bravy, gef., rein weiß	—	36
Madame Le Hardelay ( <i>Oger</i> ), gr., sehr gef., schwefelgelb, kräftig	2	—
Madame Roussel, gef. fleischfarb	—	36
Madame Jaqueminot, gr., gef., gelb=weiß †	—	36
Madame Sylvestre, gr., gef., weiß=gelb	1	—
Maréchal Bugeaud, gr., gef., rosa schattirt †	—	36
Mélanie Willermoz, ( <i>Lacharme</i> ), † sehr gr., reich gef., weiß, leicht geröthet, starkwüchsig, ausgezeichnet	1	—
Miranda	—	48
Nisida, gef., blaßrothgelb, oder aurorafarbig	—	36
Niphetos, gr., rein weiß	—	36
Olympe, gr., sehr gef., roth	—	36
Pellonia, gr., sehr gef., fleischfarb	—	36
Pharaon, gr., gef., hellrosa	—	36
Prince Esterhazy, gr., fast gef., schön rosa	—	36
Reine des Belges, gr., sehr gef., rein weiß	—	48
Safrano, fast gef., glänzend gelb †	—	36
Souvenir d'un amie oder Queen Victoria, gr., gef., schön rosa	1	—
Surpasse triomphe de Luxemburg, gr., gef., gelb, sehr schön	—	48
Triomphe de Luxembourg, sehr gr., gef., roth mit aurora †	—	36
Turgot, gef., hell=carmin †	—	48
Vicomtesse de Cazes, gef., gelb, schattirt ausgezeichnet schön †	1	—
Walter Scott, gr., halbgef., lebhaft roth	—	36
Wilhelm II., gr., fleischfarb	—	48

### Rosa semperflorens (*R. bengalensis*, *chinensis*), die immerblühende bengalische Rose.

A cinq couleurs, meistens einfarbig weiß, zuweilen sehr schön gebändert, starkwüchsig	30 kr. bis	1	—
Anemoneflora ( <i>de la Chine</i> ), ll., weiß, lang petaligt, sehr eigenthümlich		1	—
Archiduc Charles, gr., gef., rosa=carmoisin	24 kr. bis	—	48
Beau Carmin du Luxembourg, gef., dunkel sammetpurpur		—	24
Cramoisie superbe, gef., lebhaft carmoisin		—	30
Fabier, halbgef., blendend roth, fürs freie Land zu Gießgruppen wohl geeignet		—	24
General Lawoestine, gef., lebhaft dunkelroth		—	24
La Victorieuse, gr., gef., weiß		—	30
Louis Philipp, gef., lebhaft carmoisin		—	24
Madame Breon, gr., gef., fein rosa †		—	48
Marjolin, gr., gef., lebhaft dunkelroth		—	24
Prince Charles du Luxembourg, gef., carminroth		—	24
Reine blanche, gef., rein weiß		—	24
Triomphe de Gand, † gr., gef., roth		—	48

### Rosa Beng: Lawrancia; kleinste immerblühende Rose.

Pompon, die gewöhnliche, rosa	—	18
-------------------------------	---	----

Atropurpurea, edel Gloire, sehr klein, gef., dunkelpurpur . . . . .	24 kr. bis	n. kr.
La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig . . . . .	24 kr. bis	— 48
Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa . . . . .	24 kr. bis	— 36

### Rosa ind: Noissettiana; die immerblühende Noissette-Rose.

(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)

Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schagbar . . . . .	24 kr. bis	— 36
Caroline Marniesse, (1848), gef., gewölbt, weiß, leicht geröthet, äußerst blüthenreich und andauernd † . . . . .	36 kr. bis	1 —
Chromatella, gr., gef., dunkelgelb, mit langen Zweigen † . . . . .	30 kr. bis	— 48
Comtesse de Tolosan, † sehr gr., fast gef., weiß, leicht geröthet † . . . . .		— 48
Desprez, gelblich-rosa . . . . .		— 48
Eugenie Dubourg . . . . .		— 48
Felleberg, gr., gef., lebhaft carmin-roth, ausgezeichnet für's freie Land . . . . .		— 24
Lamarque, gr., sehr gef., gelblich † . . . . .		— 36
Hortense Aimé, hellroth, sehr reichblühend . . . . .		— 48
Jacques Amgöt, lila-rosa . . . . .		— 48
Madame Deslongchamps (Lévêque), fleischfarb-weiß . . . . .	1 —	— 36
Miss Glegg, fast gef., weiß-rosa . . . . .		1 —
Lais, neu, gef., weiß † . . . . .	48 kr. bis	1 —
Orange incarnat, neu, von China † . . . . .		1 —
Ophiric, gef., schön geb., knosprig-aurora-gelb, ganz neue Farbe † 36 kr. bis		1 —
Phaloe, gr., gef., weißlich-aurora, neu . . . . .		— 48
Solfatare, gr., gef., entschieden schwefelgelb † . . . . .	36 kr. bis	1 —
Triomphe de la Duchère, gr., gef., fleischfarb, neu . . . . .	36 " "	1 —
Vicomtesse d'Avesne (1848), gef., rosa, neu † . . . . .	36 " "	1 —

### Rosa Bourbonica (Iste Bourbon); die immerblühende Bourbon-Rose.

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schagbar für das freie Land, für die Topfkultur und Blumentreiberei.)

Acidalie, gef., fast weiß, † . . . . .		— 48
Adelaïde Bougère, gef., sammetartig schwarz-purpur . . . . .	1 30	
Apolline, gr., gef., zart rosa, schattirt † . . . . .	48 kr. bis	1 —
Augusta, (R.), gef., glänzend rosa . . . . .		— 48
Aurore du Guide, gef., dunkelroth, violett schattirt † . . . . .		— 48
Brisagne, lebhaft carmin . . . . .		— 48
Camille Decker, dunkel purpur . . . . .		— 48
Caroline d'Erard, gef., fleischfarb . . . . .	1 —	
Cardinal Feretti, gef., dunkelpurpur, starkwüchsig . . . . .	1 —	
Cesarine Sonchet, gef., zart rosa, mit carmin schattirt † . . . . .	48 kr. bis	1 —
Comme de Seine et Marne, gef., dunkel violett-roth † . . . . .		— 48
De Tourville, gef., dunkel-purpur-violett † . . . . .		— 48
Docteur Blandin, sehr gef., dunkelrosa † . . . . .	48 kr. bis	1 —
Docteur Harduin, sehr gef., fleischfarb-rosa † . . . . .	48 kr. bis	1 —
Dr. Leprestre (Oger), gr., gef., lebhaft purpurroth, sammetartig . . . . .		1 30
Dr. Roques, gef., violettroth . . . . .		— 48
Dornes, hochroth, sammetartig . . . . .	1 —	
Duc de Chartres, gr., gef., dunkelrosa † . . . . .		— 48
Duchesse de Normandie, gef., rosapurpur † . . . . .		— 48
Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin . . . . .		— 48
Edouard Desfossé, gef., glänzend rosa, sehr schagbar † . . . . .	30 kr. bis	— 48
Fritz de Coussy, gr., gef., lebhaft firschoth . . . . .		— 48
Faustine, blaß fleischfarb . . . . .		— 48



	n.	kr.
General Oudinot, gef., dunkel-purpur-carmoisin . . . . .	1	—
General Penker ( <i>Sester</i> ), Seitenstück zu Paul Joseph, vortreflich . . . . .	1	—
General Schaeffer, lebhaft rosa . . . . .	—	48
Georges Cuvier ( <i>Beauté de Versailles</i> ), gef., firschröth und rosa † . . . . .	—	48
Georges Robin, dunkel-violett . . . . .	—	48
Gloire de Paris, gef., lebhaft dunkel-carmoisin † . . . . .	—	48
Guillaume le Conquérant, gr., gef. glänzend rosa . . . . .	—	48
Henry Lecoq, gr., gef., roth . . . . .	—	48
Hennequin, gef., glänzend purpur † . . . . .	—	24
Imperatrice Josephine, gef., zart fleischfarb, † . . . . .	—	36
Julie de Fontenelle, gef., schön violett-purpur † . . . . .	—	48
Jupiter, gef., dunkelviolettroth † . . . . .	—	48
Jury, lebhaft roth und sammet-carmoisin . . . . .	1	12
La gracieuse, gr., gef., sehr lebhaft rosa † . . . . .	—	48
Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränderlich, schön † . . . . .	—	36
Lady Stanley, ( <i>Dubos</i> ), gr., prächtig fleischfarb weiß, † . . . . .	1	—
Le Camé, gr., gef., zart rosa, mit dunklerem Herz † . . . . .	1	—
Le Grenadier, klein, sehr gef., lebhaft carmoisin, veränderlich, sehr schön . . . . .	—	48
Leon Leclerc . . . . .	—	36
Léon Oursel, gr., gef., feurig roth † . . . . .	1	—
Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., dunkelrosa † . . . . .	48 kr. bis	1
Louise Odier ( <i>Margottin</i> ), gr., ganz centifolienartig . . . . .	1	—
Madame Angelina, gef., weiß mit gelblichrothem Anflug, sehr schön . . . . .	48 kr. bis	1
Madame Callot, (Miellez), sehr gr., schön gebaut, zart rosa, starkwüchsig † . . . . .	1	—
Madame Cousin ( <i>Margottin</i> ) zart rosa . . . . .	—	48
Madame Desprez, gef., lilasrosa † * . . . . .	—	36
Madame Desgaches, gef., glänzend rosa † . . . . .	1	—
Madame Hamon, gef., violettroth † . . . . .	1	—
Madame Hobetz, gef., fein rosa † . . . . .	—	36
Madame Lacharme, fleischfarb . . . . .	—	48
Madame Nerard, gef., zart fleischfarb, sehr schön † . . . . .	36 kr. bis	—
Marie Desfossé, gr., gef., zart fleischfarb . . . . .	1	12
Marquis d'Ossey, gef., glänzend dunkel-violettroth † . . . . .	48 kr. bis	1
Marrast, sehr gef., glänzend rosa . . . . .	1	—
Miroir de perfection, gef., violett-rosa . . . . .	—	48
Missriss Bosanquet, fast gef., fugelicht, zart fleischfarb † . . . . .	36 kr. bis	—
Nelly, leicht geröthel weiß . . . . .	1	—
Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin † . . . . .	48 kr. bis	1
Ninon de l'Enclos, gef., dunkelrosa . . . . .	—	36
Oscar Leclerc, gef., lebhaft dunkel-carmoisin † . . . . .	1	—
Parquin, gef., violettroth † . . . . .	—	48
Parfait, gef., purpurroth † . . . . .	—	48
Paul Joseph, gef., unübertrefflich reich, dunkel carmoisin-purpur . . . . .	48 kr. bis	1
Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, starkwüchsig † . . . . .	30 kr. bis	—
Pigeron ( <i>Berger</i> ), sehr gr., und gef., dunkelpurpurroth . . . . .	1	—
Pourpre Fafait, gef., dunkelpurpur . . . . .	—	48
Première des Charpennes, rosa, fleischfarb, weiß gerändert † . . . . .	48 kr. bis	1
Prince de Croi, gef., schön rosa † . . . . .	48 kr. bis	1
Prinzesse Clementine, gef., violettroth . . . . .	—	36
Proserpine, gef., lebhaft gesättigt carmoisin † . . . . .	—	48
Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart fleischfarb † . . . . .	—	36
Reine des Vierges, gr., sehr gef., fleischfarb-rosa † . . . . .	—	48
Scipion Cochet, ( <i>Cochet</i> ), fast gef., feurig purpur carmoisin . . . . .	1	—
Scipitarus, sehr gef., fugelicht, lebhaft fleischfarb † . . . . .	—	48
Souchet, gef., reich carmin-purpur † . . . . .	—	48
Souvenir de l'Arquebuse, Preisblume . . . . .	1	12
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., fugelicht, firschröth . . . . .	—	48
Souvenir de Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich † . . . . .	36 kr. bis	1
Souvenir du 4 Mai, gr., schön gebaut, carmin mit gelblichem Schimmer . . . . .	1	—
Souvenir d'un frere, ( <i>Oger</i> ), schöner als Commiçe de S. et Marne . . . . .	1	—
Surpasse Commiçe de Seine et Marne, hochroth oder sammetrubin . . . . .	1	30





	n.	kr.		n.	kr.
Asphodelus luteus . . . . .	24		Cerastium tomentosum, Einsamung . .	—	—
luteus fl. pleno . . . . .	36		pr. 12 Stück . . . . .	24	
Aster bicolor fl. pleno . . . . .	18		Convallaria majalis, Maiblümchen . .	6	
grandiflorus . . . . .	18		fl. rubro, ditto, rosenfarben . .	12	
Reevesii, schön . . . . .	24		fl. pleno ditto, gefülltes . .	12	
roseus, (atropurpureus) . . . .	18		fol. var. ditto, buntbl. . . . .	12	
Astilbe rivularis, eine Epidenartige groß-	—		pr. 12 Stück . . . . .	1	—
blättrige Pflanze von kräftigem Wuchse.	36		Convolvulus altheoides * . . . . .	24	
Baptisia caerulea . . . . .	24		Corydalis spectabilis . . . . .	18	
Barbarea vulgaris fol. var. . . . .	—		eximia . . . . .	24	
Bellis perennis, . . . . .	6		formosa . . . . .	24	
ditto 12 Stück in 12 Sorten . .	36		Cyclamen europaeum fl. . . . .	12	
Highlander, großblühendes neues	—		ditto pr. 12 Stück . . . . .	2	—
Maßliebchen, mit Blumen von der Größe	—		Cynoglossum longiflorum . . . . .	18	
eines Falters, einer Rosebe gleichend.	24		Delphinium Barlowi fl. pleno . . . .	24	
alba grandiflora . . . . .	12		elatum fl. pleno . . . . .	24	
Queen Victoria . . . . .	18		perenne . . . . .	12	
Bocconia cordata . . . . .	30		grandiflorum . . . . .	12	
Caltha palustris fl. pl., heret. Frühlingsschmuck	15		Dianthus alpinus fl. . . . .	12	
pr. 12 Stück . . . . .	24		carioph. Remontants, neu im Ein-	—	
monstrosa plena . . . . .	24		ter blühende, 9 Sorten, pr. Stck.	18	
Calystegia pubescens, neue aufkletternde	—		glacialis fl. . . . .	18	
Winde aus China mit rosenkuckeligen	—		hybridus fl. pl. . . . .	12	
gefüllten Blumen in dichten Quirlen.	12		Dictamnus fraxinella . . . . .	12	
ditto pr. 12 Stück . . . . .	2	—	tauricus . . . . .	2	—
ditto pr. 100 Stück . . . . .	12	—	Dielytra spectabilis, wunder schön .	—	
Campanula grandiflora (Wahlenber-	—		30 kr. bis . . . . .	1	—
gia), . . . . .	24		Digitalis hybrida . . . . .	24	
albo pleno . . . . .	36		Dodecatheon Meadea . . . . .	18	
nobilis, neu, sehr ansehend . . .	12		pr. 12 Stück . . . . .	3	—
alba . . . . .	24		albicans . . . . .	36	
garganica, schöne Ampelpflanze .	48		Dracocephalum Louisianum . . . . .	12	
grandis . . . . .	12		speciosum . . . . .	18	
alba . . . . .	18		superbum . . . . .	18	
glomerata fl. pleno fl. . . . .	24		Echinops ruthenicus, eine sehr schöne blau-	—	
muralis, sehr niedrig fl. . . . .	24		blühende biselartige Pflanze, deren	—	
persicifolia fl. pleno . . . . .	12		Blumen sich auch in getrocknetem	—	
urticaefolia, fl. pleno . . . . .	12		Zustande sehr lange halten . .	24	
pendula (Symphiandra) . . . . .	18		pr. 12 Stück . . . . .	4	—
barbata fl. . . . .	18		Epimedium macranthum, * schön . .	24	
linifolia fl. . . . .	18		colchicum * . . . . .	30	
pusilla fl. . . . .	12		pinnatum elegans * . . . . .	30	
alba (caespitosa) fl. . . . .	12		violaceum * . . . . .	30	
speciosa . . . . .	12		rubrum * . . . . .	12	
pyramidalis . . . . .	12		versicolor . . . . .	1	—
rhomboidea fl. pleno fl., sehr schön,	—		alpinum fl. . . . .	12	
eignet sich zu Drahtsalzieren . .	24		Erigeron alpinum . . . . .	24	
Cassia marylandica . . . . .	12		grandiflorum . . . . .	24	
Chelone barbata * . . . . .	18		Eryngium alpinum . . . . .	24	
fl. albo * . . . . .	24		bromeliaefolium . . . . .	—	
fl. carneo * . . . . .	24		Fritillaria imperialis et var. . . . .	12	
Chrysanthemum indicum.	—		Fumaria capnoides . . . . .	12	
30 neueste kleinblumigte Sorten,	—		lutea . . . . .	12	
Ausgabe von 1852-53 . . . . .	—		Funkia, grandiflora . . . . .	1	—
pr. Stück 15 kr. . . . .	—		andere bei Hemerocallis.	—	
neue großblumigte ditto 15 kr.	—		Gaillardia picta . . . . .	12	
Clematis erecta et var. . . . .	12		Galanthus nivalis . . . . .	4	
integrifolia . . . . .	12		Gentiana acutis fl. . . . .	24	
major . . . . .	18		asclepiadea . . . . .	24	
bicolor * . . . . .	1	—	alba . . . . .	30	
azurea grandiflora * . . . . .	1	—			
tubulosa mongolica . . . . .	24				

	fl.	kr.		fl.	kr.
Gentiana Gebleri . . . . .	—	—	Iris amœna . . . . .	—	12
pneumonanthe . . . . .	—	30	brachicuspis . . . . .	—	18
verna . . . . .	—	24	stenogyna . . . . .	—	18
purpurea . . . . .	—	36	virginia . . . . .	—	12
Geranium pratense, fl. pleno . . . . .	—	12	florentina alba, groß, fast weiß . . . . .	—	12
Gladiolus.			Apollon . . . . .	—	18
floribundus, . . . . .	—	24	Unique . . . . .	—	18
Gandavensis und var. der hochwachsende, feuerroth; die prächtvollsten Varietäten ähneln einander und werden deshalb nicht mehr besonders fortsetzt . 12 kr. bis	—	30	Raphael, extra seine Zeichnung . . . . .	—	24
ditto . 12 Stück fl. 2 bis	3	—	Canary, sehr schön hellgelb . . . . .	—	18
ramosus ästiger, fein carmin-rosa . . . . .	1	—	Anais . . . . .	—	18
circa 20 Varietäten			Alonzo . . . . .	—	18
pr. Stück 36 kr. bis	10	—	Arlequin . . . . .	—	18
pr. 12 Stück fl. 6 bis	1	—	multicolor, prächtig goldgelb . . . . .	—	18
Globularia cordifolia $\Delta$ . . . . .	—	12	pulcherrima . . . . .	—	18
nudicaulis $\Delta$ . . . . .	—	12	biflora . . . . .	—	18
Glossocomia clematidea *	—	12	furcata . . . . .	—	18
Glycine Apios . . . . .	—	12	hematophylla, schöne dunkelblaue . . . . .	—	18
Gnaphalium margaritaceum . . . . .	—	12	Bronze Stoffels . . . . .	—	12
Gypsophylla paniculata, sehr fein, auf Rasenplätze passend . . . . .	—	12	versicolor . . . . .	—	18
Helleborus abchasius fl. albo $\Delta$ . . . . .	1	—	graminea . . . . .	—	12
atrorubens . . . . .	—	24	pumila . . . . .	—	6
graveolens . . . . .	—	24	albida . . . . .	—	—
intermedius . . . . .	—	24	intermedia . . . . .	—	18
laxus . . . . .	—	24	coerulea . . . . .	—	18
pallidus . . . . .	—	24	latea . . . . .	—	12
niger . . . . .	—	24	flavescens . . . . .	—	18
purpurascens . . . . .	—	24	gracilis . . . . .	—	48
Hemerocallis alba (Funkia) . . . . .	—	12	sibirica, äussert herrlich . . . . .	—	12
cœrulea . . . . .	—	12	variegata . . . . .	—	12
cucullata fol. var., schöne Dekorations- pflanze . . . . .	—	36	Van de Will, sehr groß, goldfarb und carmoisin . . . . .	—	18
grandiflora . . . . . 30 kr. bis	1	—	venusta . . . . .	—	12
lancifolia fol. var. . . . .	—	24	Zebrina, goldfarb und carmoisin . . . . .	—	18
fl. albo . . . . .	—	36	Jeffersonia diphylla $\Delta$ . . . . .	—	48
flava . . . . .	—	12	Liatris pumila $\Delta$ . . . . .	—	24
fulva . . . . .	—	12	scariosa $\Delta$ . . . . .	—	24
fol. var. . . . .	—	18	Leicestera formosa . . . . .	—	24
fl. pleno . . . . .	—	24	Lilium atrosanguineum . . . fl. 1 bis	2	—
rutilans . . . . .	—	24	aurantiacum (venustum) fl. 1 bis	2	—
Sieboldi . . . . .	—	18	bulbiferum . . . . .	—	12
alba . . . . .	—	24	Brownii . . . . . fl. 2 bis	4	—
undulata, fol. var., prächtige Deko- rationspflanze . . . . .	—	24	canadense . . . . .	1	12
Helianthus multiflorus, fl. pleno . . . . .	—	24	Catesbaei . . . . .	—	—
Helianthemum coccineum fl. pleno $\Delta$ . . . . .	—	24	candidum . . . . .	—	18
purpureo pleno . . . . .	—	24	excelsum (peregrinum, testaceum Isabellinum) hochwachsende weiß- gelbe . . . fl. 1 bis	2	—
luteo pleno . . . . .	—	24	eximium (japonicum) * . . . . .	1	—
Hieracium lanatum? mit sehr großen Blät- tern und Blumenkelchen . . . . .	—	20	lancifolium album * . . fl. 1 bis	3	—
Hibiscus palustris * . . . . .	—	12	punctatum * . . . 1 #	4	—
fl. roseo * . . . . .	—	24	speciosum (roseum ru- brum) * . . . fl. 1 bis	5	—
Hieracium aurantiacum $\Delta$ . . . . .	—	6	sanguinolentum, schöne dunkle Sorte . . fl. 3 bis	10	—
Humulus Lupulus, Kentische Hopfen pr. 12 Stück . . . . .	—	48	Martagon et var. . . . .	—	24
Indigofera Dosua . . . . .	—	24	pomponium . . . . .	—	24
			tigrinum . . . . . 12 kr. bis	—	30
			ditto per 12 Stück fl. 2 bis	3	—
			Linaria reticulata * . . . . .	—	36
			Lathyrus latifolius . . . . .	—	18



	fl. kr.		fl. kr.
Lobelia campanulata, *		Paeonia odorata (Lemon) . fl. 1 bis	2 —
Comte de Paris * d <sup>o</sup> } bunselfgariady		plenissima variegata „ 1 „	3 —
sanguinea * d <sup>o</sup> }		prolifera tricolor . „ 1 „	3 —
Agathocles * carm.	24	pulcherrima modesta . . .	2 —
Antigone * weiß		plenissima superba . fl. 1 bis	3 —
Milleri * blau		speciosa . . . „ 1 „	2 —
Williamsi * purpur		sulphurea . . . „ 1 „	3 —
Lotus corniculatus, fl. pl. A . . .	24	tricolor . . . „ 1 „	3 —
Lychnis chalconica . . . . .	6	trionphe du Nord . . . . .	2 —
fl. albo pleno . . . . .	24	tricolor flavescens . fl. 1 bis	3 —
fl. pl. major . . . . .	30	triumphans . . . . . „ 1 „	2 —
dioica fl. pleno, . . . . .	12	triumphans gandavensis	3 30
albo pleno major . . . . .	48	Victoire modeste . fl. 1 bis	4 —
viscaria fl. pl., Bechnette . . .	6	Victoire tricolor . „ 1 „	3 —
ditto pr. 12 Stück	1 —	12 Sorten Paeonia chinensis	
ditto pr. 100 Stück	6 —	nach unferer Wahl . fl. 6 bis	18 —
Mandragora officinalis . . . . .	—	100 Stück in 25 Sorten	75 —
Matricaria Parthenium grandiflorum.	12	humilis . . . . .	24
fistulosa fl. pl. . . . .	12	fl. pleno . . . . .	30
Melissa grandiflora . . . . .	18	nidus avis . . . . .	36
Merandera sobulifera . . . . .	—	hybrida . . . . .	36
Molinia coerulea, neuß stierender Mandragora	12	officinalis, fl. pleno . . . . .	24
Monarda didyma * . . . . .	12	carnea striata . . . . .	24
Mulgedium alpinum A . . . . .	24	rosea plena . . . . .	24
Myosotis palustris . . . . .	4	anemoneflora . . . . .	1 —
azorica A . . . . .	24	paradoxa fimbriata plena . . .	48
Nordmannia cordifolia * . . . .	18	tenuifolia fl. pl. fl. 1. 30 kr. bis	4 —
Orobis atropurpureus . . . . .	18	tenuifolia insignis . . . . .	1 12
vernus purpureus . . . . .	24	Wittmanniana, gelb . . fl. 2 bis	4 —
albus . . . . .	24	Papayer bracteatum . . . . .	12
fl. pleno . . . . .	36	Penstemon gentianoides coccineus, *	18
Oxalis elegans atrorubens * . . .	24	formosus * . . . . .	24
Paeonia chinensis odorata, weiß 30 kr. bis	1 —	fl. albo * . . . . .	24
pr. 12 Stück fl. 5 „	8 —	Bucki * . . . . .	24
edulis, rosa . . 30 kr. „	1 —	atrocoeruleus * . . . . .	1 —
pr. 12 Stück fl. 5 „	8 —	grandis * . . . . .	2 —
fragrans, rosa . 30 kr. „	1 —	azureus * . . . . .	30
pr. 12 Stück fl. 5 „	8 —	Estheri * . . . . .	30
Pottii, bunselfcarm. 48 kr. „	2 —	belle de St. Laurent *	48
pr. 12 Stück fl. 8 „	12 —	variabilis * . . . . .	36
Reevesi, hellrosa . 36 kr. „	2 —	Pellieri * . . . . .	18
pr. 12 Stück fl. 6 „	12 —	purp. superb. * . . . .	30
ch. anemonefl. flavescens fl. 1 „	3 —	glaucus . . . . .	24
striata . . . . . „ 1 „	3 —	latifolius . . . . .	24
bicolor . . . . . „ 1 „	3 —	Mackayanus . . . . .	24
Buykii . . . . . „ 1 „	3 —	pulchellus . . . . .	24
Comte de Paris . . . . .	2 —	cordifolius . . . . .	—
Duchesse de Nemours fl. 1 bis	3 —	Phlox, nachfolgend besonders ver-	
Duchesse d'Orleans . . . . .	2 —	zeichnet.	
festiva . . fl. 1. 30 kr. bis	3 —	Plumbago Larpentae . . . . .	12
festiva maxima . . . . .	7 —	Potentilla decora fl. pleno . . .	12
globosa . . . . . fl. 1 bis	3 —	Demayi . . . . .	24
Hericartiana . . . . . „ 1 „	4 —	Bainesiana . . . . .	36
ligulata . . . . . „ 1 „	2 —	coccinea . . . . .	24
lilacina superba . . . . . „ 1 „	3 —	Fintelmanni . . . . .	24
lutea plenissima (Buyk), „ 1 „	3 —	Macnabiana . . . . .	24
lutea variegata . . . . . „ 1 „	3 —	Russeliana . . . . .	18
lutescens . . . . . „ 1 „	3 —	Smouthi . . . . .	24
nec plus ultra . . . . .	7 —	Tormentilla Tongii A . . . . .	24
		bicolor grandiflora . . . . .	36

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Primula acutis luteo pleno</i> . . . . .	18		<i>Stipa pennata</i> . . . . .	12	
<i>lilacino pleno</i> . . . . .	24		<i>Tiarella cordata</i> <b>A</b> . . . . .	18	
<i>fulgens plena</i> . . . . .	48		<i>Thalictrum aquilegifolium</i> . . . . .	12	
<i>auricula</i> , Zämlinge von jeder Blor- blumen pr. 12 Stück . . . . .	3	—	<i>purpureum</i> . . . . .	12	
<i>nigra plena</i> . . . . .	1	30	<i>speciosum</i> . . . . .	24	
<i>denticulata</i> . . . . .	48		<i>tuberosum</i> <b>A</b> . . . . .	24	
<i>marginata</i> . . . . .	30		<i>Thymus parviflorus</i> <b>A</b> . . . . .	12	
<i>involuta</i> . . . . .	30		<i>corsicus</i> <b>A</b> . . . . .	18	
<i>cortusoides</i> . . . . .	18		<i>Tigridia conchiflora</i> * . . . . .	24	
<i>veris nigricans pleno</i> . . . . .	24		<i>conchiflora minor</i> * . . . . .	36	
<i>Pulmonaria virginica</i> , Frühlingsblume . . . . .	24		<i>pavonia</i> , * . . . . .	4	
<i>Ranunculus repens</i> , fl. pleno . . . . .	6		ditto pr. 100 Stück . . . . .	3	—
<i>aconitifolius albo pleno</i> . . . . .	24		<i>pavonia coccinea</i> * . . . . .	36	
<i>Rheum Tobolsk</i> , riechenhafte Mattpflanze . . . . .	24		<i>fulgens</i> * . . . . .	36	
<i>Myatt's Queen</i> , engl. Gemüße . . . . .	18		<i>splendens</i> * . . . . .	36	
<i>Rudbeckia columnaris</i> . . . . .	12		<i>Tradescantia virginia splendens</i> . . . . .	24	
<i>fulgida</i> . . . . .	12		<i>rubro pleno</i> . . . . .	24	
<i>purpurea</i> . . . . .	24		<i>Trollius aconitifolius</i> . . . . .	18	
<i>speciosa</i> . . . . .	24		<i>americanus</i> . . . . .	24	
<i>serotina</i> . . . . .	24		<i>asiaticus</i> . . . . .	18	
<i>Rhodiola rosea</i> <b>A</b> . . . . .	24		<i>Trollius atrebatensis</i> . . . . .	24	
<i>Salvia officinalis tricolor</i> , sehr schön . . . . .	24		<i>Demayanus</i> . . . . .	24	
<i>scarlea</i> , vorzüglich zur Wein- und Öfig- fabrikation . . . . .	18		<i>giganteus</i> . . . . .	36	
<i>Sanguinaria canadensis</i> . . . . .	6		<i>europeus albidus</i> . . . . .	18	
<i>Saxifraga</i> , mehrere zu Gruppierungen in Steinen geeignete Sorten <b>A</b> . . . . .	12		<i>hybridus</i> . . . . .	18	
<i>Scutellaria macrantha</i> . . . . .	24		<i>napellifolius</i> . . . . .	18	
<i>Seylla sibirica</i> , schöne blaue Frühlingsblume . . . . .	6		<i>Smouthii</i> . . . . .	24	
ditto . . . . . pr. 12 Stück . . . . .	4		<i>Tussilago petasites</i> . . . . .	12	
<i>campanulata</i> . . . . .	4		<i>fragrans</i> * . . . . .	12	
<i>hyacinthoides</i> . . . . .	4		<i>alba</i> . . . . .	12	
<i>Sedum</i> , in circa 12 Sorten pr. Stck. . . . .	12		<i>Valeriana rubra</i> . . . . .	6	
<i>Sempervivum</i> in mehr. Sort. <b>A</b> <b>A</b> . . . . .	12		<i>Veronica gentianoides</i> . . . . .	6	
<i>Silene maritima</i> fl. pleno <b>A</b> . . . . .	18		<i>corymbosa</i> . . . . .	30	
<i>alpestris</i> <b>A</b> . . . . .	18		<i>longifolia</i> . . . . .	6	
<i>orientalis</i> . . . . .	24		<i>paniculata</i> . . . . .	6	
<i>Saxifraga</i> <b>A</b> . . . . .	12		<i>aphylla</i> . . . . .	12	
<i>Syrtoria europaea</i> , Hauptpflanze . . . . .	24		<i>repanda</i> . . . . .	12	
<i>Sisyrinchium anceps</i> . . . . .	12		<i>Veratrum nigrum</i> . . . . .	24	
<i>album grandiflorum</i> . . . . .	24		<i>Viola altaica</i> , großblühende Stiefmütterchen 12 sehr schöne Sorten . . . . .	6	—
<i>convolutum</i> . . . . .	12		gewöhnliche ältere pr. 12 Stück . . . . .	2	—
<i>Sabini</i> . . . . .	12		<i>obliqua</i> fl. striato . . . . .	12	
<i>Soldanella alpina</i> <b>A</b> . . . . .	24		<i>odorata albo pleno</i> . . . . .	12	
<i>asarifolia</i> <b>A</b> . . . . .	12		<i>rubro plenissimo</i> . . . . .	12	
<i>Clusii</i> <b>A</b> . . . . .	24		<i>caeruleo pleno</i> . . . . .	6	
<i>minima</i> <b>A</b> . . . . .	24		<i>Florine</i> . . . . .	18	
<i>montana</i> <b>A</b> . . . . .	24		<i>de Parme</i> . . . . .	12	
<i>Spirea filipendula</i> fl. pl. . . . .	18		<i>pyrolaeiflora</i> . . . . .	1	30
<i>japonica (Houteia)</i> * . . . . .	24		<i>Wahlenbergia grandiflora</i> <b>A</b> . . . . .	24	
<i>ulmaria</i> , fl. pl. . . . .	24		<i>albo pleno</i> <b>A</b> . . . . .	36	
fl. rubro ( <i>venusta</i> ) . . . . .	30		<i>Wulfenia carinthiaca</i> <b>A</b> . . . . .	24	
<i>Aruncus</i> fol. var. . . . .	30		<i>Amherstiae</i> . . . . .	1	—
<i>Humboldti</i> . . . . .	24		<i>Yucca flaccida</i> , eine frei ausfallende Frucht- pflanze . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—
<i>Stenactis speciosa</i> . . . . .	12		<i>filamentosa</i> . . . . . fl. 1. 30 <b>A</b> <b>A</b>	3	—

Von vielen obigen Staudengewächsen können grössere Parthieen zur Anlage von Gruppen zu sehr mässigen Preisen abgegeben werden.



# N e u e P h l o x .

Durch Kreuzung der *Phlox decussata* mit *P. suffruticosa* ist ein Sortiment gewonnen worden, welches die ausdauernde Natur der Einen mit den Vorzügen der Anderen in sich vereinigt. Diese neuen Hybriden zeichnen sich aus durch Farbe, Form und Größe der Blumen, durch schöne Stellung und Reichthum der Blumenbouquets, durch niedrigen, gedrängten Wuchs, und endlich durch ihre Genügsamkeit mit dem gewöhnlichen Gartenboden, während die reinen *P. suffruticosa* in Bezug hierauf oft sehr empfindlich sich zeigen. Die Vermehrung für diesen Herbst ist noch sehr beschränkt; dagegen werden wir allen geneigten Aufträgen für das Frühjahr 1854 entsprechen können.

		n.	kr.			n.	kr.				
a.) <i>Phlox decussata</i> , und deren Hybriden				Lilacina albicans							
M. Domage, ( <i>Lierval</i> ),	}	pr. Stück	— 48	Madame Anette	}	pr. Stück	— 30				
Docteur Andry, ( <i>L.</i> )				" Boucharlet							
Fanny Adam, ( <i>L.</i> )				" Coursel							
President Decaisne, ( <i>L.</i> )				" G. St. Cyr							
Madame de Vatry, ( <i>L.</i> )				" Guillot							
Charles Rouillard, ( <i>L.</i> )				" Henderson							
Madame Pescatore, ( <i>L.</i> )				Marie Bellanger							
Madame Basseville, ( <i>L.</i> )				Paon							
Madame Corbay, ( <i>L.</i> )				Purpurea striata							
Madame Veillard, ( <i>L.</i> )				Rève d'amour							
Madame Milleret, ( <i>L.</i> )	}	pr. 12 St.	5 —	Sallier	}	pr. Stück	— 30				
Amiral de Linois ( <i>Fontaine</i> ),				Stella matutina							
Elisa ( <i>F.</i> )	}	pr. 12 St.	8 —	Striata	}	pr. 12 St.	5 —				
General Bréa, ( <i>F.</i> )				Striata superbissima							
Mr. Bréchon, ( <i>F.</i> )				Villaret joyeuse							
Madame Bréchon, ( <i>F.</i> )				Vicepräsident Adam							
General Castellane, ( <i>F.</i> )				(b. <i>Phlox suffruticosa</i> .							
Célestine, ( <i>F.</i> )				Bachus				}	pr. Stück	— 30	
Madame Thomann, ( <i>F.</i> )				Belle de Nancy							
Emilie Rousselle ( <i>F.</i> )				Captivation							
Mr. Thomann, ( <i>F.</i> )				Cyanca							
ferner:				Hébé							}
30 noch unbekannte <i>Phlox</i> ( <i>Lierval</i> )	}	pr. 12 St.	5 —	Imbricata							
Alba pumila				Lambert Loirie							
Alboni				Mademoiselle d'Angri							
Armand d'Artois				Madame le Grand							
Alice Allain				" Recamier							
Comte de Chambord				Roi Leopold							
Comtesse de Chambord				fl. 1.		}	pr. 12 St.	5 —			
Deuil de la Cesse de Marnes				Van Houttei							
Docteur Guerzent				c.) <i>Phlox Drummondii</i> *.							
Etoile				}	pr. Stück	— 30	Mayi variegata	}	pr. Stück	— 36	
Etendart							Radetzky				
Ferrand							Thompsoni				
Foudroyant							Depressa Criterion				
d.) <i>Phlox setacea</i> *.				Nelsoni	}	pr. Stück	— 24				

## Neue Verbenen.

pr. Stück 20 kr. bis 30 kr.

Admiration, schön blau.

Anacreon, dunkelblau.

Asté, violett, fleischf. und carmoisin gestr.

Beauté de Vignely, lila, violett u. rosa, gltr.

Beauté suprême, lila-violett, gestreift

Céline Mallet, rein weiß.

Charmante Zoé, fleischfarb mit carmin.

Emma, purpur und carmoisin.

Empereur de la Chine, scharlach-carmoisin.

Euphrosine, fleischfarb und carmin.

Frédéric, rosa mit scharlach.

General Dronot, dunkelcarmoisin mit purpur.

Heroine, lila-blau.

John Salter, zimmer-scharlach.

Junon, carmin.

La Purpurine, groß, dunkelscharlach.

L'ardoisée, dunkelblau.

Leopold, purpur und weiß gestreift.

Madame de Gournay, incarnat gestreift.

Madame François, hellzinnber.

Madame Mallet, amarant-carmoisin.

Madame Rattier, fleischfarb mit carmin.

Mathilde Humann, dunkelblau.

Morphé, dunkelblau.

Marie Lierval, violettroth und carmoisin.

Mr. Julien, hochscharlach.

Nigricans, dunkelcarmoisin.

Niobé, weiß mit carmin.

Parfum de Madeleine, weiß, blau gestreift.

Rachel, fleischfarb, lila und carmoisin.

Scarlet defiance, zimmer-scharlach.

Valentine de Saveuse, dunkelblau.

Virginus, blau

## Gewächshaus-Pflanzen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

	fl. kr.		fl. kr.	
Abelia triflora . . . . .	24 kr. bis	— 48	Acacia impressa, ( <i>hispidula</i> ) 30 kr. bis	1 30
Abutilon striatum . . . . .	— 24		Hügelii . . . . .	1 —
insigne . . . . . fl. 1 bis	2 30		lineata . . . . . 30 kr bis	1 30
venosum . . . . .	— 30		ditto pr. 12 Stück	6 —
floribundum . . . . .	— 36		longifolia trinerva . . . fl. 1 bis	2 —
Acacia affinis . . . . .	1 —		longissima ( <i>lorifolia</i> ) . . . . .	1 —
armata ( <i>paradoxa</i> ) . . . . .	— 24		mimosoides . . . . .	1 —
asparagoides ( <i>Brownii</i> ) 48 kr. bis	1 —		oleifolia elegans . . . . .	2 —
biloba . . . . .	— —		Pawlikowskiana . . . . .	3 30
calamifolia . . . . . fl. 1 bis	2 —		pentadenia . . . . .	1 —
cavenia . . . . .	— —		platiptera . . . . . fl. 1 bis	2 —
ciliaris . . . . . 30 kr. bis	1 —		præcox . . . . . 1 .	2 —
conspicua ( <i>vestita</i> ) . . . fl. 1 bis	2 —		pubescens . . . . .	2 —
ditto pr. 12 Stück	12 —		pulchella major . . . 30 kr. bis	2 —
cordifolia . . . . . 30 kr. bis	1 —		ditto pr. 12 Stück	6 —
Cunninghami ( <i>petiolaris</i> Lehmann)	3 30		pulchella spectabilis . . . . .	— —
dealbata ( <i>Esterhaziana</i> ) fl. 1 bis	3 —		polymorpha ( <i>rutifolia</i> ) . . 1 bis	2 —
decora . . . . .	7 —		rotundifolia . . . . .	2 —
Doneana . . . . .	— —		salicifolia . . . . . fl. 1 bis	2 —
Drumondi . . . . .	— —		sulcata . . . . . fl. 1 bis	2 —
floribunda . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	3 —		scolopendrioides ( <i>ensata</i> ) . . .	2 —
glaucescens ( <i>candicans</i> , <i>glauco-</i>			stricta multiflora . . . . .	— 30
<i>phylla</i> , <i>cultriformis</i> ) fl. 1 bis	3 —		thegonocarpa . . . . .	1 12
ditto pr. 12 Stück	12 —		triangularis . . . . .	1 12
grandis . . . . .	— —		variabilis ( <i>Hügel</i> N <sup>o</sup> 2) . . .	1 12



	fl. kr.		fl. kr.
Adenandra ciliata ( <i>Diosma</i> ) . . . . .	—	Berberis leucantha ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .	—
grandiflora . . . . .	—	trifoliata ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .	—
ovata . . . . .	—	floribunda . . . . .	1 12
speciosa . . . . .	—	Darwini . . . . .	5 —
trifoliata . . . . .	—	Jamesoni . . . . .	1 30
uniflora grandiflora . . . . .	—	macrophylla . . . . .	1 30
Agathosma ciliaris . . . . .	—	tenuifolia ( <i>Mahonia</i> ) fl. 1 bis	5 —
Ageratum caelestinum novum . . . . .	24	trifoliata . . . . .	1 4
Agnostus sinuatus, prachtvolle Proteacea mit orangefarbenen Blumen und großen eichenlaubförmigen Blättern fl. 7 bis	25	vitellina . . . . .	2 30
integrifolius . . . . . fl. 7. bis	15	andere mehr unter den Gehölzen.	
Agapanthus umbellatus albiflorus . . . . .	36	Beschornesia yuccoides	—
striatus . . . . .	36	( <i>Lindley</i> ) fleisch . . . . .	—
maximus . . . . . fl. 2 bis	5	Bignonia Carolinae . . . . .	48
Akebia quinata, fr., Schlingpflanze . . . . .	1 30	crucigera . . . . . 24 kr. bis	48
Alona caelestis . . . . . 30 kr. bis	1	capreolata . . . . . 24 „ „	36
Aloysia citriodora . . . . .	24	coccinea grandiflora ( <i>Siebold</i> ) . . . . .	5 —
Anagallis caerulea grandifl. . . . .	24	grandiflora . . . . . 48 kr. „	1 30
Andromeda Drumondi . . . . .	1 12	jasminoides . . . . . 30 „ „	1 —
buxifolia . . . . .	30	floribunda . . . . . 30 „ „	1 —
phyllirifolia . . . . .	2	rosea . . . . . 30 „ „	1 —
formosa, eine sehr empfehlenswerthe prächt- ige Pflanze . . . . .	2	australis . . . . . 30 „ „	1 —
floribunda . . . . .	—	major . . . . . 30 „ „	1 —
Anemone japonica fr. . . 12 kr. bis	24	sempervirens . . . . . 30 „ „	1 —
Angophora, f. Metrosideros.	—	speciosa ( <i>picta</i> , <i>Lindley</i> ) . . . . .	30
Anomatheca cruenta . . pr. 12 Stück	48	Tweediana . . . . .	1 —
Anopteris glandulosa . . . . .	—	venusta . . . . .	48
Auracaria, bei den Coniferen besonders ver- zeichnet.	—	Alle Bignonien gehören zu den schönst- blühenden Schlingpflanzen.	
Aralia crassifolia . . . . .	5	Billardiera purpurea, eine schöne Schling- pflanze mit glänzend dunkelblauen Blüthen . . . . . 30 kr. bis	48
trifoliata . . . . .	5	Blandfordia nobilis . . . . .	3 —
sambucina . . . . .	1 30	flammea . . . . .	6 —
andere bei den Warmhauspflanzen.	—	Boronia anemonefolia ( <i>Fraseri</i> )	—
Aotus ferrugineus . . . . .	30	fl. 1 bis	2 30
Arbutus nepalensis . . . . .	2	crenulata . . . . . „ 1 „	2 30
procera . . . . .	2	denticulata . . . . . 30 kr. bis	2 —
discolor . . . . .	1 30	Drummondii . . . . .	12 —
Andrachne . . . . . fl. 2 bis	5	ledifolia . . . . .	3 —
Croomii . . . . .	—	microphylla ( <i>tetrandra</i> ) . . . . .	3 30
magnifica . . . . .	—	pinnata . . . . .	2 —
Aristaea capitata . . . . .	36	polygalifolia . . . . . fl. 1 bis	2 —
Arundinacea falcata, Blattpflanze . . . . .	24	serrulata . . . . .	—
Azalca indica, besonders verzeichnet.	—	triphylla . . . . .	5 —
Baeckea pendula, sehr niedrig 30 kr. bis	1	viminea . . . . . 30 kr. bis	1 —
Banksia nemula . . . . .	2 30	floribunda . . . . .	2 —
ericifolia . . . . . fl. 1 bis	5	Bouvardia splendens . . . . .	30
Hügelii . . . . . 2 „	8	leiantha, prächtige Winterblume 24kr. bis	1 —
philicaefolia . . . . . 2 „	5	Bossiaea plumosa disticha . . . . .	2 —
spinulosa . . . . . 1 „	5	microphylla vera . . . . .	2 —
Bauhortia splendens . . . . .	1	pauciflora . . . . .	—
sparsa . . . . .	1 12	Brachysema species . . . . .	1 30
purpurea . . . . .	1 30	Brugmansia candida ( <i>Datura</i> ) 30 kr. bis	1 —
villosa . . . . .	1	Knigthi . . . . .	1 —
Bejaria glauca . . . . .	4	sanguinea . . . . .	48
Berberis Ehrenbergii ( <i>Mahonia</i> ), fl. 5 bis	15	Brunia imbricata . . . . .	30
Fortunei ( <i>Mahonia</i> ) . . fl. 1. „	2 30	lanuginosa . . . . .	30
actinacantha . . . . . „ 1. „	2	Budlea Lindleyana . . . . .	24
Knigthii . . . . .	1 30	Burchellia capensis . . . . .	1 —
gracilis ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .	—	Bursaria spinosa . . . . . 36 kr. bis	1 12
		Drummondii ( <i>Citriobatus multifl.</i> )	48

	fl. kr.		fl. kr.
Burtonia sessilifolia fl. 1-30 kr. bis	3	Cineraria Amaranthina (R.) . . .	30
violacea . . . . .	2	Amarathina magna (R.) . . .	1
Calceolaria in vielen ausgezeichneten Sorten, pr. St.	24	Atroviolacea (R.) . . . . .	1
pr. 12 Stück fl. 3. bis	4	Atropurp. splendens (R.) . . .	1
Hendersoni . . . . .	36	Bardo (R.) . . . . .	36
Sultan . . . . .	36	Bavaria (R.) . . . . .	24
violacea ( <i>Jovellana punctata</i> )	—	Beauty of Peckham (J.) . . .	36
Calothamnus sanguineus fl. 1 bis	2	Bellina (R.) . . . . .	36
Schaueri . . . . . fl. 1 bis	2	Blue Bonnet (J.) . . . . .	36
Calistegia pubescens (Staubengewächse).	—	Charlotte Grisi . . . . .	36
Camellia (besonders vergelbend).	—	Coletta (R.) . . . . .	1
Canna indica.	—	Cynthia (R.) . . . . .	1
gigantea, Dekorationspflanze . . .	36	Compacta ( <i>Lemoine</i> ) . . . . .	30
iridiflora . . . . .	1	Coelestis (R.) . . . . .	48
macrophylla . . . . .	1 12	Delecta (R.) . . . . .	1
nepalensis . . . . .	30	Elect (J.) . . . . .	30
aurantiaca . . . . .	30	Flora Mac Ivor . . . . .	36
discolor, rotböltrig . . . . .	30	Formosa superba . . . . .	36
Warscewiczii . . . . .	1 12	Germania (R.) . . . . .	48
zur Anpflanzung . . . pr. 12 Stück	4	Griette (R.) . . . . .	1
Cantua dependens . . . . .	1	Lavinia (R.) . . . . .	1
splendens ( <i>Whitringia superba</i> )	1	Mathieu de Dombale (L.) . . .	24
Ceanothus caeruleus . . . 30 kr. bis	1	Milo (R.) . . . . .	1
cuneifolius . . . . .	1 30	Modesta (R.) . . . . .	1
dentatus . . . . .	1 30	Pauline (H.) . . . . .	36
divaricatus . . . . . 30 kr. bis	1	Philomele (R.) . . . . .	1
Hartwegii . . . . . 30 " "	1	Saphire . . . . .	36
integerrimus . . . . .	1 30	Ultramarin (R.) . . . . .	48
rigidus . . . . .	1 30	12 Sorten nach unserer Wahl .	6
papillosus . . . . .	1 30	24 " " " " " " " " " "	12
Cerissa myrtifolia . . . 18 kr. bis	30	Citrus, diverse Sorten . . . fl. 1 bis	2
Chamaecrops humilis . . . . .	4	chinensis . . . fl. 1. 30 kr. bis	3
sinensis . . . . .	7	Limonia australis . . . . .	1
Cheiranthora linearis fl. 2 bis	3	Clematis florida, fl. pleno . . .	1
Chilodium scutellaroides . . .	2	bicolor ( <i>Sieboldi</i> ) . . . . .	1
Chironia Fischeri . . . 24 kr. bis	1	azurea grandiflora . . . . .	1
simplex . . . . .	36	tabulosa mongolica . . . . .	24
trinervia . . . . .	36	Sieboldi alba . . . . .	36
Chorizema cordata vera, neu . . .	—	grata . . . . .	48
cordata splendens . . . . .	1	Clerodendron foetidum, neu a. Nord-China,	—
angustifolia ( <i>Dillwynia glycyne-</i>	—	große purpurfarb. Blumendolben fl. 3 bis	6
folia) . . . . .	2 30	Clethra arborea . . . . .	24
acuta . . . . . 36 kr. bis	1 12	fol. var. . . . .	1
acuminata . . . . .	1	macrophylla . . . . .	2
Danielsiana ( <i>oppositifolia</i> ) fl. 1 bis	2	mexicana ( <i>quercifolia</i> ) . . .	—
Diksoni . . . . .	2	Clivia nobilis ( <i>Imatophyllum</i> ) fl. 1 bis	4
ericoïdes ( <i>Aotus gracillima</i> ) . .	1	Cobaea scandens . . . . .	24
flava . . . . .	1 30	Coleonema pulchra, vielbl. 30 kr. bis	1
grandiflora . . . . .	1 12	Convulvulus althcoïdes, schöne Zuchtungs- pflanze	24
Henschmanni . . . . .	—	Compaea spinulosa . . . 48 kr. bis	2
Lawranceana . . . 36 kr. bis	2	Correa ampullacea	—
macrophylla . . . 36 " "	1	bicolor	—
ovata . . . . .	—	Grewilli	—
triangularis . . . . fl. 1 bis	2	formosa	—
varia und var. . . . 36 kr. bis	2	Harrixi	—
spectabilis . . . . . 30 " "	1	Lindleyi	—
Cineraria in neuen Prachtorten,	—	longiflora	—
wovon die mit R. bezeichneten	—	Magnet	—
aus unserer Samenzücht.	—	ochroleuca	—
Adela Villiers . . . . .	30	speciosa	—
amanda ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	24	tricolor	—
		ventricosa	—

pr. Stück 36 kr. bis 1 30  
pr. 12 Stück fl. 6 bis 10



	fl. kr.		fl. kr.
Coriaria nepalensis . . . . .	24	Ecremocarpus scaber . . . . .	24
Crotalaria purpurea . . . . .	24	Edgeworthia chrysantha . . . . .	5 —
Crowea latifolia ( <i>Eriostemon</i> ) 48 kr. bis	2 —	Elichrysum proliferum . . . 36 kr. bis	1 —
major . . . . . fl. 1 bis	2 30	prolif. Barnesii . . . . .	1 30
Cryptomeria, f. bei den Coniferen.	2 —	spectabile . . . . . 36 „ #	1 —
Cunonia capensis . . . . .	2 —	grandiflorum . . . . .	48
Cuphea platycendra . . . . .	24	purpureum, flart 36 kr. bis	2 —
Cupressus, f. bei den Coniferen.	1 —	Elaeocarpus cyaneus . . . . .	2 —
Cyclamen persicum . . . 36 kr. bis	1 —	Embothrium speciosissimum ( <i>Telopea</i> )	—
fl. pleno . . . . .	—	Enkianthus quinqueflorus fl. 1. 30 kr. bis	7 —
Cytisus canariensis . . . . .	48	Epacris campanulata . . . 48 kr. bis	1 30
Attleyanus . . . . .	1 30	alba . . . 48 kr. bis	1 30
Bergmanni . . . . .	1 —	maxima . . . . .	2 —
filipes, sehr zierlich 36 kr. bis	1 —	atrosanguinea . . . . .	1 30
fragrans . . . . .	1 30	aurantia . . . . .	1 30
nubigenus . . . fl. 1. 30 kr. bis	3 —	bicolor . . . . .	2 —
speciosus . . . . .	30	Carminaea ( <i>R.</i> ) . . . . .	1 —
racemosus . . . . .	36	miniata . . . fl. 1. 30 kr. bis	5 —
latifolius . . . 30 kr. bis	2 —	grandiflora . . . . .	4 —
Dacrydium, f. bei den Coniferen.	3 —	splendens . . . . .	4 —
Dammara, f. bei den Coniferen.	1 30	Copelandi . . . . . fl. 1 bis	2 —
Daphne Dauphin . . . . . # 1 #	1 —	coccinea . . . . .	1 30
Delahayana . . . . .	2 —	delicata . . . . .	2 30
Fortuneana . . . . .	2 —	densiflora . . . . .	2 30
indica . . . . . fl. 1 bis	5 —	grandiflora . . . 48 kr. bis	2 —
rubra, schönste fl. 1. 30 kr. bis	1 12	rubra . . . . .	3 —
japonica . . . . . 48 „ #	1 —	heteronema ( <i>muconata</i> ) . . .	48
Datura arborea . . . 30 „ #	1 —	hyacinthifol. candidissima . .	3 —
Knighti fl. pl. . . . .	1 —	impressa . . . . . 48 kr. bis	2 —
sanguinea . . . . .	1 —	alba ( <i>R.</i> ) . . . . .	1 30
Daviesia corymbosa . . . fl. 1 bis	1 30	ardens ( <i>R.</i> ) . . . . .	1 30
latifolia floribunda . . . . .	2 —	superba ( <i>R.</i> ) . . . . .	1 30
longifolia . . . . .	1 30	Kinghorni . . . . .	3 30
intermedia . . . . .	1 30	longiflora splendens fl. 1 bis	2 —
cornuta ( <i>prionoïdes</i> ) . . fl. 1 bis	2 —	alba ( <i>R.</i> ) . . . . .	1 30
ulicina . . . . . 48 kr. bis	1 30	incarnata ( <i>R.</i> ) . . . . .	1 30
Dielytra spectabilis ( <i>Dicentra</i> ), neu, wun-	1 —	magnifica . . . . .	—
der schön, im Breiten ausbauend 30 kr. bis	1 —	sanguinea . . . . .	1 30
Dietes bicolor . . . . .	1 30	Tauntontiana . . . . .	1 30
Dillwynia cinerascens . . . . .	1 —	mirabilis ( <i>R.</i> ) . . . . .	1 30
coronata . . . . .	3 —	pulchella . . . . .	1 —
filifolia . . . . .	2 30	microphylla . . . . . fl. 1 bis	2 —
glycinefolia . . . . .	2 —	paludosa . . . . . 48 kr. bis	2 —
Hügelii . . . . . fl. 1 bis	2 —	pungens . . . . . fl. 1 bis	2 —
phylloïdes ( <i>rudis sang.</i> ) # 1 #	2 —	autumnalis . . . . .	—
Henckmani, ( <i>Pultenea Brownii</i> )	3 —	incarnata grandiflora	—
sehr schön . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	2 —	Attleyana	—
speciosa . . . . . fl. 1 bis	2 —	Venus Victrix	—
pendula . . . . . # 1 #	2 —	Hügelii	—
Diolea glycyoïdes ( <i>Kennedy</i> <i>splen-</i>	1 12	diaphana	—
<i>dens</i> ) . . . . . 30 kr. bis	—	resplendens	—
Diosma ambigua . . . . .	30	amabilis	—
brunioides . . . . .	48	ornata	—
capitata . . . . .	48	venusta	—
fragrans ( <i>speciosa</i> ) . . . . .	48	rosea brevifolia	—
Disandra prostrata, für Hängevasen . .	24	elongata	—
Dracena australis ( <i>Cordylus</i> ) . . . . .	2 —	floribunda	—
congesta . . . . .	1 12	rubra grandiflora	—
Dracophyllum floribundum . . . . .	—	12 verschiedene Sorten . . fl. 8 bis	12 —
Dryandra formosa . . . . .	6 —		
falcata . . . . .	3 30		
Drymis Winteri . . . . .	3 —		

	n.	kr.		n.	kr.
Epacris-Sämlinge in allen Far-			Erica metuliflora . . . . .	1	—
ben, schöne Kulturpflanzen			mirabilis . . . . .	2	—
von 1 $\frac{1}{2}$ Fuß Höhe, 1 Fuß			montana . . . . .	1	—
Durchmesser pr. Stück fl. 1			mutabilis . . . . .	1	30
pr. 12 Stück fl. 10			Neillii . . . . .	—	—
pr. 100 Stück fl. 75			nidularis . . . . .	—	36
Epimedium, bei den Staudengewächsen.			nigrita . . . . .	1	—
Erica acuminata . . . . .	1	—	nitens . . . . .	—	—
Aitonia . . . . .	1	30	Patersonia . . . . .	1	—
albans . . . . .	1	—	pellucida . . . . .	1	—
ambigua . . . . . 30 kr. bis	1	—	persoluta . . . . .	—	36
ampullacea vittata . . . . .	1	30	perspicua . . . . .	1	—
arbores . . . . . 24 kr. bis	1	—	politrachifolia . . . . .	—	30
aspera . . . . .	1	30	pubescens . . . . .	—	30
assurgens . . . . .	—	36	minima . . . . .	—	36
australis . . . . . 30 kr. bis	1	—	propendens . . . . .	1	—
blanda . . . . .	—	24	purpurea . . . . .	—	—
Bowea . . . . . 48 kr. bis	1	30	purpurea . . . . .	1	—
cavendishi . . . . .	—	—	pyramidalis . . . . .	1	—
cerinthoides . . . . .	1	—	vernalis . . . . .	—	—
colorans . . . . .	—	—	refulgens . . . . .	1	—
magna . . . . .	1	—	regerminans . . . . .	—	36
cinerea . . . . .	—	24	retorta . . . . .	—	—
albida . . . . .	—	30	Ritschelliana albida . . . . .	—	—
ciliaris . . . . .	—	24	rosea . . . . .	1	—
coccinea . . . . .	—	12	ruber calyx . . . . . fl. 1 bis	2	—
colorans . . . . .	1	—	Savillea . . . . .	—	—
comosa alba . . . . .	1	12	Schanonia . . . . .	1	30
cafra . . . . .	—	30	Sebana . . . . . fl. 1 bis	2	—
eruenta . . . . .	1	12	sparsa . . . . . 36 kr. bis	1	30
cubica minor . . . . .	1	12	speciosa . . . . . fl. 1 "	2	—
major . . . . .	—	—	Sprengelii vera . . . . .	—	—
cupressina . . . . .	—	36	spurea . . . . .	—	48
curviflora . . . . .	—	48	Steffatschecki . . . . .	—	—
rubra (flammea) . . . . .	1	—	taxifolia . . . . .	1	—
Dabecia . . . . .	—	24	tenella . . . . .	—	48
alba . . . . .	—	24	transparens . . . . . 30 kr. bis	1	—
declinata . . . . .	—	48	tricolor . . . . . fl. 1 bis	3	—
densa . . . . .	1	—	tricolor elegans . . . . .	—	—
discolor . . . . .	—	48	dumosa . . . . .	—	—
Endlicherii . . . . .	—	—	multiflora . . . . .	—	—
eximia . . . . .	—	—	superba . . . . .	—	—
exurgens coccinea . . . . .	1	12	tubiflora purpurea . . . . .	—	48
gemmifera . . . . .	—	—	Uhria . . . . . 30 kr. bis	1	30
globosa . . . . .	—	36	pillosa . . . . .	1	—
gracilis . . . . .	—	24	speciosa . . . . .	1	—
Hartuelli . . . . .	—	—	undulata (Westfalinga) . . . . .	—	—
hiemalis . . . . . 30 kr. bis	1	—	ventricosa . . . . .	1	12
hybrida . . . . .	—	36	ventricosa stellifera . . . . .	1	12
imbecilla . . . . .	—	36	purpurea . . . . . fl. 1 bis	2	—
incarnata . . . . .	—	48	vernix longiflora . . . . .	1	30
jubata . . . . .	—	—	coccinea . . . . .	—	—
Lambertia rosea . . . . .	—	—	versicolor nova . . . . .	1	—
linæoides . . . . . 30 kr. bis	1	—	verticillata vera . . . . .	1	—
longiflora . . . . .	1	—	vestita coccinea . . . . . fl. 1 bis	2	—
Mac-Nabeana . . . . .	—	—	fulgens . . . . . 7 1 "	2	—
mamosa coccinea . . . . .	1	—	var. . . . . " 1 "	2	—
purpurea . . . . .	1	—	Willmoriana . . . . . 48 kr. bis	1	30
Massonia . . . . .	—	—	Winkleri . . . . .	—	—
melanthera . . . . . 30 kr. bis	1	12	Eriostemon buxifolium, eine sehr alte		
mediteranea hibernica 24 " "	—	48	schönblühende Pflanze fl. 2 bis	5	—
			cuspidatum . . . . . 2 "	5	—



	fl. kr.		fl. kr.
Eriostemon linifolium . . . . .	5 —	Gardenia florida plena . . . . .	36 kr. bis 1 12
intermedium . . . . . fl. 3 bis	5 —	Fortuneana . . . . .	1 —
neriifolium . . . . . fl. 3 #	5 —	Gardoquia Hookeri . . . . .	48
myoporoides . . . . . fl. 2 #	3 30	Gaultheria leucocarpa . . . . .	2 —
pulchellum . . . . .	5 —	Gastrolobium bilobum . . . . .	48
scabrum, schöne Pflanzen fl. 3 bis	5 —	calycinum . . . . .	3 —
salignum (Crowea) . . . . . fl. 1 bis	2 —	cuneatum . . . . .	2 30
Erythrina crista Galli . . . . .	3 —	Leakeanum . . . . .	3 —
Humaci . . . . .	1 —	retusum . . . . .	48
Escalonia grandiflora . . . . .	1 —	Genethylis tulipiflora . . . . .	—
arbutifolia . . . . .	2 —	Genista alba . . . . .	30
macrantha . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	—	Barclayana . . . . .	48
montevidensis . . . . .	48	canariensis . . . . .	48
organiensis . . . . .	48	fragrans (Cytisus) . . . . .	1 30
Eurybia ilicifolia . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	3 —	sericea . . . . .	36
Eutaxia Baxteri . . . . .	1 —	Gladiolus, bei den Staudengewächsen.	—
myrtifolia . . . . .	24	Glycine Backhousiana (Fistaria) . . . . .	1 30
Evonymus fimbriatus . . . . .	1 12	Gnidia radiata . . . . .	48
Fabiana imbricata . . . . .	24	pinifolia, sehr schön . . . . . fl. 1 bis	2 —
Fagus Cunninghami . . . . .	—	Gompholobium splendens . . . . .	1 30
Forsythia viridissima fr. . . . .	24	barbigerum . . . . .	3 30
Fragaria indica, für Hängevasen . . . . .	18	polymorphum . . . . .	—
Froebelia fasciculiflora . . . . . fl. 1. bis	2 —	virgatum . . . . .	—
Fuchsia, NB. hier von verzeichnet wie nur		Gordonia javanica . . . . .	2 —
die schönsten neueren als:		Grevillea bipinnatifida . . . . . fl. 3 bis	5 —
Abbé Bourgois . . . . .		flexuosa . . . . .	—
Agnes . . . . .		longifolia . . . . .	2 30
Alfred Salter . . . . .		Manglesii . . . . . 30 kr. bis	1 —
Belle étoile . . . . .		robusta . . . . .	2 30
Clapton hero . . . . .		sericea . . . . .	1 30
cerasiformis . . . . .		Thelemaniana . . . . . 24 kr. bis	1 —
Diadem of Flora . . . . .		Habrothamnus elegans . . . . .	30
Expansion . . . . .		speciosus . . . . .	30
Gem (Turville) . . . . .		Hackea petrophyllloides . . . . .	1 30
General Changarnier . . . . .		Victoria, neu, angedeignet fl. 2 bis	5 —
General Oudinot . . . . .		Heliotropium peruv. Vol-	
Hébé . . . . .		taireum . . . . .	
Hendersoni . . . . .		corymbosum . . . . .	
Lady Darmonth . . . . .		Gem . . . . .	
Leon Leguay . . . . .		Gloire de Bordeaux . . . . .	
Louis Lelandais . . . . .		Louis Napoleon . . . . .	
Madame Lemichez . . . . .	24 kr. bis	Pericles . . . . .	
Madame Haquin . . . . .	—	paniculatum . . . . .	24 kr. bis
Madame Lebois . . . . .	36	perfection . . . . .	36
Madame Sonntag . . . . .		reptans . . . . .	
Mazeppa . . . . .		triomphe du Faubourg	
Nonpareille . . . . .		triomphe de Liège . . . . .	
Nil desparandum . . . . .		Souvenir de Liège . . . . .	
ochroleuca . . . . .		Immortalité de M. Louise	
Orion . . . . .		species sub Moletta	
Princeps . . . . .		riesenhaft.	
Queen Turville . . . . .		Hemiandra pungens . . . . .	2 —
Roi des fuchsias . . . . .		Hibiscus Franciscanus . . . . .	1 —
seratifolia alba . . . . .		Weldenii . . . . .	1 —
Snowball . . . . .		Hovea Celsii latifolia . . . . .	1 30
syringiflora . . . . .		ilicifolia . . . . .	3 30
splendidissima . . . . .		linearis . . . . .	1 30
Voltigeur . . . . .		longifolia . . . . .	1 —
viele ältere Sorten . . . . . 18 kr. bis	12	pungens major . . . . .	2 —
ditto . . . . . pr. 12 Stück	3 —	purpurea . . . . . 24 kr. bis	1 12

	n.	kr.		n.	kr.
Hydrangea altissima . . . . .	—	24	Lechnautia oblata . . . . .	—	30
involucrata . . . . .	—	130	biloba, blauflühend . . . . .	—	30
japonica . . . . . 24 kr. bis	—	48	grandiflora . . . . .	—	36
fol. var. . . . .	—	1	multicolor . . . . . 36 kr. bis	—	1
pubescens, neu . . . . . 48 " "	—	130	splendens . . . . . 36 " "	—	1
Hypericum japonicum . . . . .	—	36	Leptospermum persiciflorum, schön . . . . .	—	30
Hypocalymna Cuninghamsi . . . . .	—	—	Leucopogon Cuninghamsi, sehr schön	—	—
Ilex latifolia . . . . . fl. 1 bis	—	3	Winterblume . . . . .	—	130
microcarpa . . . . .	—	330	affinis . . . . .	—	2
cornuta . . . . .	—	7	Drummondii . . . . .	—	—
fureata . . . . .	—	7	floribundum . . . . .	—	—
Perado . . . . . " 1 "	—	2	Ligustrum ovalifolium . . . . .	—	36
Tarajo . . . . . " 1 "	—	3	Lilium, s. Staudengewächse.	—	—
Imatophyllum (f. Clivia) . . . . .	—	30	Liparia hirsuta . . . . . 36 kr. bis	—	130
Indigofera australis . . . . .	—	30	Loasa volubilis, Schlingpflanze . . . . .	—	24
speciosa . . . . . 30 kr. bis	—	1	Lobelia crinoides hybr. . . . .	—	24
decora, neu, vorzüglich 36 " "	—	1	Erinus grandiflora . . . . .	—	24
Doraa, andauernd, sehr schön . . . . .	—	24	Thapsaidea (nicotianaeifolia) . . . . .	—	1
incana . . . . .	—	24	angulata, Ampelpflanze . . . . .	—	24
Isopogon sp. . . . .	—	12	picta, nichtig . . . . .	—	12
Jaehlia fuchsoides . . . . . 36 kr. bis	—	1	andere bei den Staudengewächsen.	—	—
Jacksonia trifurcata . . . . .	—	24	Lomatia ilicifolia . . . . . fl. 1 bis	—	2
Jasminum triumphans . . . . .	—	24	longifolia . . . . .	—	12
affine . . . . .	—	24	Lophospermum striatum . . . . .	—	24
arbusculum . . . . .	—	36	Luculia gratissima . . . . .	—	—
Bidwellianum, sehr fein . . . . .	—	48	Pineana . . . . .	—	3
caudatum, großblättrig . . . . .	—	1	Luxemburgia ciliosa . . . . .	—	5
dianthifolium, neu . . . . .	—	36	Maclaena cordata . . . . .	—	3
grandiflorum . . . . .	—	30	Mahonia, s. Berberis.	—	—
nudiflorum, Winterblume . . . . .	—	36	Magnolia fuscata . . . . . fl. 1 bis	—	2
Poiteau, sehr empfehlenswert . . . . .	—	36	grandiflora . . . . . 30 kr. bis	—	2
simplicifolium . . . . .	—	36	praecox . . . . . fl. 2 bis	—	8
Juniperus, bei den Coniferen.	—	—	duplex . . . . .	—	230
Kadsura japonica, windend 24 kr. bis	—	48	rotundifolia . . . . . fl. 2 bis	—	4
Kennedyia bimaculata . . . . .	—	24	Hartwisi . . . . . " 2 "	—	5
alba . . . . . fl. 1 bis	—	2	Mandevillea suaveolens, Schlingpflanze	—	36
fol. varieg. . . . .	—	12	Maurandia Barclayana, ditto . . . . .	—	24
latifolia . . . . .	—	24	Melaleuca acrotrichoides . . . . .	—	2
Baumanni . . . . . 24 kr. bis	—	48	violacea . . . . .	—	2
longiracemosa . . . . .	—	30	Merandera sobilifera . . . . .	—	130
macrophylla . . . . . 30 kr. bis	—	130	Metrosideros semperflorens fl. 1 bis	—	130
Lindleyana . . . . .	—	130	speciosus, hart . . . . .	—	2
eximia . . . . . 30 kr. bis	—	1	crassifolia . . . . .	—	5
rotundifolia . . . . . 30 " "	—	1	albicans (Angophora) . fl. 1 bis	—	2
splendens (Dioclea) 30 " "	—	12	florida (Angophora) . " 1 "	—	2
andere unter Zichia.	—	—	buxifolia . . . . .	—	1
Lachnaea purpurea . . . . .	—	2	Die drei Letzteren sind vorzügliche Decora-	—	—
Lagerstræmia indica . . . . . 48 kr. bis	—	130	tionspflanzen.	—	—
Lalage ornata . . . . .	—	—	Mimosa prostrata, Schlingpflanze . . . . .	—	36
hoveaeifolia . . . . .	—	4	Mirbelia Baxteri . . . . . 48 kr. bis	—	12
Lantana aurantia . . . . .	—	24	grandiflora . . . . .	—	230
delicatissima . . . . .	—	24	ilicifolia . . . . . fl. 2 bis	—	3
Meleni . . . . .	—	36	reticulata, (triternata) . . . . .	—	48
Youngii . . . . .	—	24	Mitraria coccinea . 30 kr. bis	—	1
crocea . . . . .	—	24	Moniera crotalariaioides . . . . .	—	30
purpurea . . . . .	—	36	Myosotis azorica . . . . .	—	24
multiflora . . . . .	—	36	Myrtus lusitanica et var . . . . .	—	24
excelsa . . . . .	—	36	fl. pleno . . . . .	—	30
Lapageria rosea . . . . .	—	—	costa Ricensis . . . . .	—	130
Lassiopetalum grandiflorum 30 kr. bis	—	1	tenuifolia (Hügel) . . . . .	—	30
pulchellum, sehr schön . . . . . fl. 1 bis	—	2	buxifolia (Metrosideros) . . . . .	—	1



	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Neillia thyrsiflora</i> . . . fl. 1 bis	2	30	<i>Primula undulata</i> , neu . . . . .	—	48
<i>Nerium Oleander</i> , in verschiednen, weißen, dunkelrothen und gefärbten Sorten	2	—	<i>denticulata</i> . . . . .	—	48
<i>luteum</i> fl. pleno . . . . .	2	—	<i>chinensis albo pleno</i> . . . . .	1	30
<i>Oerionmyrtus floribunda</i> . . . . .	1	30	<i>rubro pleno</i> . . . . .	—	30
<i>Olea excelsa (Jlex)</i> . . . . .	1	12	<i>marginata</i> . . . . .	—	30
<i>Oxalis elegans atrorubens</i> . . . . .	—	36	<i>involuta</i> . . . . .	—	30
<i>Ottomis</i> . . . . .	—	36	<i>Pronaya elegans</i> . . . . . fl. 1 bis	2	—
<i>Oxilobium buxifolium</i> . . . . .	1	30	<i>Prostranthera grandiflora</i> 30 kr. bis	1	—
<i>cordifolium</i> . . . . .	—	30	<i>Lassianthus</i> . . . . .	1	—
<i>Pultenaea</i> . . . . .	1	30	<i>violacea</i> . . . . .	—	30
<i>pupureum</i> . . . . .	2	—	<i>Podocarpus</i> , bei den Coniferen.		
<i>Origanum sibiricum</i> . . . . .	—	24	<i>Pultenaea biloba</i> . . . . .	1	30
<i>Paeonia</i> , s. Gehölze.			<i>Paxtoni</i> . . . . .	4	—
<i>Panax arboreum (aust.)</i> . . . . .	2	—	<i>speciosa</i> . . . . .	4	—
<i>Parsonsia heterophylla</i> . . . . .	1	—	<i>acutifolia</i> . . . . .	4	—
<i>Passiflora caerulea</i> . . . . .	—	24	<i>tenuifolia</i> . . . . .	2	—
<i>onichyna</i> . . . . .	—	30	<i>subumbellata</i> . . . . . 24 kr. bis	—	36
<i>Shroepaea</i> . . . . .	—	30	<i>Punica granatum</i> . . . . . fl. 1 #	3	—
<i>Pavia californica</i> . . . . . fl. 3 bis	10	—	<i>albo pleno (vera)</i> . . . . .		
<i>Pelargonium</i> , besonders verzeichnet			fl. pleno . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	30
<i>Penstemon</i> , s. Staudengewächse.			<i>nana</i> , Kronbäumchen . . . . .	5	—
<i>Pernetia phyllicifolia</i> . . . . . 30 kr. bis	1	—	schöne große Orangerie-Bäume von fl. 15 bis	33	—
<i>ciliaris</i> . . . . .	—	—	<i>Quercus lanuginosa</i> . . . . .	2	—
<i>species nova</i> . . . . .	1	—	<i>Rhododendron</i> , nachfolg. besonders verzeichnet.		
<i>Petunia</i> , schöne neue Sorten und Zümlinge			<i>Rhodolea Championi</i> , sehr ge-		
<i>Philadelphus mexicanus</i> . . . . . 12 kr. bis	—	24	räumte Reueit . . . . .	—	—
<i>Phlox Drummondii et var.</i> . . . . . 30 q #	1	—	<i>Rhyncospermum jasminoides</i> , schöne		
<i>Phormium tenax</i> . . . . . 30 kr. bis	2	—	neue Zümlinge . . . . .	1	30
<i>Phrisia peduncularis</i> . . . . .	1	—	<i>Rochea falcata</i> . . . . .	—	48
<i>Phylla ericoides</i> . . . . .	—	24	<i>Roella ciliaris</i> . . . . .	—	36
<i>Phylodadus</i> bei den Coniferen.			<i>Russelia juncea</i> . . . . . 24 kr. bis	2	—
<i>Physianthus undulatifolius</i> . . . . .	—	48	<i>multiflora</i> . . . . .	1	—
<i>Pimelia decussata</i> . . . . . 24 kr. bis	1	—	<i>Salvia Lilleana</i> . . . . .	1	30
<i>Hendersonii</i> . . . . . fl. 1 bis	2	—	<i>Scutellaria ventenata</i> . . . . .	—	48
<i>arenaria</i> . . . . .	1	12	<i>canescens</i> . . . . .	—	48
<i>Gnidia</i> . . . . .	5	—	<i>Skinimia japonica</i> . . . . .	12	—
<i>Lorainiana</i> . . . . .	5	—	<i>Silene orientalis</i> . . . . .	—	24
<i>Neippergii</i> . . . . .	1	30	<i>Solanum Meyeri</i> , Zümlinge . . . . .	1	—
<i>lineoides</i> . . . . .	1	12	<i>Sollya heterophylla</i> , bitte . . . . . 24 kr. bis	—	48
<i>macrocephala</i> . . . . .	2	—	<i>salicifolia</i> . . . . .	—	48
<i>spectabilis</i> . . . . . fl. 1. bis	3	—	<i>Drummondii</i> . . . . .	1	30
<i>Verschaffeltii</i> . . . . .	1	—	<i>Stadtmanii australis</i> . . . . .	3	30
<i>Pinus</i> , bei den Coniferen.			<i>Stylidium fasciculatum</i> . . . . .	—	30
<i>Pittosporum Tobira (chinense)</i> . . . . .			<i>Armeria</i> . . . . .	1	30
<i>fol. var.</i> . . . . . 30 kr. bis	1	30	<i>Styphelia tubiflora</i> . . . . .	3	—
<i>Platibium parviflorum?</i> . . . . . fl. 1 bis	2	—	<i>splendens</i> . . . . .	12	—
<i>Plumbago capensis (caerulea)</i> . . . . .	—	30	<i>Swainsonia purpurea</i> . . . . .	—	30
<i>Larpenae</i> , neu . . . . . 18 kr. bis	—	36	<i>Greyana</i> . . . . .	1	—
<i>Podolobium staurophyllum</i> . . . . . fl. 1 #	2	—	<i>Swamerdamia antenaria</i> . . . . .	—	—
<i>berberifolium</i> . . . . .	—	—	<i>Syphocampylos bicolor</i> . . . . .	—	24
<i>Polygala Dalmaisiana</i> . . . . .	—	30	<i>betulaefolius</i> . . . . .	—	12
<i>borbonicaefolia</i> . . . . .	1	—	<i>nitidus</i> . . . . . 48 kr. bis	1	—
<i>Polygonum rotundifolium</i> , viertheilige			<i>Syrtoria europaea</i> , schöne Ampelpflanze	—	24
Zümlinge . . . . . 24 kr. bis	1	—	<i>Tacsonia Helleri</i> . . . . .	1	—
<i>adpressum</i> . . . . .	—	24	<i>splendens</i> . . . . .	1	30
<i>viviparoides</i> . . . . .	—	24	<i>Tägelia bituminosa</i> . . . . .	1	30
<i>vaccinifolium</i> . . . . .	—	24	<i>Taxodium</i> , bei den Coniferen.		
			<i>Templetonia glauca</i> . . . . .	1	30
			<i>retusa</i> . . . . . 36 kr. bis	3	—

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Thea asamica</i> . . . . .	1 30	<i>Veronica formosa</i> . . . . .	— 30
<i>bohea maxima</i> . . . . .	1 12	<i>speciosa</i> . . . . . 30 kr. bis	1 30
<i>viridis</i> . . . . .	1 —	<i>Andersoni</i> . . . . . 30 kr. bis	1 30
<i>Tetranema japonica</i> . . . . .	1 —	<i>Liabaudi</i> . . . . .	1 30
<i>Thibaudia glabra</i> . . . . . fl. 2 bis	5 —	<i>Vesulia</i> , f. <i>Abelia</i> . . . . .	—
<i>setigera</i> . . . . . fl. 2 "	5 —	<i>Viburnum</i> , bei den Gehölzen.	—
<i>Thunbergia alata</i> und variet. pr. Stck.	— 24	<i>macrocephalum</i> , ächt . . . . .	5 —
<i>Tigridia conchiflora</i> . . . . .	— 24	<i>grandiflorum</i> . . . . .	2 30
<i>minor</i> . . . . .	— 36	<i>nepalense</i> . . . . .	—
<i>pavonia coccinea</i> . . . . .	— 36	<i>plicatum</i> , ächt . . . . .	3 —
<i>fulgens</i> . . . . .	— 36	<i>suspensum</i> , neu . . . . .	1 12
<i>splendens</i> . . . . .	— 36	<i>Vinca arb. et var.</i> . . . . .	— 24
<i>Tremandra verticillata</i> ( <i>Tetralthea</i> )	—	<i>Volkameria japonica</i> . . . . . 30 kr. bis	1 —
30 kr. bis	2 —	fl. rubr. simplex 30 " "	1 —
<i>Tritonia aurea</i> , neu, prächtig	2 —	<i>Westringia longifolia</i> . . . . . 30 " "	1 12
<i>Tropaeolum Lobbianum</i> . . . . .	— 30	<i>Witzenia corymbosa</i> . . . . .	1 —
<i>Hocki</i> . . . . .	— 30	<i>Xanthorhea intermedia</i> . . . . .	5 —
<i>Caroline Schmidt</i> . . . . .	— 30	<i>Xanthosia rotundifolia</i> . . . . . 30 kr. bis	1 —
<i>Lili Schmidt</i> . . . . .	— 30	<i>Yucca Draconis</i> fol. var. . . . .	2 30
<i>Schenkii</i> . . . . .	1 —	<i>californica</i> . . . . .	—
<i>Triomphe de Gand</i> . . . . .	— 30	<i>filamentosa</i> fol. var. . . . .	—
<i>minus fl. pleno</i> . . . . .	— 24	<i>pendula (recurva)</i> fl. 1. 30 kr. bis	5 —
<i>tricolorum</i> . . . . .	1 12	<i>flaccida</i> . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	5 —
<i>Tussilago Sieboldi</i> . . . . . fl. 1 bis	2 —	<i>Ziera laevigata</i> . . . . . 30 kr. bis	1 —
<i>Tweedia cœrulea</i> . . . . .	— 30	<i>macrophylla</i> . . . . .	—
<i>Ulex stricta</i> . . . . .	— 24	<i>Zichya Hügelii</i> . . . . .	1 30
<i>europæus fl. pleno</i> . . . . .	— 24	<i>Molly</i> . . . . .	1 30
<i>Ungnadia speciosa</i> . . . . .	—	<i>pannosa</i> . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	2 —
<i>Vallota purpurea</i> . . . . .	1 —	<i>rotundifolia</i> . . . . . 30 " "	1 30
<i>Veltheimia uvaria</i> . . . . . 24 kr. bis	1 —	<i>tricolor</i> . . . . .	1 30
<i>Verbena</i> , vorangehend besonders verzeichnet.	—	<i>Zauschneria californica</i> , . . . . .	— 24

## Pelargonium,

neue grossblumigte, Fantasie- und Scarlet.

a. Grosblumigte neueste Varietäten: von Mr. Odier.	fl. kr.	b. Grosblumigte Varietäten:	fl. kr.
Originalpflanzen pr. Stück netto	5 —	<i>Ajax (Hoyle)</i> . . . . .	1 —
Vermehrung im Frühjahr, so weit sie reicht . . . . . pr. Stück	2 30	<i>Aspasie</i> . . . . .	1 —
<i>Auguste Mieliez</i> . . . . .	—	<i>Beauty of Clapham</i> . . . . .	— 30
<i>Colonel Foissy</i> . . . . .	—	<i>Beauty of Montpellier</i> . . . . .	1 —
<i>Elise Mieliez</i> . . . . .	—	<i>Brilliant (Topping)</i> . . . . .	1 —
<i>Etoile des jardins</i> . . . . .	—	<i>Cameleon (Demay)</i> . . . . .	1 —
<i>Gen. E. Cavaignac</i> . . . . .	—	<i>Cassandra (Beck)</i> . . . . .	— 30
<i>Gloire de Bellevue</i> . . . . .	—	<i>Centurion (Beck)</i> . . . . .	— 30
<i>Gustave Odier</i> . . . . .	—	<i>Choix d'un amateur</i> . . . . .	— 30
<i>James Odier</i> . . . . .	—	<i>Clarinda</i> . . . . .	— 30
<i>Mad. de Lamoricière</i> . . . . .	—	<i>Comte Duterte</i> . . . . .	1 —
<i>Triomphe de Latour</i> . . . . .	—	<i>Constance (Foster)</i> . . . . .	1 —
		<i>Crusader (Hoyle)</i> . . . . .	— 30
		<i>Desiré Le Mire</i> . . . . .	1 —
		<i>Fénelon (Bataille)</i> . . . . .	1 —





# Einige Warmhauspflanzen.

		fl. kr.		fl. kr.
Achymenes. Die von mir nur die Neuere, als:			Asclepias carnosa (Hoya)	30
A Severin.			pieta (variegata) fl. 3 bis	6
Boothii variegata			Barbacenia Rogieri	48
Carl Wohlfahrt			Bambusa arundinacea	48
Coelestina			Begonia albo-coccinea	1
Cuprea			coccinea	30 kr. bis
Caspar Schintz			manicata hydrocotilifolia	1
François Cardinau			cinnabarina	1
Freund Moschkowitz			maxima	1 30
Freund Schwabe			princeps	1 30
Lilacina			stigmosa	1
Louis Van Houtte			Bletia Tankervilleae (Orch.)	1
Majör Füssli			verecunda	30
Madame Rendatler	pr. Stück	24	Bignonia Carolinac.	1 12
Mr. de Parpart			Chamberlaini	1 12
Mr. de Rougemont			Bonapartia juncea, fast	7
Mackoyi			Bouvardia leiantha, blühet im Winter	
Napoleon Rossi			(im Sommer auspflanzen)	24 kr. bis
pulehella			longiflora	1
Theodor Fröbel			Bromelia humilis	—
Sir T. Thomas			Brownea grandiceps	15
longiflora alba			Brugmansia floribunda (Joanultra)	1
nana			Caladium bicolor	1 30
latifrons			bicolor picturatum	3
Margarethae			hamatosligmon	2
viele ältere Sorten à		12	macrophyllum	1 30
Aechmea fulgens (Tillandsia)		1 30	nymphaeifolium	2
discolor		1 30	seguinum pictum (Diesenb.)	—
miniata discolor		2	versicolor	48
Aerides crispum (Orch.)		20	NB. Mehrere dieser Caladien ertragen die Auspflanzung im Sommer, und sind dann als prächtige Wärmepflanzen von bedeutendem Effect.	
Aeschynanthus, diversif. à 30 kr. bis		1	Campylobotrys discolor	1 30
pulehellus albus		1	Canna, bei den Gewächshauspflanzen.	—
Agalylla staminea		1	Capanea grandiflora	1
Agave filifera		7	Carludowica humilis	—
Allamanda cathartica		1	Cattleya crispa (Orch.)	10
neriifolia		2	Centradenia divaricata	30
parensis		1 12	Chamaedorea concolor (Palme)	8
Schottii		1 12	elator	—
Alopectus Schlummi		5	Schideana	4
speciosus		1	Chamerops humilis (Palme)	4
Alpinia sp. scarlet, (China)		3 30	Palmetto	5
Anthurium Galleottianum		1	sinensis (arborescens)	7
Otonianum		1	Chirita Moonii	48
Aphelandra micans		2	Walkerii	48
Porteana		2	Chysis bractescens (Orch.)	10
Aralia capitata		3	Clerodendron Devonianum	1 30
elegans		2 30	fallax superbum	2
nymphaefolia		7	foetidum	6
palmeta		7	glaucum	48
quinquefolia		7	volubile	30
Ardisia grenulata	30 kr. bis	1	paniculatum	48
Arcea rubra (Palme)		2 30	speciosissimum	1 30
Artocarpus imperialis		5	Chirita Zeylanica	24



	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Cissus discolor</i> , prächtig bauchblättrig . . .	1	30	<i>Franciscea angusta</i> . . .	1	30
<i>vitigenus</i> . . .	—	—	<i>ilopocana</i> . . . 48 kr. bis	1	30
<i>Combretum macrophyllum</i> fl. 2 bis	3	—	<i>hydrangaeformis (macrophylla)</i> . . .	1	30
<i>Conoclinium janthinum</i> . . .	1	12	<i>eximia</i> . . .	1	30
<i>Cordyline australis (Dracaena)</i> . . .	2	—	<i>villosa</i> . . .	1	12
<i>spectabilis</i> . . .	2	30	<i>Gardenia Stanleyana</i> . . .	2	—
<i>rubra</i> . . .	1	30	<i>Geissomeria longiflora</i> , schöne Winterblume	1	12
<i>congesta</i> . . .	1	12	<i>Gesneria Geroltiana</i> . . .	1	—
<i>Costus speciosus</i> . . .	—	30	<i>discolor</i> . . .	1	—
<i>Curculigo recurvata</i> . . .	1	12	<i>Leopoldi</i> . . .	5	—
<i>Cymbidium aloëfolium (Orch.)</i> . . .	1	—	<i>macrantha</i> . . .	—	48
<i>ensifolium</i> . . .	1	—	<i>sp. de Perdrigo</i> . . .	1	30
<i>Cyperus papyrus</i> . . .	2	—	<i>Zebrina splendens</i> . . .	1	—
<i>alternifolius</i> . . .	1	12	<i>Gloxinia Marie Van Houtte</i> . . .	1	—
<i>Cyrtoceras reflexa</i> . . .	1	12	<i>viele andere, schöne Sorten à</i> . . .	—	30
<i>Dasilyrion angustifolium</i> . . .	5	—	<i>Griffinia species</i> . . .	5	—
<i>juncum</i> . . . fl. 3 bis	15	—	<i>Heliconia farinosa</i> . . .	1	—
<i>Dendrobium densiflorum (Orch.)</i> . . .	7	—	<i>discolor</i> . . .	1	30
<i>speciosum</i> . . . fl. 2 bis	3	—	<i>Heterocentron roseum</i> . . .	—	30
<i>Dichondra sericea</i> , für Sängervasen . . .	—	30	<i>Hexacentris mysorensis</i> fl. 5 bis	12	—
<i>Dichorisandra ovalifolia</i> , sehr schön fl. 1 bis	2	—	<i>Hedichium coronarium</i> . . .	—	30
<i>discolor nana</i> . . .	3	30	<i>Hindsia longiflora</i> . . .	1	—
<i>violacea</i> . . .	2	—	<i>violacea</i> . . .	1	30
<i>alba</i> . . .	3	30	<i>Hibiscus ros. sin. luteo pleno</i> . . .	1	—
<i>Diefenbachia costata</i> . . .	5	—	<i>aurantia plena</i> . . .	1	—
<i>Dioscorea bulbifera</i> . . .	—	48	<i>pumiceus</i> . . .	1	—
<i>discolor variegata</i> . . .	2	30	<i>Hoya bella</i> . . . fl. 1 bis	2	30
<i>Dracaena australis (Cordyline)</i> . . .	2	—	<i>imperialis</i> . . .	2	—
<i>arborea (paniculata)</i> . . .	1	30	<i>variegata (Asclepias)</i> fl. 3 bis	6	—
<i>arborea vera</i> . . .	—	—	<i>Inga Harissii</i> . . . fl. 1, 30 bis	3	30
<i>brasiliensis</i> . . .	1	30	<i>Ipomaea gossipifolia</i> . . .	1	—
<i>Draco</i> . . .	1	30	<i>Isolepis pygmaea</i> , für Ampeln	—	24
<i>fragrans</i> . . .	2	—	<i>Jaccaranda grandiflora</i> . . .	—	—
<i>ferrea</i> . . . fl. 1 bis	1	30	<i>Jasminum Maid of Orleans</i> . . .	1	—
<i>versicolor</i> . . . fl. 1 bis	1	30	<i>Justitia carnea superba</i> 30 kr. bis	1	—
<i>congesta (Cordyline)</i> . . . fl. 1 bis	3	—	<i>Kempferia galanga</i> . . .	—	30
<i>nobilis</i> . . .	5	—	<i>Klugia zeylanica</i> . . .	1	30
<i>marginata</i> . . .	1	30	<i>Lapageria rosea</i> . . .	—	—
<i>latifolia</i> . . .	3	—	<i>Latania Borbonica (Palme)</i> . . .	10	—
<i>reflexa</i> . . .	1	30	<i>Levistonia Borbonica (Palme)</i> . . .	—	—
<i>rubra (Cordyline)</i> . . .	1	30	<i>Laurus Canella</i> . . .	1	30
<i>spectabilis (Cordyline)</i> . . .	2	30	<i>cinnamomea</i> . . .	1	30
<i>stricta</i> . . .	1	30	<i>Lycopodium apus</i> . . .	—	18
<i>Duranta Bonardi</i> . . .	—	30	<i>apoda</i> . . .	—	18
<i>Elisii</i> . . .	—	24	<i>caesium</i> . . .	—	24
<i>Echites Melaleuca</i> . . .	1	30	<i>arboreum</i> . . .	—	130
<i>nutans</i> . . .	1	30	<i>cordifolium</i> . . .	—	1
<i>Epidendrum cinnabarinum (Orch.)</i> . . .	5	—	<i>cuspidatum</i> . . .	—	1
<i>Epiphyllum truncatum bicolor</i> . . .	—	30	<i>monstrosum</i> . . .	—	1
<i>elegans</i> . . .	1	—	<i>alatum</i> . . .	—	1
<i>Russelianum</i> . . .	—	30	<i>diffusum</i> . . .	—	1
<i>Salmoneanum</i> . . .	1	—	<i>denticulatum</i> . . .	—	18
<i>Euphorbia splendens</i> . . . 30 kr. bis	1	12	<i>Galeottianum</i> . . .	—	24
<i>pulcherrima</i> . . .	—	—	<i>Schottii</i> . . .	—	30
<i>Erionema aenea</i> . . .	—	36	<i>stellatum</i> . . .	—	24
<i>Ficus barbata</i> . . .	1	30	<i>stoloniferum</i> . . .	—	24
<i>australis</i> . . .	1	—	<i>umbrosum</i> . . .	—	1
<i>Murrayana</i> . . .	2	—	<i>viticulosum</i> . . .	—	1
<i>elastica, Gummibaum</i> . . . fl. 1 bis	3	30	<i>Wildenowii</i> . . .	—	1
<i>pergaminea</i> . . .	2	—	<i>Magnolia pumila</i> . . .	—	130
<i>spuria</i> . . .	2	—	<i>Maettia miniata</i> . . .	—	1
<i>sub panduraceformis</i> . . .	1	30			

	fl. kr.		fl. kr.
Marantha arundinacea . . . . .	48	Pithecarnea coccinea . . . . .	1 —
bicolor . . . . .	48	punicea . . . . .	1 —
albo-lineata . . . . .	—	Plectogyne variegata . . . . .	— 30
roseo-lineata . . . . .	—	Plectranthes concolor pictus fl. 1 bis	2 —
sanguinea . . . . . fl. 1 bis	2 —	Pothos scolopendrifolius . . . . .	2 30
Selowi . . . . .	1 30	Puya Altensteinii . . . . .	1 12
truncata . . . . .	2 30	Rondeletia speciosa . . . . .	1 12
vittata . . . . .	6 —	Rogiera cordata (Rondeletia)	1 30
Maximiliana regia (Palme)	4 —	Roetzli alba . . . . .	1 30
Medinella magnifica . . . . .	5 —	Rhopala corcovadensis . . . . .	15 —
Musa Cavendishiana . . . . .	2 —	organensis nova . . . . .	25 —
Zebrina . . . . .	15 —	Russelia juncea . . . . . 30 kr. bis	1 —
Mussandra frondosa . . . . .	1 30	multiflora . . . . . 30 # #	1 —
macrophylla . . . . .	2 —	verticillata . . . . .	1 —
Myrtus pimenta . . . . .	1 30	Saurauja macrophylla . . . . .	1 12
Napoleonca Whitefieldi . . . . .	5 —	Sabal umbraculifera (Palme)	—
Nepenthes destillatoria . . . . .	—	Sacharum officinarum . . . . .	— 48
Nemathanthus longipes . . . . .	— 48	Schweigeria microphylla . . . . .	1 —
splendens . . . . .	1 —	pauciflora . . . . .	— 30
Oncidium pulvinatum (Orch.) fl. 3 bis	6 —	Stephanotis floribunda . . . . .	1 30
Oreodoxia regia . . . . .	2 —	Thouarsii . . . . .	1 30
Pandanus amaryllidifolius . . . . .	5 —	Stanhoepa insignis (Orch.) fl. 2 bis	5 —
graminifolius . . . . .	1 —	oculata . . . . . 2 #	5 —
javanicus variegatus . . . . .	15 —	tigrina . . . . .	7 —
Passiflora Beloti . . . . .	1 —	Stiftia chrysantha . . . . .	1 —
Comte Kisseleff . . . . . 30 kr. bis	1 —	Sobralia macrantha (Orch.) fl. 4 bis	8 —
Loudoni . . . . . 30 # #	1 —	Tacsonia Helli . . . . .	1 —
Lewei . . . . . fl. 1 #	2 —	splendens . . . . .	1 30
Medusae . . . . . 30 kr. #	1 —	sanguinea . . . . .	2 —
Myriadenia . . . . .	1 —	Theophrasta latifolia . . . . .	2 30
quadrangulata . . . . .	1 —	Thunbergia coccinea . . . . .	— 30
Philodendron crinipes . . . . .	3 —	alata sub variet. . . . .	— 24
giganteum . . . . .	—	Tillandsia acaulis virid. . . . . fl. 1. bis	2 —
perdusum . . . . . fl. 3 bis	5 —	bruncea . . . . . # 1. #	2 —
pinnatifidum . . . . .	7 —	species . . . . .	1 30
quericifolium . . . . .	2 30	Torenia asiatica . . . . .	— 30
repens . . . . .	1 30	Tradescantia Deckeriana . . . . .	1 12
Phoenix dactylifera, Dattelpalme . . . . .	5 —	picta . . . . .	1 —
Leonensis . . . . .	10 —	variegata . . . . .	1 30
farinifera . . . . .	20 —	Zebrina . . . . .	— 24
Phrynium setosum . . . . .	2 —	Xanthochymus ovalifolius . . . . .	3 —
Pincenectia glauca . . . . .	12 —	Yucca Draconis fol. var. . . . .	—
Pilea muscosa . . . . .	— 24	aloefolia . . . . .	1 12
Pithecarnea sp. . . . .	1 12	Zamia horrida femina . . . . .	7 —
fulgens aurantia . . . . .	1 30	Zingiber officinale . . . . .	1 —
		Zygopetalum Mackai (Orch.) fl. 2 bis	5 —

## Einige Wasserpflanzen.

	fl. kr.		fl. kr.
Aponogeton distachyon . . . . .	1 —	Nymphaea rubra . . . . .	— —
Cyperus papyrus . . . . .	2 —	poecilla . . . . .	— —
Euryale ferox . . . . .	12 —	thermalis . . . . .	1 30
Nymphaea caerulea . . . . .	1 30	Pistia stratiotes . . . . .	1 —
dentata . . . . .	1 30	Saururus cernuus . . . . .	1 —
Lotus . . . . .	2 30	Valisneria spiralis . . . . .	1 —
Ortgiesiana rubra . . . . .	12 —	Victoria regia . . . . .	— —



## Ein kleines Sortiment Farrenkräuter

wird ebenfalls cultivirt.

### Azalea indica. \*)

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blummengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge kräftige Pflanzen . . . . . pr. Stück 30 kr. bis 48 kr.

mittlere, meistens 1 bis 2 Fuß hohe blühbare „ „ 48 „ „ fl. 2.

starke Pflanzen von 2 bis 4 Fuß Höhe . . „ „ fl. 1. 12 „ fl. 5.

Die mit \* bezeichneten, meistens neueste Sorten, können nur in jungen Vermehrungen geliefert werden.

Hierbei dürfte bemerkt werden, dafs, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Gröfse abgehlich sein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu sein, allen billigen Ansprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältnismäfsig billigere Preise gestellt.

Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blüthknospen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. *S.* bezeichnet die Sämlinge von Herrn Scheuermann, *R.* diejenigen aus unserer eigenen Samenzucht.

Alba (*ledifolia*) die bekannte weißblühende, cassata, zuweilen gestreift, Art der Gled-stanesii, oft gefüllt.

distincta (*R.*) fl. 1. 30 kr.

liliiflora, großblühende weiße.

limbriata, oft gefranzt.

Fielders white, größtblühende, von vollkommener runder Form.

insignis, schönste rein weiße, vollkommenste Form.

\* magna fl. 1. 30 kr.

multiflora (*Dresden*), mit violett gestreift, schön.

perfecta.

pulchella, kleine, niedrigbleibende, vollblühende, *S.*

semiplena (*R.*) fl. 2.

striata, zuweilen gestreift, schöne Form.

Adelaide, tief roth carmin, stark punkirt, verbesserte speciosa.

Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, schön violett-roth, vielblühend.

Alexandra (*Adam*), dunkelfrosacarmin fl. 1. 30 kr.

Amaranthina, beste glänzend dunkelpurpurfarbene, wie phoenicea splendens fl. 1. 30 kr.

\* Amoena (*Standish*), aus Nord-China, sehr eigenthümlich mit roth-purpurfarbenen doppelten Blumenkronen; reichblühend. fl. 3. 30 bis fl. 10.

\* Amoma (*Adam*), zart lila, große gute Form fl. 1. 30 kr.

Apeiromegatha (*Adam*), scharlach-hellroth, groß fl. 2. bis fl. 3.

\*) Die überaus prachtvolle Ausstellung am 1. April 1852 glänzte hauptsächlich durch ihren überhervorragenden Reichthum an dieser Blummengattung, bei welcher Gelegenheit unsere Sammlung für die sechs schönsten Neuheiten mit der grossen Medaille gekrönt wurde. Seitdem sind wieder manche vortreffliche Erzeugnisse hinzugefügt worden.

Ascendens (*Knight et P.*), feurig scharlach fl. 1 bis 5.  
 \* Atrosanguinea (*R.*) fl. 2. 30 kr.  
 Astica (*Adam*) carmin groß fl. 1 bis 3.  
 Audiberti, hellcarmin, vortreflich.  
 Augustissima, hochscharlach, groß, extra fl. 1. 30 kr.  
 Aurantia congesta, leuchtend orange-scharlach, spätestblühende, vorzüglich.  
 Aurantia splendens, sehr groß, eine der besten orangefarbigsten, *S.*  
 Barbata, blaß lilä, fast die größtblühende, willig.  
 Baron v. Pronay, sehr groß, dunkelviolet und braunroth, vorzüglich, *R.*  
 Beauty of Ryegate fl. 2. 30 kr.  
 Bellerophon, groß, leuchtend carmin, sehr schön, *R.*  
 alba, weiß, *R.*  
 coccinea, hochroth, *R.*  
 incarnata, blaßrosa, *R.* sehr willig.  
 phoenicea, *R.* halbgefüllt sehr willig.  
 Benno, sehr groß, matt orange, stark gezeichnet, *R.*  
 Bianca (*Standisch*), weiß fl. 1. 30 bis 3.  
 Borbonia, orange, groß rund, vielblühend, von niederem Wuchse.  
 Borbonia cerise, derselben ähnlich, heller.  
 Brilliant (*Scheuermann 1851*), gefüllt tief scharlach, untreifig die vorzüglichste neben illustris und anderen fl. 2 bis fl. 7.  
 Cardinalis nova, glänzend scharroth.  
 Carminca praecox, frühblühend, zum Früh-treiben, *R.*  
 Calypso, fein carmin.  
 Cerisa pallida, scharroth mit carmin Zeichnung  
 Chelsoni (*Knight et P.*), hochscharlach fl. 1 bis 5.  
 China lancifolia, blaßlila, sehr kleine Blume reichblühend, zum Früh-treiben unvergleichlich fl. 1. 30 kr.  
 Cleopatra (*Adam*), kupferfarben mit violett.  
 Clotilde, dunkelrosa, halbgefüllt.  
 Coccinea (*Smith*), äußerst willig und frühblühend.  
 grandiflora, ziegelroth, groß.  
 Coccinea superba, hochroth, sehr schön.  
 Colorans, violettcarmin, dunkle Zeichnung  
 Concordia, glänzend tiefcarmin, vollkommene Form  
 Coronata, glänzend tief carmin.  
 Coquette de Flandres, fein carmin, halbgefüllt fl. 1. 30 kr.  
 Correcta (*R. 1851*), eine große, verbesserte, dunklere prästantissima mit sehr reicher Zeichnung fl. 2 bis 5.  
 Coruscans, lebhaft orange, groß, vorzugl., *S.*  
 Cuprea elegans (*Dresden*), dunkelkupferroth.  
 Cuprea splendens, einerlei mit aurantia spl.  
 Cuprea violacea, kupferroth mit violett, *S.*

\* Cyrilla (*R.*) fl. 1. 30 kr.  
 Dawsoni (*Knight et P.*), glänzend scharlach fl. 1. bis 5.  
 Decora (*Knight*), hellcarmin, groß, rund.  
 Diana, tief scharroth, in der Art der Comosa.  
 Distincta, tiefcarmin.  
 Delecta, blaß scharroth.  
 \* Delicata (*M.*) fl. 1. 30 kr.  
 Diamantina (*R.*) fl. 1. 30 kr.  
 Due de Brabant, groß, ziegelroth, vortreflich rund fl. 1. 30 kr.  
 Duke of Wellington, groß, ziegelroth, vortreflich rund fl. 1. 30 kr.  
 \* Dulcis major (*M.*) fl. 2.  
 Elata fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, fast wie Granatblüthen.  
 Elegantissima (*M.*) fl. 3. 30 kr.  
 Elisa Mieliez fl. 1. 30 kr.  
 Elisabetha (*Adam*), fl. 2.  
 Elegans venusta, mattscharlach, schön.  
 Eliza, blaß ziegelroth, schön.  
 Emma (*Adam*), früh hell-scharlach fl. 1. 30 kr.  
 \* Emperor fl. 1. 30 kr.  
 Erzherzog Johann (*Sch.*), sehr lebhaft kurserf. mit Stahlglanz, groß fl. 2.  
 Excellens (*excelsa*), groß, zimber-scharlach.  
 Eximia, glänzend hochscharlach, oft halbgefüllt.  
 Eximia pallida, ähnlich der prästantissima.  
 Exquisita (*Knight*), blaß-fleischfarb, dunkle Zeichnung, vollblühend, vorzüglich.  
 Extranei (*Knight et P.*), fein carminrosa fl. 2 bis 5.  
 Fantasie (*R.*) fl. 1. 30 kr.  
 Flammea, *R.* nea, übertrifft die resurgens. fl. 2.  
 Flora (*S.*) leuchtend hochroth wie illustris fl. 1. 30 kr. bis fl. 3.  
 Formosa aurantia, dunkelscharlach; meistens halbgefüllt.  
 Fortunata (*R. 1851*), dunkellila, große vorzügliche Zeichnung fl. 2.  
 Friderich August (*Dresden*), wie prästantissima. — fl. 1. 30 kr.  
 Fulgens, hochscharlach.  
 Fulgens superba, hochscharlach.  
 \* General Peuker (*S.*) fl. 3.  
 Gledstancesii, weiß, erst schon gekreist, gr. rund excelsa, lebhaft dunkelrosa.  
 \* Glory of Sunning Hill, gefüllte Rosen-ähnliche Blumen, fl. 2. 30 kr.  
 Gracilis, zimber-scharlach mit carmin.  
 Graciosa (*Mardner*), purpur, größer als phoenicea.  
 Gloria Gandavensis, tief carmin.  
 \* Gräfin Thun (*S.*) fl. 3.  
 Grandiflora rosea, scharlach-carmin, groß.  
 Grata (*R. 1851*), zart hell-scharlach, von bester Form und unvergleichl. leb. Zeichnung fl. 2. 30 kr.  
 Illustris (*Mardner*), neu, leuchtend hochroth, dunkle Zeichnung, beste Form, reichblühend, fl. 1. 30 bis fl. 5.  
 Innocenza (*R.*), fein weiß fl. 2. 30 kr.



- \* Jveryana, rein weiß, vorzüglich.  
fl. 1. 30 kr. bis fl. 3. 30 kr.
- King, lebhaft orange.
- Königin Marie (*Dresden*) leb. kupferscharl.,  
dunkel gezeichnet fl. 1. 30 kr.
- \* Lactea floribunda (*Dresden*), weiß mit vio-  
letten Streifen. fl. 1. 30 kr.
- Lactitia (*R.* 1851), roth mit blau-vio-  
letter Zeichnung und Glanz, sehr  
freundlich fl. 1. 30 kr.
- Lateritia, ziegelroth, groß, rund, spätblühend.  
alba, einerlei mit Gledstonesii.  
angusta aurantia, blaß zimmeber.  
grandiflora, leuchtend orange-scharlach.
- Lateritia elegans, dunkelscharlach.
- Lehmanni, lilapurpur.
- Lehmanni (*Dresden*), lebhaft lila, groß,  
schön gerundet fl. 1. 30 kr.
- Leodora (*R.*) fl. 2. 30 kr.
- Lepida, lebhaft carmin.
- Longifolia, lebhaft ziegelroth, violett gezeichnet.
- Leda, dunkelcarmin, sehr reich fl. 1. 30 kr.
- Lilacina striata, fl. 1. 30 kr.
- \* Louis Napoleon fl. 1. 30 kr.
- Macrantha rubra, sehr groß, purpurviolett, rund.
- Magnifica, gebrochen carmin.
- Magniflora, orange-scharlach, sehr schön.
- Marie Louise, hoch-carmin, eine der größt-  
blühenden.
- Mileendi, glänzend dunkelroth, groß, rund.
- Minerva, orange-scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr.
- \* Miniata (*M.*) fl. 3.
- Miranda (*R.*) fl. 2. 30 kr.
- Modesta (*R.* 1851.) orange scharlach, sehr  
edel fl. 2.
- Multiflora, klein, hellroth, äußerst reichblühend,  
von ganz niederem Wuchse.
- Murrayana, sehr groß, vollkommenste Form,  
salmroth. fl. 1. 30 kr.
- Nanquin, blaß nanquin-orange. fl. 1. 30 kr.
- Nivea (*Mardner*), weiß, groß.
- Nivea fl. pleno (*Mardner*), weiß, gut ge-  
füllt, sehr empfehlenswerth, neu.  
fl. 1. bis fl. 3.
- Neumannii, gr. tief carmin, vortreffl. fl. 1. 30 kr.
- \* Obscura (*M.*) fl. 4.
- Ovata (*China*) sehr klein, scharlach fl. 1. 30 kr.
- Optima, orange-scharlach, prächtig.
- Orange Pink, blaß ziegelroth.
- Ornata (*Dresden*), lebhaft blaßzimmeber.
- Ornatissima, glänzend hellcarmin.
- Oscar, (*R.* 1851). blaß ziegelroth, große  
starke Zeichnung fl. 2. bis fl. 3.
- \* Pelargoniac flora fl. 1. 30 kr.
- Perfecta elegans fl. 2.
- Perryana, groß, feurig orange-scharlach, runde  
beste Form. fl. 1. 30 kr. bis fl. 5.
- Phœnicea, groß, purpurroth.  
alba (*Low*), sehr groß, rein weiß.  
alba (*R.*) groß, rein weiß.
- \* Phœnicea elegans (*R.*) fl. 1. 30 kr.  
splendens, lebhaft dunkelpurpur, wie  
Amaranthina. fl. 1. 30 kr.

- Phœnix, groß, hell-scharlach.
- Pluto (*Dresden*), dunkelbraunroth mit violett.
- Praeclara, hell scharlachcarmin.
- Præstans, lebhaft dunkelpurpur mit carmin,  
nieder reichblühend, vorzüglich
- Præstantissima (*Knight*), dunkelziegelroth,  
prächtig gezeichnet. fl. 1. 30 bis fl. 4.
- Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich.
- Prinz Camill v. Rohan (*Dresden*), gr., hell-  
kupfercarmin.
- \* Prinz von Nassau (*M.*) fl. 4.
- Princeps (*Dresden*), zimmeber-carmin, sehr fein
- Pulchella nova, fein hell-scharlach-carmin.
- Punctata (*Smith*) fl. 1. 12 kr.
- Purpurea grandiflora (*large purple*), pur-  
pur, sehr groß.
- \* Purpurea perfecta (*Smith*), fl. 1. 12 kr.
- Queen perfection, carmin, schön gezeichnet,  
gut gefürmt. fl. 1. 30 kr.
- Queen of Portugal, groß, rund, leb. rosa carm.
- Reddingii, dunkelscharlach, sehr gr. fl. 1. 30 kr.
- Refulgens, glänz. scharl., verz. fl. 1. 30 kr.
- Regina, hellzimmeber, großblumig.
- Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, zuwei-  
len halb gefüllt.
- Resplendens, feurig tiefcarmin. fl. 1. 30 kr.
- \* Rinziana (*Sch.*), leb. scharl. fl. 1. 30 kr.
- \* Rinzii (*Adam*), ziegelr., ein Hybrid von  
Land-Azaleen, soll im Freien aus-  
dauern fl. 2. 30 kr.
- Robusta, gr., dunkelscharl., verz. fl. 1. 30 kr.
- Rosalia, lebhaft dunkelroth, sehr groß, gut  
gebaut. fl. 1. 30 kr.
- Rosaeflora alba (*R.*) weiß gefüllt fl. 5.
- purpurea (*R.*) gefüllt fl. 5.
- Rosamunde, hellroth, sehr groß. S.
- Rosea aurantia, feurig ziegelroth.
- amabilis, lebhaft glänzend rosa, sehr  
schön. fl. 1. 30 kr.
- elegans (*Ivery*), glänzend tief rosa, groß  
rund fl. 1. 30 kr.
- maculata, rosa.
- punctata, blaß rosa, scharlach.
- triumphans, lebhaft salmroth.
- purpurea, tief carmin, etwas heller als  
decora.
- superba, tief salmroth, groß.
- Rubra superba, in der Art der lateritia.
- aurantia, fein zimmeber, vorzüglich.
- Salopensis, größer als Pr. Albert fl. 1. 30 kr.
- \* Sanguinea fl. 1. 30 kr.
- Scheuermannii, leuchtend orange, vorzüglich. S.
- Seideliana (*Dresden*), glänzend scharlach, vor-  
züglich fl. 1. 30 kr.
- Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.
- alba fl. 2.
- coccinea, orange-scharlach, hält im Freien  
aus fl. 2.
- crocea, rethgelb, neu. fl. 2. 30 kr.
- Smithi grandiflora, groß, lila, frühblühend.
- Sophia v. Schönborn (*Mardner*), fl. 1. 30 kr.
- Speciosa, groß, dunkelroth, mit carmin.
- Splendida (*Knight*), lichtcarmin.

- Squammata (*China*), bläulila., frühblühend  
Standishi zart salmroth, vorzüglich.  
Striata calamistrata, fast wie prästantissima.  
Striata formosissima, weiß mit violetten  
Streifen. fl. 1. 30 kr.  
Suavissima, hell-lila, wie durchsichtig.  
Sultana, dunkelkupferfarb.  
Surpasse phœnicea, purpurreth, sehr willig  
und frühblühend.  
Sylph, carminroth, sehr groß, früh und reich  
blühend. *R.*  
\* Symetry (*Ringhorn*) scharlach salm-  
roth, als prächtig empfohlen  
fl. 3. bis 6.  
Thelemanni fl. 1. 30 kr.  
Theresiae, (*Adam*), prächtig, scharlach,  
feuriger als optima  
fl. 2. bis fl. 3. 30 kr.  
Tinctoria, in der Art der speciosa.  
\* Toilette de Flore fl. 1. 30 kr.  
Transparens fl. 1.  
Triumphans (*Schm.*), lebh. dunkelroth, starke  
Zeichnung fl. 1. 30 kr.  
francofurtensis, reich orange. *S.* fl. 1. 30.  
gandavensis, lebhaft carmin.  
Trotteriana fl. 2.  
Umbellata (*R.*) fl. 2.  
Valeriana (*R.* 1851.), lebh. ziegelroth, schön  
halbgesfüllt fl. 2. 30 kr. bis fl. 4.  
Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft  
gebändert.  
Venusta (*Sm.*), fl. 1. 30. kr.  
Verschaffelti, groß, bläsziegelroth.  
Versicolor, kupferroth mit weißlichen Flecken,  
groß, neu. *R.* fl. 1. 30 kr.  
Vesta (*S.*) feurig orange-scharlach, groß,  
rund fl. 3.  
\* Vesta (*Lucombe*) fl. 3. 30 kr.  
\* Vesta (*M.*) fl. 5.  
Vestita, hochroth, schön.  
Victor Jacqueminot, licht scharlach.  
\* Violacea elegans (*M.*) fl. 4.  
\* Vittata (*China*) soll prächtig geüffnet  
blühen, ganz neu fl. 5.  
\* Vittata Fortuneana fl. 3. 30 kr.  
\* punctata fl. 3. 30 kr.  
\* rosea fl. 3. 30. kr.  
Vulcan, bräunl. dunkel. mit violett, vorzügl., *S.*  
Vivicans, tief carmin, in der Art der Calipso  
und decora.  
\* Wooleri (*Sm.*), dunkelcarmoisin fl. 1. 30 kr.

## Rhododendron für das Gewächshaus. \*)

Wenn gegen diese ungemein pomphaste Pflanzengattung deren gewöhnlich spar-  
sames Ansetzen von Blüthenknospen, so wie das nicht unbedeutende Raumverforderniss  
eingewendet wird, so wollen wir diese Uebelstände für beschränkte Räume keineswegs  
in Abrede stellen; allein Niemand wird auch den unbeschreiblichen Eindruck eines Ge-  
wächshauses mit reichblühenden Rhododendron in allen Farbentönen und Zeichnungen  
von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb  
bestreiten wollen, sobald nur der reichlichere Knospenansatz durch aufmerksame Kul-  
tur gelang. Ausserdem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen *R. Cam-*  
*panulatum*-Hybriden sogar bis zu 20° Kälte, wodurch die Ueberwinterung vermittelt  
einfacher Bedachungen ermöglicht wird.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| junge gepropfte Pflanzen              | fl. 2 bis fl. 3. |
| vorjährige 1—2 Fuss hohe und stärkere | " 2 " " 4.       |
| aussergewöhnlich starke Exemplare     | " 4 " " 10.      |

### a) Reine Grundformen (*Species*).

	fl.	kr.
Arboreum, gr., glockenförmig, dunkelscharlach	.	.
roseum, dito rosa	.	.
Aromaticum	.	.
Cinnamomum, gr., glockenförmig, fast weiß	.	.
Gibsoni, gr., rachenförmig, weiß	.	.

\*) Unsere Rhododendron haben bei den meisten Ausstellungen Preise gewonnen.



	n.	kr
Javanicum, ganz neu, sehr groß, orangegelb und carmin . . . . .	fl. 5 bis	15 —
Rubicaule, gr., glockenf., lebhaft lichtrosa, sehr schön . . . . .		
Strictum, groß, glockenf., weiß . . . . .		
Rubicaule hybridum, viel versprechende, sehr empfehlenswerthe, fräftige Sämlinge von circa 1/2 Fuß Höhe . . . . .	pr. Stück fl. 20	
Strictum hybridum, . . . . .	pr. 12 Stück fl. 20	
	pr. Stück fl. 2	
	pr. 12 Stück fl. 20	
Zeylanicum, im Buchse dem R. cinnamomum gleichend . . . . .		
Aeruginosum (neue Himalaya-Rhod.) . . . . .	fl. 3 bis	7 —
Alpine Scrubby ditto . . . . .		3 30
Alpine red. ditto . . . . .		3 30
Calycatum ditto . . . . .	fl. 3 bis	7 —
Campylocarpum ditto . . . . .	fl. 3	7 —
Ciliatum ditto . . . . .	fl. 2. 30 kr. bis	15 —
Cinnabarinum verum ditto . . . . .		5 —
Dalbousianum ditto . . . . .	fl. 5 bis	15 —
Edgeworthii ditto . . . . .	fl. 3	7 —
Falconeri ditto . . . . .	fl. 5	7 —
Fol. cordatis ditto . . . . .	fl. 3 bis	7 —
Fulgens ditto . . . . .	fl. 3	5 —
Glaucum ditto . . . . .	fl. 3	7 —
lanceifolium ditto . . . . .		5 —
Niveum ditto . . . . .	fl. 3 bis	7 —
Sp. 14000 feet ditto . . . . .	fl. 3	7 —
Sp. Wooly calyx ditto . . . . .	fl. 3	7 —
Wallichii ditto . . . . .	fl. 3	5 —

### b) Hybriden von R. arboreum.

Bodacreamum, blaß scharlach . . . . .		
Delicatum (Smith), weiß mit scharlach . . . . .		
Gloria Gandavensis, weiß . . . . .		
Graf Alfred v. Neipperg, dunkelblutroth, schwarz punktiert . . . . .		
Guido Görres, fein zimmeberscharlach, groß, prächtig . . . . .		
Halleri, hochscharlach, schön . . . . .		
Kosziusko, dunkelrosa, stark schwarz punktiert, vorzüglich . . . . .		
Kronebergianum, fast weiß, stark punktiert, groß . . . . .		
Othello, schwarzbraunroth, ganz neue Farbe, prachtvoll, vorjährige Vermehrung ditto junge Vermehrung, im nächsten Mai . . . . .		10 — 5 —
Radezki, dunkelscharlach, Glockenform . . . . .		
Rüppelianum, lebhaft dunkelcarmoisin, schwarz punktiert . . . . .		
Schuberti, dunkelbraunscharlach, innen hell . . . . .		
Tigrinum, roth, stark punktiert . . . . .		
Tricolor, lilacarmin, schwarz und carmoisin gezeichnet . . . . .		
Victoria, schwärzlich violett, schön schattiert . . . . .		
Saemlinge in verschiedenen Grössen von . . . . .	fl. 1 bis	4 —
ditto ditto . . . . .	pr. 12 Stück fl. 6	12 —
ditto ditto . . . . .	pr. 100 Stück fl. 50	100 —

### c) Hybriden von R. campanulatum.

Diese aus unserer Saamenzucht stammenden Hybriden wachsen baum-  
artig, wie R. arboreum, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße,  
fleischfarbene oder rosenrothe Blumen mit starker Zeichnung, und haben mit  
R. catawbiense bereits 20° Kälte ohne Bedeckung ausgehalten. Unsere  
Äler gegen Ende April, kurz nach 6° Kälte, war bewunderungswürdig, und,  
weil im freien Lande, überraschend neu! —

Albertine Stern, centifolien-rosa, großglockigt, ausgezeichnet . . . . .		
Carneum, fleischfarb-rosa . . . . .		
Exquisitum, fein hellrosa, punktiert, groß . . . . .		

	fl.	kr.
formosum		
Herbertii, zart tiefrosa, fein punktiert, beste Glockenform, schwerlich ausdauernd	fl. 3 bis	4
Johann Stern, weiß, mit leichtem lila Hauche, wundervoll schwarz punktiert, ein Muster in Form und Zeichnung	fl. 4 bis	18
Maculatum, weiß, schwarz punktiert, ausgezeichnet schön	" 4 "	8
Roseum, schön lichtrosa	fl. 3 bis	5
Stollbergianum		3
Turneri, ähnlich dem Herbertii, schwerlich ausdauernd		
Saemlinge, die noch nicht geblühet haben	pr. Stück "	2
ditto ditto	pr. 12 Stück "	18
ditto, große Exemplare von 5 bis 8 Fuß Höhe	pr. Stück "	12

#### d) Hybriden von *R. ponticum*, *Catawbiense* und *maximum*.

Darunter die *R. caucasicum* als f. g. Zwergformen, vollkommen ausdauernd, zu Anfang Mai blühend, die *R. catawbiense* und *ponticum*, bis Ende Mai blühend, und *R. maximum* (*Sternianum*, *Smithi album*) bis Ende Juni blühend.

<i>Caucasicum magnificum</i> , sehr groß, milchweiß, prachtvoll	fl. 4 bis	10
<i>Caucasicum hybridum</i> , niedrig, reichblühend, Sämlinge in meistens weißer oder heller Farbe	fl. 1. bis	3
ditto einjährige Sämlinge,	pr. 12 Stück	1
<i>Fastuosum fl. pleno</i> , dunkel-lila, gefüllt, groß	fl. 1. 30 kr. bis	6
<i>Hyacinthiflorum</i> , hell-lila, gefüllt	" 1. 30 "	4
<i>Lowii</i> , weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön	" 1. 30 "	3
<i>Multimaculatum</i> , weiß, braun gezeichnet	" 1. 30 "	4
<i>Pardoloton</i> , groß, dunkelviolet		2
<i>Smithi album</i>		2
<i>Vervaeianum fl. pleno</i> , lila, schön gefüllt	fl. 1. 30 kr. bis	5

Andere bei den Ziersträuchern.

#### e) Hybriden durch Azaleen.

<i>Norbitonense</i> , sehr groß, als Knospe röthlich, beim Ausblühen rosa-gelb, dann prächtig orange-gelb, wurzelächte Exemplare		
<i>Bernemense</i> , rosa und gelbroth		
<i>Aureum</i> , rein schwefelgelb		
<i>Aureum superbum (Smith)</i>		
<i>Burlingtoni</i>		
<i>Broughtonianum</i>		
<i>Flavum</i>	fl. 3 bis	6
<i>Lindleyanum</i>		
<i>Carneum elegantissimum</i>		
<i>Decorum</i> , strohgelb		
<i>Chrysolectum</i> , strohgelb, groß		
<i>Ochrolencum</i> , schwefelgelb		
<i>Spectabile grandiflorum</i> , orange-gelb, sehr groß		
<i>Torlonianum</i>		



## Camellien. \*)

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzüge, ob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder wenigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen; denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen.

Im Allgemeinen kommen:

- a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.
- b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe fl. 1 bis fl. 2.
- c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe fl. 1. 30 kr. bis fl. 4.
- d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe fl. 3 bis fl. 20. In grösseren Partitheen nach Verhältniss billiger.
- e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 75 bis fl. 300.
- f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerkzt, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorrätzig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Die mit \* Bezeichneten sind nur in diesjährigen Occulationen, daher erst im May nach vollendetem Triebe lieferbar. Ausserdem besitzen wir einen mässigen Vorrath von wurzeläcchten Pflanzen in den besseren Sorten. —

Abate Branzii, beschrieben als regelmässig dunkelcarmin fl. 2. bis 4.

Adelaide, regelm., fein carmin, große Aehnlichkeit mit magnifica perfecta, Traversi, und Prince Albert von einigen.

Adonidea, eine Auszeichnung in rosa von imbricata alba.

Adrien Lebrün, ein Seitenstück zu Saccoi nova, nicht so willig.

Afraie, fl. 2. 30 kr.

Alba Casoretti, regelm., rein weiss, sehr willig blühend.

Alba elegans, rein we., pomponförmig, große schöne Blume.

Alba Elysiana. fl. 1. 30 kr.

Alba eximia, R. regelm. rein weiss, sehr schön. fl. 3 — 6.

Alba grandiflora, dichtgefüllt, rahmwe., willigbl., fugeblüthig.

Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit Waltonensis.

Alba imbricata (Low), neu, schön abgebildet. fl. 2 — 10.

Alba londinensis, fugeblüthig, rein we., hochwachsend.

Alba plena, regelm., rein we., allgemein bekannt.

\*) Unsere Sammlung gewann bei der Blumenausstellung 1852 sowohl den Neuheits- als den Kulturpreis. Als schönste neue Sorten wurden gekrönt: Iride, Cenerentola und Alba plena Dunlop; — besonderer Erwähnung würdig befunden: alba eximia aus eigener Samenzucht. In diesem Jahre wurden gekrönt: Comtesse Callini, Pio IX., Duc de Bretagne und Caryophylloides.

Alba plena Dunlop, reiche, regelmässige, rein weisse Blume vom ersten Range fl. 2 bis 15.

Albertus, we. und rosa gebändert, oft in Roth übergehend, vorzüglich.

Alexina, regelm. geröthet we., punktiert, sehr schön.

Alsatia, fugebl., dicht und gekräuselt, schön rosa, empfehlenswerth.

Altheaflora, anemonenförmig, dunkelscharl., sehr schön und willig.

Amadryas di Cussano fl. 2.

Amalia Croff, weiss rosa, punktiert und gestreift. fl. 2. bis fl. 7.

Amalthea, fast regelm., feurig dunkelr., unreitig eine der grössten vorzüglichsten Blumen.

Ambrosii, beschr. als regelm., glänzend rosa, oft gestreift. fl. 2. 30 kr.

Anemoneflora alba (Chandler), fugeblüth., we., oft gestreift.  
mutabilis, dieselbe in rosa.

Appiani fl. 3.

Archiduchesse Augusta (Corsi), blutroth, weiss gerüst, bläulich schattirt, rglm. fl. 1. 30 — 4.

Archiduchesse Augusta (Puccini), beschr. als regelm. rosa-amaranth. fl. 1. 30 kr.

Archinto, fast regelmässig hochscharlach, schön.

Armida, regelm., scharl., empfehlenswerth.

Augusta, pomponbl., corallenroth.

Aulica, regelm. weiss, punktiert.

Aurelia, fast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.

Aurora (Guicciardini), pomponbl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster Verwandtschaft mit Duchesse de Litta

Aurora (Mariani), übertrifft durch Farbe, Rundung und schönen Wuchs die herrliche Clowesiana.

Ayez, beschriebe als ganz regelm., reich gefüllt, rosa.

Barchi, lebhaft rosa, weiss gezeichnet, regelmässig. fl. 2 — 4.

Baltimorea (Feast's), sehr gr., schalenf., halbgef., alabasterwe. mit rosa.

Baron S. de Pronay (Bauman), sehr gr., Form d. triumphans, zart rahmwe. in fleisch, übergehend.

Baronne d'Udekem, regelm., dunkelcarmin.

Baumanniana nova (Casoretti), fugeblüthig, dunkel-brannroth.

Beccaria, zart rosa, fleischfarb in der Mitte, gr. regelm. fl. 2 — 4.

Bella di Giorno, rosa-fleischfarb, weiss gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 4.

Bettegno, ganz regelm., reich gef., lebhaft carmin mit we. gestreift fl. 2 — 6.

Biflora, dichtgefüllt, gleichwie von zwei Blumen vereinigt, gewöhnlich roth.

Bijou de la Garça, rosa, weiss und carmin, ramulose, vorzüglich. fl. 2 — 4.

Binneyi, sehr regelm., carmoisin, sehr schön.

Bostonia (Flays), eine der grössten regelm. dunkelrothen Blumen.

Briantea (Casoretti), fast regelm., gelbl. rein we., gross, vorzüglich fl. 2 — 6.

Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.

Bronte. fl. 1. 30 kr.

Brozzoni, regelmässig, fleischfarb. od. incarnat rosa, sehr fein, klein.

Bruceana, eine grosse, regelm., carminrothe Blume, sehr empfehlenswerth.

\* Camille Brozzoni. fl. 2.

Campo Melendino, pomponblüth., gelblich weiss.

Candidissima, ganz regelm., eine der vorzüglichsten rein weissen Blumen.

\* Candor. fl. 1. 30 kr.

Cantoniana, gedrängt pomponbl., dunkelcarmin, vorzügliche Sorte.

Caragnini. fl. 1. 30 kr.

Carbonara, volle runde Pomponform, glühend dunkelcarmoisin, eine ganz neue sehr reiche Färbung fl. 2 — 6.

Cardinal Antonielli. fl. 3.

Cariophylloides (Low), prächtig nesselartig gestreift. fl. 3.

Carracioli, ganz regelm., reich, glänzend tief-rosa, ein Seitenstück zu Saccoi nova, weit vorzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.

Caroline Smith, sehr gr., regelm., prächtig rosa.

Carswelliana, regelm., helcarmin mit weissen Streifen, langwüchsig, werthvoll.

Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenförm., we. mit rosa, sehr edel.

Castiglioni, fast regelm., dicht gef., rein we.

Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Verwandtschaft mit Saccoi nova.

Chalmers perfecta (Aueria), ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerühmt.

Cenerentola, ganz regelm., carminroth, hell schattirt.

Centifolia (Low), ganz regelm., carmoisin.



Cesar Arici. fl. 1. 30 kr.

Chandleri, anemonenförmig, reich dunkelscharl., oft we. gesteckt, vortrefl.

Chandleri rosea, große Aehnlichkeit mit pulcherrima striata und pendula oder elata; vorzüglich.

Cibele, in der Art der altheaeflora.

Clowesiana, pomponbl. geröthet we. mit einzelnen rosafarbenen Streifen.

Cocki vera, sehr gr., dunkelr. wie Derbeyana.

Coelestina, wie Hendersoni.

Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., kirchr., we. gesteckt, sehr werthvoll.

Comensa, ganz regelm. dunkelcarmin.

Composita, regelm., lebhaft rosa, spätbl.

Comte Carini.

Comte de Paris, eine Ausweichung in rosa von Duchesse d'Orleans.

Comtessa Alle magna, beschrieben als rein weiß, reifenförmig, vorzüglich. fl. 2 — 6.

Comtesse Bethelen (Croff.) fl. 5.

Contessa Callini, rein weiß reifenförmig, vortreflich. fl. 4.

Comtesse Castelbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Mittelfstreifen fl. 1. 30 kr. — 4.

Comtesse del Maino. fl. 2. 30 kr.

Comtesse Negri, in der Art der Madeleine. fl. 1. 30 kr. — 4.

Comtesse Nencini (Pechiolina), ganz regelm., weiß mit rosa gestreift.

Comtesse Spaner, beschr. als mit roth und we. getheilten Petalen.

Comte de Flandres.

Congesta americana, regelm., dunkelrothbraun, helle Mittelfstreifen, neu fl. 2. — 10.

Conspicua, unregelm., sehr gr. und imponirend, rosacarmin.

Cooperi (America), ganz regelm., fein hell-scharlach, schön.

Coquetti, unstreitig eine der besten regelm. Blumen in hochr.

Coronata crispa alba, große Aehnlichkeit mit der unübertrefflichen Monteroni.

— — candida, desgleichen.

— — miniata, doppelt anemonenblüthig, sinnüberartig roth.

— — rosea (rubra).

Crista Galli, anemonenf., reich gef., dunkelr.

Cruciata, eine der werthvollsten carminr., meistens we. gesteckten regelm. Blumen.

Daideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empfehlenswerth fl. 2 — 4.

Decus italicum, regelm., rosenförmig, rein weiß, sehr schön.

Delicatissima, pomponf., we. mit rosa Streifen.

De Medici. fl. 3.

De Notaris, ganz regelm., dunkelscharlach, oft weiß gesteckt, schön.

Depressa, nur halbvoll, gr., rosa, in der Art der conspicua.

Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelfstreif., oft prachtvoll fl. 2 — 4.

Diamantina, dicke Pomponf., glänzend zart rosa, reizend schön.

Dobrei, anemonenbl., reich gef., hochscharl., sehr schön.

Docteur Horner, wird als eine große, regelmässige Blume in zart rosa angegeben. fl. 2 — 4.

Donkelari, halbvoll, bekannte prächtig panaschirte unentbehrliche Blume.

Dorina Lechi, beschrieben als feurig carminrosa, weiß gesteckt und gestreift, regelm. fl. 2 — 5.

Duc de Brabant, in der Art der Eclipse und imbricata alba, oft sehr regelm.

Duc de Bretagne, sehr reich regelmässig, rosa-carmin, ganz vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.

Duc de Litta, regelm., dunkelcarmin mit hellen Mittelfstreifen.

Duc de Reichstadt, regelm., dunkelcarmin, helle Mittelfstr., Art der Carswelliana.

Duc d'Ursel. fl. 1. 30 kr.

Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.

Duchesse de Litta, anemonenf., glänzend we. mit gelbl. Centrum.

Duchessa di Milano, fleischfarb-rosa, fein punkirt und gesteckt, päonienförm., groß. fl. 2 — 6.

\* Duchesse de Normandie, schneeweiß. fl. 2.

Duchessa di Visconti, beschrieben als weiß-fleischfarb, rosag eürest, regelm. fl. 2 — 5.

Duchesse d'Orleans, ganz regelm., fleischf., we., mit schönen Rosa-Streifen, eine Hauptblume von reizender Schönheit; aber etwas spätblüthig.

Dux Armoricanus, beschrieben als carmin und rosa, leicht weiß gestreift, prächtig. fl. 2 — 5.

Eburnea, sehr gef., rein we., vorzüglich.

Eclipse, fugebl., we., röthlich schimmernd, gestreift.

— rosea, eine Ausweichung im zartesten Rosa, sehr ähnlich mit Galliesii.

Elegans (Chandler), anemonenf., sehr lebhaft rosa, eine sehr kräftige, hervortretende Blume.

Elena Ugoni, hat viel Aehnlichkeit mit Duchesse d'Orleans fl. 2 — 6.

Emico Bettoni. fl. 1. 30 kr.

- Emilia, Pomponf., leuchtend hochscharlach.
- Emilia Bona, beschrieben als rosa-zinnober, weiß gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
- \* Emilia Campione, dunkelrosa, hell gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 3.
- Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, sehr schön.
- Emilie grandiflora, fugelbl., ein Seitenstück zu triumphans, überaus kräftig.
- Emperor, gr., leb. rosa, hat Ähnlichkeit mit reticulata, sehr schön.
- Enrichetta Bisi. fl. 2.
- Erecta, in der Art der Governativa.
- Estheri, fugelbl. sehr gr., blaß fleischf. mit rosa.
- Eximia, regelm., sehr voll, reich corallent.; prächtig, aber nicht willig.
- Fairleya, anemonenbl., gesättigt corallent., sehr hervorleuchtend.
- Fanny Elsler, in der Art der Clowesiana.
- Fatua, fast regelm., reich gef., gr., rosa carmin.
- Faustine, anemonenbl., we., mit rosa und carmin stark gebändert, netzenartig.
- Faustino Lechi, weiß, rosa gefleckt, regelm., extra. fl. 2 — fl. 4.
- Feastii, sehr gr., regelm., milchwe., zuweilen zart gestr.
- Feastii rosea, eine Auszeichnung der Feastii in rosa. fl. 2.
- Festiva, anemonenf. carmoisin. mit gr., we. Flecken.
- Fimbriata, wie alba plena, mit gezackten Petalen.
- rubra, eine schöne panaschele Blume.
- Floy's virginica, fast gef., symmetrisch, sehr gr., tief rosa, sehr ansehnlich.
- Formosa, gedrängt gef., rosacarm.
- Fortarina, regelm., sehr reich, fein gestellt, rein weiß, kaum sichtbar gestreift. fl. 2 — 6.
- Fortuita, fast regelm., gr., weiß, sehr kräftige Blume.
- Fortune's yellow (*Staudish*), neue gelbblühende Camellia aus China. fl. 12.
- Fortuna (*Herbert*), regelmäßig fleischfarb. fl. 2.
- \* Fra Arnoldo da Brescia. fl. 5.
- Frederic Confalonieri. fl. 3. 30 kr.
- Frostii (*America*), ganz regelm., reich gef., carminrosa mit we. Mittelstr. Eine der vorzügl. Neuheiten. Ähnlichkeit mit Sarah Frost.
- Fulgens nova, pompenbl., oft fast regelm., zinnobercarm., vorz.
- Gallesii, Form der Eclipse, zart fleischfarb-rosa.
- Garibaldi. fl. 2.
- General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelstreifen, sehr willig blühend.
- General Lafayette, wird als schönste bunte Blume angerühmt. fl. 2.
- General Zuchi, wahrscheinlich cruciata (*Parisch*).
- Gloria belgica, unregelm., reich gef., dunkelscharl.
- Gloria della Isola Borromè, rosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 2 — 4.
- Gillesii, anemonenf., lebhaft blutr., oft prächtig weiß gefleckt.
- Governativa, regelm., gut gef., dunkelscharl.
- Grandis (*Low*), regelm., dunkelscharl. fl. 2 — 6.
- Gretry, dunkelblutr.
- Gumannii, striata, ganz regelm., carmin. fl. 1. 30 kr.
- Guthriana (*Low*), regelm., schön gerundet, dunkelcarmoisin schattirt.
- Halleyi, sehr vorz., ganz regelm., in der Art der Carswelliana, sehr willig blühend.
- Haylocki, pompenbl., sehr gr., rein we.
- Hempsteadii, regelm., rosa.
- Hempsoni, regelm., zart hellrosa, sehr willig und werthv.
- Henriette imperialis, weiß, regelm. fl. 1. 30 kr. bis fl. 3.
- Henry Clay. fl. 2.
- Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunkelrosa.
- Hogg's spectabilis, gedrängt, anemonenf., hellrosacarm.
- Il 22 Marzo, dunkelscharlach mit weißen Mittelstreifen. fl. 5.
- Il Zephiro, Ähnlichkeit mit rugosissima major.
- Imbricata, regelm., carm., öfters we. gef., sehr schön.
- alba, fast regelm., we. mit einzelnen Rosastr., willig.
- magna, beschr. als gr., regelm., reich gef.
- Incarnata (*Bull*), regelm., geräthet we., unübertreffl., wirft leicht ab.
- Insubria, regelm., reich gef., feur. carm., oft we. gef., sehr empfehlensw.
- Inocenza, fast regelm., rosenform., rein we.
- Iride, ganz regelm., Form der Pr. Bacciochi, carmoisinrosa mit hellen Spizen, sehr schön.
- fl. 2. — fl. 6.
- Isabella II., rein weiß, rosenförmig, regelm., ausgezeichnet. fl. 4. bis 8.



- \* Jacksoni (Verschaffelt), wird als schönste, dunkle, gestreifte Blume gerühmt. fl. 3.  
 Jardin d'hyver, ganz regelmässig, rosa-carmin.  
 Jeffersoni, regelm., reich carmin, sehr empfehlenswerth.  
 Jubile (Low), sehr regelm., we., leicht geröthet, rosa gestr., mit gelbl. Centrum. fl. 2 — 6.  
 Juliana (Climax, Comtesse Rambaldo), gef. rosenform., we.  
 King, anemonef., sehr reich, mildw., oft mit Rosa, empfehlensw.  
 Lady Broughton, regelm., scharlach, extra. fl. 5.  
 Lady Grafton, stark pomponbl. hellcarmin, stark geader.  
 Lady Hill, in der Art der punctata.  
 Landrethi, regelm., Liebl. hellrosa.  
 La Reine, fast die Form und Farbe der candidissima, spars. gestr., sehr schön.  
 Lawranceana, Bau und Farbe der eximia, nicht willig.  
 Leda, regelm., rosenf., glänz. weis., oft zart gestr., sehr schön.  
 Lecana superba, ganz regelm., sehr reich, dunkelscharl., immer noch eine der unentbehrlichsten Blumen.  
 Lefevriana, pomponbl., dunkelrosa, früh und will.  
 Le 8 Août. fl. 3. 30 kr.  
 Leodora, in der Art der Carswilliana fl. 2.  
 Leopolda. fl. 2.  
 Leopoldina, pomponbl., eine der schönst. punktir. Camellien.  
 Linkii, wahrseheinl. einerlei mit Catherine Longhi.  
 Lowii, ganz regelm., reich, dunkelscharl., vorzügl.  
 Madam Fetters, reich scharlach, vorzüglich. fl. 2 — 5.  
 Madoni, regelm., reich, rosenform., we., rosa punkt., vortreflich und willig blühend.  
 Magdaleine, regelm., reich, fein scharl.  
 Magnifica, sehr gr., reich gef., lebhaft salme.  
 Magnifica perfecta, gr. Aehnlichkeit mit Adelaide und Traversi.  
 Maometo, fast regelm., sehr gr., rund, dunkelcorallenr., empfehlensw.  
 Marchese Therese d'Ambr. fl. 2.  
 Marchioness of Exeter, fast regelm., sehr gr., rosa.  
 Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., sehr willig und frühblühend.  
 Maria Eliza, (Buist), pomponf., reich gef., we., mit rosa und gelblich, sehr schön und willig.  
 Maria Luigia di Parma, eincl. mit admirabilis, hochscharlach, weis. gesteckt.  
 Maria Theresa, ganz regelm., we., mit carmin punkt.  
 Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carmin. gestr. fl. 2 — 6.  
 \* Marie Morren. fl. 2.  
 Masters double red, eine reichere variegata.  
 Mathotiana, reicher in Farbe als Amalthea oder Bruceana fl. 1. 30 kr. — fl. 4.  
 Mazzuchelli, übertrifft die Carswilliana, vorzüglich.  
 Medicea, pomponbl., oft fast regelm., fein carmin-scharl., vortreflich.  
 Meloni, beschrieben als weis. und rosa, carmin gestreift, von schönster Form. fl. 4 — 5.  
 Meneghini, ganz regelm., carmin, sehr schön.  
 Micans, in Fülle und Farbe fast die eximia übertreffend.  
 Miniata (Low), regelm., rosenform., hochscharl., prächt. fl. 2 — 10.  
 Mistriss Abby Wilder, ganz regelm., die vollkommenste der weissen Blumen fl. 2 — 10.  
 Mistriss Gunnell (America), eine der edelsten, regelmässigen, rein weissen Musterblumen fl. 1. 30 kr. bis fl. 12.  
 Modesta rubra, fast regelm., carminr.  
 Monarch, carmineif., eine sehr imponirende lebhaft dunkelrothe, oft panaschirte Blume.  
 Montblanc, fugelbl., sehr reich, rein we.  
 Monteroni, ganz regelm., rosenform., bis jetzt neben M. Abby Wilder die schönste weisse Camellia, blühet leider nicht sehr reichlich.  
 Monteroni rosea, eine Ausweichung von Mont. in fleischfarb., unübertreflich. fl. 2 — 5.  
 \* Monteroni rubra (Italien) carmin, weis. gestreift fl. 2.  
 Montfortiana vera, grosse Aehnlichkeit mit Ottoniana.  
 Murrayana vera, anemonef. lebhaft carmin-scharlach.  
 Myrsifolia alba, regelm., rein we., sehr schätzbar und willig.  
 Napoleon (Mariani), pomponbl., sehr gr., dunkelscharl.  
 Nassiniana, regelm., in Form eines Sechsecks, fein carmin, vorzügl. und sehr willig.  
 Neoboracensis, eine gr. imponirende Blume in scharlach.  
 Negri, regelm., we., rosa punktir., spätblüh.  
 Nec plus ultra (America), pomponf., zimobercarmin.  
 Nec plus ultra (Italien), reizend weis.-fleischfarb. fl. 2 — 5.

- Nicholsii, pompenbl., zinnobercarmin, sehr willig.  
 Nitida (*Chandler*), regelm., reich, hellfcharl., sehr schägbar.  
 Nobilissima, pompenbl., rein we., sehr früh und willig.  
 Norma. fl. 2.  
 Ochroleuca, regelm., reich gef., we. mit gelbem Schimmer, sehr schägbar.  
 Odorata vera, oft regelm., rosenf., lebh. dunkelrofa.  
 Onor di Bibiani, ganz regelmäfig, glänzend weiß, fein rofa gestreift.  
 Optima (*Low.*), rofa mit carmoisin gestreift, prächtig. fl. 3.  
 Ottoniana, anemonenf., schalenf., glänzend tiefrofa.  
 Origlomanna superba, gr. Ähnlichkeit mit Sweetiana (*Colwill*).  
 Palagi, sehr gr., dicht gef., pomponf. od. fugelbl.; eine der imponirendsten punkt. Blumen, in der Art der Sweetiana (*Colwill*).  
 Pallade, faft regelm., mildgr., zart gebänd., sehr empfehlensw.  
 Palmeri, ganz regelm., sehr fein carmin, unübertreffl., von auffallend kurzem niederen Wuchse.  
 Palmers perfection, regelm., dunkelcarmin, oft etwas klein.  
 Paolo e Virginia, schneeweiß, dunkelroth punktiert, sehr auffallend fl. 2 — 6.  
 Parini vera, starke franse Pomponf., fleischf., reich und fein punktiert.  
 Parksii, in der Art der variegata.  
 Pavonia. Sehr ähnlich der althaeiflora.  
 Pensylvanica, regelm., prächtig rofa, in der Art der cruciata.  
 Picta (*Loddiges*), regelm., sehr gr., glänz. rofa mit we. Flecken, vorzüglich.  
 Pictorum rosea, regelm., sehr gr., lebhaft rofa.  
 Pio IX. (*Faroli*), schneeweiß, fugelform., regelm., wunderschön. fl. 3. — 5.  
 Pirzio, anemonenf., gr., we., rofa gebändert.  
 Pisani, regelm., reich gef., we., Schaublume. fl. 2 — 6.  
 Pomponia, die alte weiße pomponblüthige.  
 — aurea, we. mit stark gelbl. Schimmer.  
 Powathan (*Floys*), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, dunkelcarmoisin.  
 Pratti, regelm., gr. u. reich gef., hellrofa, oft weißlich gestr.  
 Prince de Trubetzkoi. fl. 1. 30 kr.  
 Prince of Wales, dicke Pomponf., zinnobercarmin.  
 Princesse Adelaide, in der Form und Farbe der treffl. incarnata, mit carmin punkt. u. gestr. fl. 2 — 10.  
 Princesse Bacciochi, ganz regelm., sehr fein, reich dunkelcarmin, sehr schägbar.  
 Princesse Mathilde.  
 Princesse royale, faft regelm., fcharlachroth.  
 Procapitans alba, in der Art der alba grandiflora, sehr willig.  
 Pulchella rosea (*Halley*), regelm., sehr gr., fein salmrofa, sehr imponirend.  
 Pulverulenta, in der Art der Reevesiana.  
 Punctata rosea, eine rothgeword. punctata.  
 \* Queen of Denmark. fl. 12.  
 Queen of England (*Fielder*), in der Art der Saccoi nova.  
 Queen of great Britain, gr., fcharlachcarmin.  
 Queen of Portugal, in der Art der picturata.  
 Queen Victoria (*Pressley*), faft regelm., dunkelroth, oft weiß gestr.  
 Radesckio, hochfcharlach. fl. 1. 30 kr.  
 Reevesiana, anemonenf., hellfcharlach.  
 Regina d'Italia, regelm., schön gerundet, prächtig rofa mit weißen Mittelfstreifen, von auffallend kräftigem Wuchse fl. 2 — 20.  
 Regina d'Ingliterra, schöner als imbricata alba.  
 Regularis, zeigte einige Ähnlichkeit mit nec plus ultra (*America*).  
 Reine de France.  
 Reine des fleurs, regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.  
 Reine des Vierges. fl. 1. 30 kr.  
 \* Renica, fcharlach mit weiß marmelirt, regelm. fl. 3 — 6.  
 Ridolphi, anemonenf., weiß, gelblich schimmernd.  
 Rising Sun, beidr. als ganz regelm., sehr gef., feurig dunkelroth.  
 Ristori, faft regelm., violettroth mit breiten hellen Mittelfstreifen.  
 Robertsoni, regelm., gr., die schönste in leuchtend dunkelfcharlach, leider nicht willig.  
 Romolo. fl. 2.  
 Rosa bostonia, ganz regelm., reich carmin vom ersten Rang. fl. 2 — 15.  
 — d'Orleans, eine Ausweichung der Duchesse d'Orleans in Rosa.  
 — regis, eine Ausweichung der King in Rosa. fl. 2 — 4.



- Rubescens (*Low*), regelm., carminroth, weißlich gestreift.  
 Rugosissima major (*graciosa*), besser und dichter als Vandesiana carnea, sehr imponirend.  
 Saccoi nova, eine der schönsten, regelmäßigen, willigüblühenden Camellien von der lieblichsten Rosafarbe. (In Prachteremplaren abgebild.)  
 Saffo, regelm., dicht, reich carmin-rosa.  
 Samoiloff, regelm., reich, carminroth.  
 Sarah Frost, regelm. rosa-carmin, mit hellen Mittelstreifen, vorzügliche Preisblume im J. 1850.  
 Scaramouche, regelmässig, rosa carmin. fl. 1. 30 kr.  
 Scazzosi, carmin, fein gesteckt. fl. 4.  
 Schrymakersi nova, doppelt anemonenbl., tief korallenscharlach.  
 Scylla, Form und Füllung der eximia, scharlach-carmin.  
 Servi, regelm., dunkelscharlach.  
 Sgariglio (*Croff*). fl. 4.  
 Sherwoodii, fast regelm., gr., dunkelrosa.  
 Sovereign (*Low*) fl. 2 — 6.  
 Species nova (*Mac-Nab*), aus China, mit sehr großem Blatt. fl. 15.  
 Spiralis alba, beschrieben als schön weiß, regelm. fl. 2.  
 Spiralis nova, regelm., fein carmin, weißlich gestreift.  
 Splendidissima alba, Pomponf., dicht, rein weiß.  
 Squamosa, regelm., reich, carmin-roth, vorzüglich.  
 Sterope, anemonenf., feurig, dunkelscharlach.  
 Striped major, in der Art der picturata, durchaus vorzüglich.  
 Sulcata, regelm., weiß mit gelbl. Mittelstreifen, spätblühend.  
 Sweetiana (*Colvill*), pomponbl., eine der vorzüglichsten punktirten Blumen.  
 Sylvia, Form der Chandleri, gesättigt dunkelscharlach.  
 Tambroniana, pomponf., röthlich-weiß, fein punktir.  
 Tavarin, pomponf. sehr groß, zinnobercarmin, schön.  
 Teutonia, regelm., reich, oft hellrosa, oft rein weiß und gestr., vorzügl.  
 — incarnata, eine Ausweichung in unvergleichlicher Zärte fl. 2 — 6.  
 Tissifone, fl. 1. 30 kr.  
 Tomasini, regelm., zart rosa, sehr willig.  
 Tompsoni superba, runde dicke Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.  
 Tonielli, größer und reicher als cruciata.  
 Tosi, regelm., dunkler als pendula.  
 Traversi plenissima, wie Adelaide.  
 Trebbiensis. fl. 2 bis 5.  
 Tricolor, dopp., geröth., weiß, mit breiten carminrothen Bändern.  
 Trionfo di Cernebbio, weiß, gestreift und gefleckt. fl. 2. — 6.  
 Triomphe de la ville Ciani. fl. 2 bis 5.  
 Triomphe de Milan, pomponbl. weiß mit rosa punktir.  
 Triumphans, fugelblüthig, lebhaft licht-rosa, vorzüglich.  
 Tryphosea, pomponbl., rein weiß, gelblich.  
 Turnbulli, eine verbesserte Egertonia.  
 Valeriana, anemonenbl., rosenf., fein scharlach.  
 Variegata, die alte, unregelm., rosa mit weiß gefleckt.  
 Variegata alba, unregelm., reich gef., weiß, rosa gestreift.  
 Varischi, einerlei mit cruciata.  
 Vauxii, ähnlich der Murrayana vera.  
 Verschaffelti, lebhaft rosa, schön gestreift.  
 Vestalis, regelm., rein weiß, gelblich schimmernd.  
 Vesuvio, anemonenf., feurigstes Scharlach.  
 Vexillo di Flora, fast regelm., fein rosa-carmin.  
 Vexillo Lombardo. fl. 2 bis 5.  
 Victoria Antwerpiensis, pomponbl., rein weiß.  
 — rosea, eine Ausweichung im zärtesten Fleischfarb-rosa.  
 Villageoise, pomponbl., gestr. u. punktir., in der Art der Leopoldina.  
 Violacea superba, monströs, oft fast regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.  
 Vittata vera, pomponbl., rein weiß, groß und schön.  
 Waardii, anemonenbl., dicht, dunkelscharlach.  
 Washingtonia, sehr gr., zuweilen die größte aller Camellien-Blumen, in Form und Farbe der Amalthea ähnlich.

Wellsiana, in der Art der Eclipse rosea und Galleesii.  
 Wilderi, edelste regelmäßige Form, sehr reich, lebhaft zart rosa. H. 2 — 15.  
 Youngii, anemonenf., gr., leuchtend rosa-carmin.  
 Camellia reticulata, doppelt, großblühende lebhaft rosafarbene.

## Georginen oder Dahlien

### und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

## Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.



## Levgoyen- und Aster-Samen

in vorzüglichster Qualität.

Sommer-Levgoyen, 50 Sorten, jede à 100 Korn fl. 1. 50 kr.

24	—	—	—	—	—	41	12
20	—	—	—	—	—	1.	—
16	—	—	—	—	—	48	—
12	—	—	—	—	—	56	—
8	—	—	—	—	—	24	—
Röhr - Aster	20	—	—	—	—	1.	—
	12	—	—	—	—	56	—
Kugel- —	10	—	—	—	—	50	—
Zwerg- —	20	—	—	—	—	1.	—
	12	—	—	—	—	56	—
Pyramiden- —	16	—	—	—	—	48	—
Türkische —	8	—	—	—	—	24	—

Andere Sommerblumensamen besorgen wir gerne aus bester Quelle oder nach Auftrag.

## Gras - Samen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Runstwiesen:

Lolium perenne, englisches Raygras pr. Pfund 15 kr.

pr. 100 Pfund fl. 20.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt:

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

Leigoyen- und Aster-Samen

# Inhalts - Verzeichniss.

Sommer-Leigoyen, 50 Sorten, jede 2 100 Korn R. 1. 50 kr.

Tafel- und Oeconomie-Obst-Sorten . . . . .	Seite: 5
Propfreiser . . . . .	11
Spargelpflanzen . . . . .	12
Gehölz- und Ziersträucher . . . . .	—
Azalea für das freie Land . . . . .	15
Magnolien . . . . .	18
Pæonia Moutan . . . . .	19
Coniferen oder Nadelhölzer . . . . .	22
Ziersträucher in Töpfen und Vasen . . . . .	26
Rosensortiment . . . . .	—
Staudengewächse (Perennirende Pflanzen) . . . . .	56
Phlox . . . . .	41
Verbenen . . . . .	42
Gewächshaus - Pflanzen . . . . .	—
Cinerarien . . . . .	44
Pelargonien . . . . .	50
Warmhaus-Pflanzen . . . . .	52
Einige Wasserpflanzen . . . . .	54
Earrenkräuter . . . . .	55
Azalea indica . . . . .	—
Rhododendron . . . . .	58
Camellien . . . . .	61
Georginen oder Dahlien und Pflanzen für Blumenbeete . . . . .	68
Schlingpflanzen etc. . . . .	—
Einige Blumensamen . . . . .	69
Grassädmen . . . . .	—
Ueberrahme aller auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte . . . . .	—



**V e r z e i c h n i s s**  
der verschiedenen  
*feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,  
Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-  
Pflanzen,*  
aus den Sammlungen  
von  
**S. & J. R i n z,**  
Kunst- und Handels-Gärtner,  
in  
**FRANKFURT AM MAIN.**

***Herbst***

**1854.**

**European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)